

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data. Per selezionare una casella, annerirla completamente: ☒ (non ☐ o ☒).

Nome: _____

Cognome: _____

Matricola:

--	--	--	--	--	--	--

Punteggi: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per risposte sbagliate o lasciate in bianco.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D
V	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1) Si consideri l'equazione differenziale:

$$y'' + 7y' + 2y = 0.$$

1A) L'equazione ha un'unica soluzione.

1B) Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che $y(3) = 4$.

1C) Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che $y(6) = 7$ e $y'(6) = 6$.

1D) Non esistono soluzioni dell'equazione tali che $y(4) = 5$, $y'(4) = 6$, $y''(4) = 47$.

2) Si consideri l'equazione differenziale

(1) $y'' - 13y' + 36y = 108.$

2A) Il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 + 13L + 36$.

2B) La funzione $y_0(t) = 4e^{4t}$ è soluzione dell'equazione omogenea associata a (1).

2C) La funzione $\bar{y}(t) = 4$ è una soluzione particolare di (1).

2D) Se $y(0) = 3$ e $y'(0) = 0$, la soluzione di (1) è costante.

3) Si consideri l'equazione differenziale

$$y''(t) + A y(t) + B y(t) = 0.$$

3A) Il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 + A L + B$.

3B) Se $A = 0$ e $B = -25$, la funzione $y(t) = 8e^{5t} - 5e^{-5t}$ è soluzione dell'equazione.

3C) Se $A = -5$ e $B = 0$, la funzione $y(t) = 7$ non è soluzione dell'equazione.

3D) Se $A = -10$ e $B = 74$, la funzione $y(t) = 5e^{5t} \sin(7t)$ è soluzione dell'equazione.

4) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'' - 4y' = -28.$$

4A) Tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata sono date da $y_0(t) = C + D e^{4t}$.

4B) Esistono soluzioni costanti dell'equazione.

4C) La funzione $\bar{y}(t) = 7t$ non è soluzione dell'equazione.

4D) Se $y(0) = 8$ e $y'(0) = 7$, la soluzione dell'equazione è un polinomio di primo grado.

--	--	--	--	--	--	--	--

Cognome**Nome****Matricola****Compito 00199**

5) Si consideri l'equazione differenziale

(1)

$$y'' - 11y' + 18y = -7e^{2t}.$$

- a)** Scrivere il polinomio caratteristico dell'equazione in (1) e trovarne le radici.
 - b)** Scrivere tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1).
 - c)** Trovare una soluzione particolare di (1).
 - d)** Trovare l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$.
-



6) Si consideri l'equazione differenziale

(1)
$$y'' - 6y' + 9y = 2e^{3t}.$$

a) Si determini il polinomio caratteristico di (1) e si trovino tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1).

b) Si trovi una soluzione particolare di (1).

c) Si trovi l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ e $y'(0) = 5$.

d) Si trovi l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 6$ e $y'(0) = 0$.

Soluzioni del compito 00199

1) Si consideri l'equazione differenziale:

$$y'' + 7y' + 2y = 0.$$

1A) L'equazione ha un'unica soluzione.

Falso: Trattandosi di un'equazione differenziale ordinaria del secondo ordine, ha infinite soluzioni, dipendenti da due parametri reali.

1B) Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che $y(3) = 4$.

Falso: L'equazione ha infinite soluzioni, dipendenti da due parametri reali. Assegnando una sola condizione, si “fissa” uno solo dei due parametri, e quindi l'equazione ha infinite soluzioni tali che $y(3) = 4$.

1C) Esiste un'unica soluzione dell'equazione tale che $y(6) = 7$ e $y'(6) = 6$.

Vero: Assegnando due condizioni, una sulla funzione e una sulla derivata, si ottiene un problema di Cauchy, che ha un'unica soluzione.

1D) Non esistono soluzioni dell'equazione tali che

$$y(4) = 5, \quad y'(4) = 6, \quad y''(4) = 47.$$

Vero: Se $y(4) = 5$ e $y'(4) = 6$, dall'equazione segue che deve essere

$$0 = y''(4) + 7y'(4) + 2y(4) = y''(4) + 7 \cdot 5 + 2 \cdot 6 = y''(4) + 47,$$

da cui segue che $y''(4) = -47$. Pertanto, l'unica soluzione dell'equazione che soddisfa le condizioni $y(4) = 5$ e $y'(4) = 6$ è tale che $y''(4) = -47 \neq 47$; in altre parole, non esistono soluzioni dell'equazione che soddisfano le tre condizioni richieste.

2) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y'' - 13y' + 36y = 108.$$

2A) Il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 + 13L + 36$.

Falso: Sostituendo y'' con L^2 , y' con L e y con 1, si trova che

$$P(L) = L^2 - 13L + 36 \neq L^2 + 13L + 36.$$

2B) La funzione $y_0(t) = 4e^{4t}$ è soluzione dell'equazione omogenea associata a (1).

Vero: Il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 - 13L + 36$, che si annulla per $L_1 = 4$ e $L_2 = 9$. Pertanto, tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata sono date da

$$y_0(t) = C e^{4t} + D e^{9t},$$

con C e D numeri reali. Scegliendo $C = 4$ e $D = 0$, si ha che $y_0(t) = 4e^{4t}$ è soluzione dell'equazione omogenea associata a (1).

2C) La funzione $\bar{y}(t) = 4$ è una soluzione particolare di (1).

Falso: Sostituendo nell'equazione si ha, essendo nulle sia la derivata prima che la derivata seconda di $\bar{y}(t)$,

$$y'' - 13y' + 36y = 36 \cdot 4 = 144 \neq 108,$$

e quindi $\bar{y}(t) = 4$ non è una soluzione particolare di (1). Cercando una soluzione particolare della forma $y(t) \equiv Q$ si vede facilmente che deve essere $Q = 3$.

2D) Se $y(0) = 3$ e $y'(0) = 0$, la soluzione di (1) è costante.

Vero: Come detto nell'esercizio **2C**, la funzione $y(t) \equiv 3$ è soluzione dell'equazione (1). Dato che soddisfa inoltre le condizioni $y(0) = 3$ e $y'(0) = 0$, la funzione costante $y(t) \equiv 3$ è l'unica soluzione di (1) che le soddisfa.

3) Si consideri l'equazione differenziale

$$y''(t) + A y(t) + B y(t) = 0.$$

3A) Il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 + A L + B$.

Vero: Sostituendo y'' con L^2 , y' con L e y con 1, si trova che

$$P(L) = L^2 + A L + B.$$

3B) Se $A = 0$ e $B = -25$, la funzione $y(t) = 8e^{5t} - 5e^{-5t}$ è soluzione dell'equazione.

Vero: Se $A = 0$ e $B = -25$, il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 - 25$ che si annulla per $L = \pm 5$. Pertanto, tutte le soluzioni dell'equazione sono date da

$$y(t) = C e^{5t} + D e^{-5t}.$$

Scegliendo $C = 8$ e $D = -5$, si ha che $y(t) = 8e^{5t} - 5e^{-5t}$ è soluzione dell'equazione.

3C) Se $A = -5$ e $B = 0$, la funzione $y(t) = 7$ non è soluzione dell'equazione.

Falso: Se $A = -5$ e $B = 0$, il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 - 5L$ che si annulla per $L = 0$ e per $L = 5$. Pertanto, tutte le soluzioni dell'equazione sono date da

$$y(t) = C e^{0t} + D e^{5t} = C + D e^{5t}.$$

Scegliendo $C = 7$ e $D = 0$, si ha che $y(t) = 7$ è soluzione dell'equazione.

3D) Se $A = -10$ e $B = 74$, la funzione $y(t) = 5e^{5t} \sin(7t)$ è soluzione dell'equazione.

Vero: Se $A = -10$ e $B = 74$, il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 - 10L + 74$, che si annulla per $L = 5 \pm 7i$. Pertanto, tutte le soluzioni dell'equazione sono date da

$$y(t) = e^{5t}[C \cos(7t) + D \sin(7t)].$$

Scegliendo $C = 0$ e $D = 5$, si ha che $y(t) = 5e^{5t} \sin(7t)$ è soluzione dell'equazione.

4) Si consideri l'equazione differenziale

$$y'' - 4y' = -28.$$

4A) Tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata sono date da $y_0(t) = C + D e^{4t}$.

Vero: Il polinomio caratteristico dell'equazione è $P(L) = L^2 - 4L$, che si annulla per $L = 0$ e $L = 4$. Pertanto, tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata sono date da

$$y_0(t) = C e^{0t} + D e^{4t} = C + D e^{4t}.$$

4B) Esistono soluzioni costanti dell'equazione.

Falso: Se $y(t) \equiv Q$ è una costante, sostituendo nell'equazione si ha

$$y''(t) - 4y'(t) = 0 - 4 \cdot 0 = 0 \neq -28,$$

e quindi l'equazione non ha soluzioni costanti. Alternativamente, sappiamo dalla domanda **4A** che le costanti sono soluzioni dell'equazione omogenea, e quindi non possono essere soluzioni dell'equazione “completa”.

4C) La funzione $\bar{y}(t) = 7t$ non è soluzione dell'equazione.

Falso: Se $\bar{y}(t) = 7t$, si ha $\bar{y}'(t) = 7$ e $\bar{y}''(t) = 0$. Sostituendo nell'equazione si ha

$$\bar{y}''(t) - 4\bar{y}'(t) = -4 \cdot 7 = -28,$$

e quindi $\bar{y}(t) = 7t$ è soluzione dell'equazione.

4D) Se $y(0) = 8$ e $y'(0) = 7$, la soluzione dell'equazione è un polinomio di primo grado.

Vero: Sappiamo già, dagli esercizi **4A** e **4C**, che tutte le soluzioni dell'equazione sono date da

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = C + D e^{4t} + 7t,$$

da cui segue che

$$y'(t) = 4D e^{4t} + 7.$$

Pertanto, assegnando le condizioni iniziali, si ha

$$8 = C + D, \quad 7 = 4D + 7.$$

Dalla seconda si ricava $D = 0$, e sostituendo nella prima si ricava $C = 8$. Ne segue che l'unica soluzione dell'equazione è

$$y(t) = 8 + 7t,$$

che è un polinomio di primo grado.

5) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y'' - 11y' + 18y = -7e^{2t}.$$

a) Scrivere il polinomio caratteristico dell'equazione in (1) e trovarne le radici.

b) Scrivere tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1).

c) Trovare una soluzione particolare di (1).

d) Trovare l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$.

Soluzione:

a) Sostituendo in (1) L^2 a y'' , L a y' e 1 a y , si trova

$$P(L) = L^2 - 11L + 18,$$

che si annulla per $L_1 = 2$ e per $L_2 = 9$.

b) Usando le radici del polinomio caratteristico calcolate al punto precedente, abbiamo che tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1) sono date da

$$y_0(t) = C e^{2t} + D e^{9t},$$

con C e D numeri reali.

c) Dato che $g(t) = e^{2t}$ è una soluzione dell'equazione omogenea, cerchiamo una soluzione particolare della forma

$$\bar{y}(t) = Q t e^{2t}.$$

Si ha

$$\bar{y}'(t) = Q(1 + 2t)e^{2t}, \quad \bar{y}''(t) = Q(4 + 4t)e^{2t}.$$

Sostituendo in (1) si ha

$$\bar{y}'' - 11\bar{y}' + 18\bar{y} = Q e^{2t} [4 + 4t - 11(1 + 2t) + 18t] = -7Q e^{2t},$$

e quindi \bar{y} è soluzione di (1) se Q è tale che

$$-7Q e^{2t} = -7e^{2t},$$

da cui segue $Q = 1$ e quindi

$$\bar{y}(t) = t e^{2t}.$$

d) Da b) e c) abbiamo che tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = C e^{2t} + D e^{9t} + t e^{2t},$$

con C e D numeri reali. Dato che

$$y'(t) = 2C e^{2t} + 9D e^{9t} + e^{2t} + 2t e^{2t},$$

si ha $y(0) = C + D$ e $y'(0) = 2C + 9D + 1$. Imponendo le condizioni iniziali, si ha che deve essere $C + D = 0$ e $2C + 9D + 1 = 1$, da cui si ricava facilmente $C = D = 0$. Ne segue che l'unica soluzione di (1) che soddisfa le condizioni $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$ è

$$y(t) = t e^{2t}.$$

6) Si consideri l'equazione differenziale

$$(1) \quad y'' - 6y' + 9y = 2e^{3t}.$$

a) Si determini il polinomio caratteristico di (1) e si trovino tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata a (1).

b) Si trovi una soluzione particolare di (1).

c) Si trovi l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 0$ e $y'(0) = 5$.

d) Si trovi l'unica soluzione di (1) tale che $y(0) = 6$ e $y'(0) = 0$.

Soluzione:

a) Il polinomio caratteristico è $P(L) = L^2 - 6L + 9$, che si annulla per $L_1 = L_2 = 3$. Conseguentemente, tutte le soluzioni dell'equazione omogenea associata ad (1) sono date da

$$y_0(t) = (C + Dt)e^{3t},$$

con C e D numeri reali.

b) Dato che sia e^{3t} che te^{3t} sono soluzioni dell'equazione omogenea, cerchiamo una soluzione particolare di (1) della forma

$$\bar{y}(t) = Qt^2e^{3t}.$$

Derivando, si ha

$$\bar{y}'(t) = Q(2t + 3t^2)e^{3t}, \quad \bar{y}''(t) = Q(2 + 12t + 9t^2)e^{3t}.$$

Sostituendo nell'equazione si ha

$$\bar{y}'' - 6\bar{y}' + 9\bar{y}(t) = Qe^{3t}[2 + 12t + 9t^2 - 6(2t + 3t^2) + 9t^2] = 2Qe^{3t},$$

da cui segue che \bar{y} è soluzione di (1) se $Q = 1$. Si ha dunque che tutte le soluzioni di (1) sono date da

$$y(t) = y_0(t) + \bar{y}(t) = (C + Dt + t^2)e^{3t},$$

da cui segue, derivando, che

$$y'(t) = (3C + D + (3D + 2)t + 3t^2)e^{3t}.$$

Pertanto

$$(2) \quad y(0) = C, \quad y'(0) = 3C + D.$$

c) Da (2) e dalle condizioni date segue che deve essere $C = 0$ e $3C + D = 5$, da cui $C = 0$ e $D = 5$. L'unica soluzione di (1) è quindi data da

$$y(t) = (5t + t^2)e^{3t}.$$

d) Da (2) e dalle condizioni date segue che deve essere $C = 6$ e $3C + D = 0$, da cui $D = -18$. L'unica soluzione di (1) è quindi data da

$$y(t) = (6 - 18t + t^2)e^{3t}.$$