

第一章 线性方程组的求解

1 线性方程组的基本概念

1.1 一般形式

设 \mathbb{P} 是一个数域, m, n 为正整数, n 元线性方程组的一般形式为:

[illegible]

其中 $a_{ij}, b_i \in \mathbb{P}$ 已知, x_1, \dots, x_n 为未知量。

1.2 相关术语

- 未知量: x_1, x_2, \dots, x_n
- 项: $a_{ij}x_j$ 为第 i 个方程的第 j 项
- 系数: a_{ij} 为 x_j 在方程 i 中的系数
- 常数项: b_i
- 齐次方程组: 所有 $b_i = 0$
- 非齐次方程组: 至少一个 $b_i \neq 0$

1.3 解的概念

若存在 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{P}$ 使得代入后所有方程成立, 则称 (c_1, \dots, c_n) 为方程组的一个解。所有解构成**解集**。方程组有解称为**相容**, 否则为**不相容**。

1.4 同解方程组

若两个方程组解集相同，则称它们同解。

4 扩展内容

4.1 线性方程组的矩阵表示

方程组 (1.1.1) 可写为矩阵形式:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b},$$

其中 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 为系数矩阵, $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$, $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)^T$ 。

4.2 增广矩阵与初等行变换

对应方程组的初等变换, 矩阵可进行初等行变换:

- 互换: 交换两行
- 倍乘: 用非零数乘某一行
- 倍加: 将一行的倍数加到另一行

阶梯形方程组对应行阶梯形矩阵。

4.3 线性方程组的几何意义

- 在 \mathbb{R}^2 中, 每个方程表示一条直线, 解为直线交点
- 在 \mathbb{R}^3 中, 方程表示平面, 解为平面交点
- 无解、唯一解、无穷多解分别对应几何对象的无交点、唯一交点、重合或交于直线/平面

4.4 数值方法简介

- 高斯消元法: 精确解, 适合中小规模稠密矩阵
- 迭代法 (如 Jacobi、Gauss-Seidel): 适合大规模稀疏矩阵
- 矩阵分解法 (如 LU 分解): 提高计算效率与稳定性

5 总结

第一章以线性方程组的求解为核心, 从基本概念出发, 引入初等变换与阶梯形方程组, 系统介绍 Gauss 消元法。内容由浅入深, 既强调理论严谨性, 又注重计算实用性, 为后续矩阵、向量空间等概念奠定基础。