

Digitale Bildverarbeitung

Dr. rer. nat. Johannes Riesterer

Umwandlung von Bildern

- Viele Verfahren der Signalverarbeitung haben ihren Ursprung in der Analysis. Um diese anwenden zu können, müssen diskrete Daten in kontinuierliche Daten umgewandelt werden.
- Auf der anderen Seite kann ein Computer nur diskrete Daten verarbeitet. Kontinuierliche Signale (zum Beispiel von Sensoren) müssen daher in diskrete Daten umgewandelt werden.

Für ein eindimensionales, diskretes Bild $U : [1, \dots, N] \rightarrow R$ bezeichne $U_j := U(j)$.

Stückweise konstante Interpolation

Definiere $\phi^0(x) := 1_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})}(x) := \begin{cases} 1, & \text{for } -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{else} \end{cases}$,
 $\phi_j^0(x) := \phi^0(x - j)$ und $u(x) := \sum_{j=1}^N U_j \phi_j^0(x)$

Höherdimensionale stückweise Interpolation

Für ein 2-dimensionales, diskretes Bild

$U : [1, \dots, N] \times [1, \dots, M] \rightarrow R$ definiere

$u(x, y) := \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M U_{i,j} \cdot \phi_i(x) \cdot \phi_j(y)$ und analog für
n-dimensionale Bilder....

Abtastung

Für ein kontinuierliches Bild $u : I^n \rightarrow R$ erhält man durch gewichtete Mittelungen $U_i := \int_{I^n} \phi(x - x_i) u(x) dx$ ein diskretes Bild.

Faltung

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^n} f(y - x) \cdot g(y) dy \quad (1)$$

Beispiel 1

Link: Box

Beispiel 2

Link: Gauß

Diskrete Faltung

Für zwei diskrete Funktionen $U : [1, \dots, N] \rightarrow R$ und $H : [1, \dots, N] \rightarrow R$ mit stückweisen konstanten Interpolation $u(x) := \sum_{l=1}^N U_l \phi_j^0(x)$ und $h(x) := \sum_{m=1}^N H_m \phi_m^0(x)$ ergibt die Faltung

$$\begin{aligned}(h * u)(k) &= \int u(y) h(k - y) dy \\&= \int \sum_{l=1}^N U_l \phi^0(y - l) \sum_{m=1}^N H_m \phi^0(k - y - m) dy \\&= \sum_{l=1}^N \sum_{m=1}^N U_l H_m \int \phi^0(y - l) \phi^0(k - y - m) dy\end{aligned}$$

Diskrete Faltung

Da für das Integral

$$\int \phi^0(y-l)\phi^0(k-y-m) dy = \begin{cases} 1 & \text{falls } m = k-l \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

gilt, folgt die Darstellung

$$(u * h)(k) = \sum_l U_l H_{k-l}$$