

Tolestan

Sumatriptan 85 mg
Naproxeno sódico 500 mg
Vía oral
Comprimidos recubiertos

Fórmula

Cada comprimido recubierto contiene: Sumatriptan succinato 119,0 mg (equivalente a Sumatriptan 85,0 mg); Naproxeno sódico 500,0 mg; Exc. c.s.

Acción terapéutica

Sumatriptan es un agonista selectivo del receptor de serotonina (5HT) 1D. Se postula que el efecto terapéutico resulta de la activación de estos receptores a nivel postsináptico lo que determina constricción de los vasos sanguíneos intracraneos. También se ha postulado que la activación de estos receptores a nivel presináptico bloquea la liberación de neuropeptidos proinflamatorios endógenos en el espacio perivascular. El naproxeno ejerce sus efectos analgésicos a través de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas por inhibición no selectiva de la ciclooxigenasa (COX).

Indicaciones

Tratamiento de las crisis agudas de migraña clásicas con o sin aura.

Posología

En la crisis, un comprimido que puede repetirse a las 2 horas.
La dosis promedio de mantenimiento es de 1 comprimido cada 12 horas.

Contraindicaciones

Dado los escasos datos de seguridad de la combinación es necesario considerar las contraindicaciones de cada fármaco en particular.

Sumatriptán:

Hipersensibilidad conocida al fármaco.

Uso de otro agonista serotoninérgico o derivado ergotínico en las 24 horas previas.

Migraña basilar o con hemiplejía.

Enfermedad cardiovascular preexistente (cardíaca, cerebrovascular o periférica) de etiología isquémica u otra causa. Angina por vasoespasmio (Prinzmetal).

Pacientes portadores de hipertensión no controlada.

Uso de inhibidores de la MAO en las 2 semanas previo al uso del medicamento.

Naproxeno:

Hipersensibilidad conocida al fármaco.

Pacientes que han experimentado previamente asma, urticaria y otras reacciones

alérgicas con el consumo de ácido acetil salicílico u otros AINEs.

Tratamiento del dolor perioperatorio de los pacientes sometidos a by pass coronario.

Reacciones adversas y efectos colaterales

En un estudio que evaluó la seguridad de la combinación se halló que los efectos adversos más comunes fueron: náuseas, contractura muscular y mareos. Dado que la información en relación a la seguridad de la combinación es escasa es necesario considerar las reacciones adversas de cada fármaco en particular.

Naproxeno:

El perfil de seguridad es igual que para el resto de los AINEs, destacándose por su gravedad los efectos adversos a nivel gastrointestinal y cardiovascular. A nivel gastrointestinal: dolor abdominal, dispepsia, gastritis, ulcera gastroduodenal, perforación y sangrado digestivo. Es frecuente evidenciar aumento las enzimas hepáticas, en general leve y transitorio. Puede causar aumento del riesgo de eventos trombóticos cardiovasculares, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Se pueden observar aumentos transitorios y leves de la presión arterial. Se han descrito casos de falla renal aguda, necrosis papilar, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial e hiperpotasemia. Al igual que el resto de los AINEs, naproxeno puede inhibir la agregación plaquetaria, en forma reversible y prolongar el tiempo de sangría. A nivel auditivo se ha observado tinnitus. Se han descrito casos de pérdida de la audición, algunos irreversibles. Naproxeno puede producir reacciones de hipersensibilidad de variada severidad en pacientes con o sin antecedentes de hipersensibilidad a AINEs. Pueden aparecer crisis de broncoespasmo, reportados principalmente en pacientes con asma inducido por ácido acetilsalicílico. Se han descrito casos de neumonitis eosinofílica.

Sumatriptán:

Los efectos adversos mas comúnmente reportados incluyen mareos, rubor facial, debilidad y fatiga. A nivel gastrointestinal los efectos adversos mas frecuentemente observados son náuseas y vómitos. Puede observarse opresión precordial. Puede precipitar angina de pecho. Raramente se ha asociado con eventos cardiovasculares graves como arritmias e isquemia miocárdica. Se han reportado casos de accidentes cerebrovasculares. Las cifras tensionales pueden aumentar transitoriamente al inicio del tratamiento. A nivel del sistema nervioso se destacan sensación de pesadez en varios sitios del cuerpo, fatiga y mareos. Puede observarse cefaleas inducida por medicamentos con el uso de sumatriptán. A nivel cutáneo se han descrito rash, urticaria y más raramente anafilaxis.

Embarazo: Ambos fármacos pertenecen a la categoría C de la Food and Drug Administration.

2080002840-21/12/16

Lactancia: Si bien la Academia Americana de Pediatría, no contraindica su uso, se aconseja como precaución, descartar la leche de las primeras 8 horas luego de la toma de Tolestan o evitar amamantar hasta pasadas 24 horas de la toma.

Precauciones y advertencias

Dado los escasos datos de seguridad de la combinación es necesario considerar las precauciones de cada fármaco en particular.

Naproxeno:

Se debe utilizar con precaución en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, ancianos, asmáticos, último trimestre del embarazo, antecedentes de alteración de la coagulación (incluidos hemofílicos, enfermedad de Von Willebrand, trombocitopenia severa menor a 50000/mm³, enfermedades hepáticas, uso de anticoagulantes o consumo excesivo de alcohol), antecedentes de úlcera gastroduodenal, sangrado o perforación, portadores de enfermedad inflamatoria intestinal, alteración de la función hepática o renal, hipertensos, pacientes portadores de insuficiencia cardíaca u otras patologías que cursen con retención de líquidos y pacientes con anemia.

Sumatriptán:

Utilizar con precaución en pacientes portadores de falla renal o hepática, epilepticos, riesgo de enfermedad cardiovascular isquémica, en pacientes con síntomas o signos de hipoperfusión arterial y portadores de reflujo gastroesofágico. Pacientes con alergia a las sulfas, si bien se ha descartado el riesgo de reacciones cruzadas se recomienda el seguimiento de estos pacientes. Debe evitarse el uso concomitante de ISRS y compuestos ergóticos.

Niños. No se disponen de estudios que hayan evaluado la eficacia y seguridad de la combinación en esta población.

Interacciones medicamentosas

No hay estudios sobre el riesgo de interacciones de la combinación.

De los datos de las interacciones de cada fármaco se destacan:

Naproxeno:

El uso concomitante de naproxeno con antihipertensivos puede alterar el control de las cifras tensionales. El uso conjunto con antiagregantes o anticoagulantes y de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) aumenta el riesgo de hemorragia digestiva. El uso concomitante de sulfonilureas aumenta el riesgo de hipoglucemia.

Sumatriptán:

La administración conjunta de sumatriptán con otros agonistas de los receptores 5HT₁ produce reacciones vasoespásticas prolongadas.

El uso con ISRS o Inhibidores de la monoaminooxigenasa A aumenta el riesgo de desarrollo de síndrome serotoninérgico.

El uso concomitante de sumatriptán y compuestos ergóticos produce reacciones de vasoespasmo y aumenta el riesgo de eventos isquémicos.

Sobredosis y conducta a seguir

Dado los escasos datos de toxicidad de la combinación es necesario considerar los efectos tóxicos de cada fármaco en particular.

Naproxeno:

Los elementos clínicos de intoxicación incluyen: dolor abdominal, depresión, sedación, distonía, apnea, convulsiones y acidosis metabólica. Aparecen dentro de las primeras 24 a 48 horas de inicio del tratamiento. No se conoce el valor de la concentración tóxica de naproxeno. No existe un antídoto específico para el tratamiento. Puede utilizarse carbón activado en las primeras horas luego de la ingesta.

Sumatriptán:

Hay pocos datos acerca de los efectos tóxicos del sumatriptán. Con dosis supratrapéuticas se han evidenciado aumento de las cifras de presión arterial. No se han establecido las dosis mínimas tóxicas. No existe un antídoto específico para el tratamiento. Puede utilizarse carbón activado en las primeras horas luego de la ingesta.

Presentación

Envases conteniendo 2 comprimidos recubiertos.

Producto medicinal

Manténgase fuera del alcance de los niños

Conservar en lugar seco a temperatura ambiente inferior a 30 °C

Industria Uruguaya

Expendio bajo receta médica

Elaborado en **ROEMMERS S.A.**

Cno. Maldonado 5634. Montevideo. Uruguay

Bolivia: para **PHARMA INVESTI S.R.L.**

Calle Moldes N° 200 esquina calle La Paz - Zona Centro

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Farm. Resp. Dra. Madai Diaz Yaca Mat. Prof. D-64

Centro América: para **Roemmers de Centro América, S.A.**, Guatemala.

Distribuido por Roemmers de Centro América, S.A., Guatemala, C.A.

Paraguay: Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse a Emergencias Médicas, Dpto. de Toxicología, Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelos. Teléf. 220418.

Representado en Paraguay por **Lab. ROEMMERS S.A.C.I.**

Pitiantuta 613 esq. Juan de Salazar. Teléfono: 210779

Regente: Q.F.: María R. Irala. Reg. Prof.: N° 1406

Venta autorizada por la Dirección de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.

Certificado N° 16454-02-EF

Rep. Dominicana: para **ROEMMERS S.R.L.**

Rep. Dominicana

2080002840-21/12/16

