




**FRESENIUS  
KABI**



# Invionezo®

Linezolid

Solución inyectable

**600 mg/300 mL**

Antibiótico de la clase  
oxazolidinona

Activo contra la mayoría  
de Gram-positivos

# Invionezo® 300 mg/600 mL

## Linezolid

### Código del producto

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Presentación comercial:    | 9291F           |
| Presentación sector salud: | 010.000.4291.00 |

### Descripción

Solución inyectable en bolsa de polipropileno de 300 mL. Cada 100 mL contiene 200 mg de linezolid.

### Generalidades

Linezolid es un antibiótico sintético de la clase oxazolidina y activo contra la mayoría de las bacterias Gram-positivas. Actúa como inhibidor de la síntesis de proteínas inhibiendo el crecimiento de bacterias al interrumpir su producción de proteínas (acción bacteriostática). El mecanismo de acción exacto de linezolid parece ser único en el sentido de que bloquea el inicio de la producción de proteínas y no uno de los pasos posteriores.

Información para prescribir reducida:

### Formulación

Cada bolsa contiene 600 mg de linezolid y 300 mL de agua para fabricación de inyectables cbp, correspondientes a 2 mg/mL.

### Indicaciones terapéuticas

Linezolid está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones, incluyendo casos con bacteremia concurrente, cuando se sospecha o se conoce que son causadas por cepas susceptibles de microorganismos gram-positivos anaerobios o aerobios: Neumonía nosocomial, neumonía adquirida en comunidad, infecciones de piel y tejidos blandos, infecciones por enterococos, incluyendo aquellas causadas por *Enterococcus faecium* y *Enterococcus faecalis* resistentes a la vancomicina. Linezolid no tiene actividad clínica contra patógenos Gram-negativos.

### Dosis y Vía de administración

La vía de administración es infusión intravenosa. La dosis recomendada para **adultos y adolescentes** >12 años; 600 mg cada 12 hrs de 10 hasta 28 días según la gravedad. Para pediatría la dosis sugerida es: 10 mg/kg/IV cada 8 hrs por hasta 28 días.

### Reacciones adversas

Las siguientes reacciones se han reportado con el uso de Linezolid, con una incidencia de mínimo 1% fueron: **Trastornos gastrointestinales:** Dolor, calambres, distensión abdominal, diarrea, náuseas, vómito, cambio de coloración de la lengua y dientes. **Infecciones e Infestaciones:** Estomatitis por Candida. Alteraciones en la biometría hemática y pruebas de la función hepática. **Sistema Nervioso Central:** Dolor de cabeza, alteración del gusto.

**Alteraciones del Sistema sanguíneo y Linfático:** Anemia reversible, leucopenia, trombocitopenia, pancitopenia. **Alteraciones Oculares:** En periodos superiores a 28 días el uso de linezolid puede relacionarse con neuropatía óptica y a veces progresar hasta la pérdida de la visión. **Alteraciones del sistema inmune:** Anafilaxia. **Metabolismo y Nutrición:** Acidosis láctica. **Sistema Nervioso Central:** Neuropatía periférica, convulsiones. **Alteraciones de la Piel y Tejido Subcutáneo:** Erupción cutánea, angioedema.

### Contraindicaciones

Linezolid está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a Linezolid o a cualquiera de los otros componentes del producto. Inhibidores de la monoaminoxidasa: Linezolid no debe usarse en pacientes que toman productos medicinales que inhiban la monoaminoxidasa A o B (p. ej., fenelzina, isocarboxazida) ni en las dos semanas siguientes al uso de estos productos medicinales.

### Interacciones

**Aumento de la presión sanguínea:** Los pacientes deben estar vigilados para detectar posible aumento de la presión sanguínea. Linezolid no debe administrarse a pacientes con hipertensión descontrolada con feocromocitoma, tirotoxicosis. El uso concomitante de medicamentos simpaticomimético de acción directa o indirecta. (seudoefedrina, fenilpropanolamina), agentes vasoconstrictores (efedrina, noradrenalina) y dopaminérgicos (dopamina, dobutamina). **Interacciones serotoninérgicas potenciales:** Linezolid no debe administrarse a pacientes con síndrome carcinoide ni a aquellos que toman cualquiera de los medicamentos siguientes: inhibidores de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, agonistas del receptor 5-HT1 para serotonina (triptanos), meperidina o buspirona.

### Presentaciones

Bolsa overwrap blanco/negro de polietileno de baja densidad conteniendo una bolsa overwrap transparente de polietileno de mediana densidad que contiene una bolsa con 300 mL de solución e instructivo anexo.

Debido a la longitud de la información para prescribir de este producto, no se ha incluido en su totalidad. Pero está a su disposición en la página web de FRESenius KABI MÉXICO S.A. DE C.V. Visítenos en: <https://www.fresenius-kabi.com/mx/products/invionezo-linezolid>



Fresenius Kabi México S.A. de C.V.  
Av. Paseo del Norte 53000-A  
Col. San Juan de Ocotán C.P. 45010 Zapopan,  
Jalisco, México  
Servicio a Clientes: 800 112 2212  
[www.fresenius-kabi.com.mx](http://www.fresenius-kabi.com.mx)

IV LIN 05/2024 V-01  
Registro Sanitario No. 246M2017 SSA, IV  
**Aviso COFEPRIS No: 2414102002C00161**  
*Medicamentos de confianza*