



NE 06/2024 V-02
Fresenius Kabi México S.A. de C.V.
Paseo del Norte 5300-A
Col. San Juan de Ocotlán
Zapopan, Jalisco, C.P. 45010
Servicio a Clientes: 8001122212
www.fresenius-kabi.com.mx

www.unidosporlanutricionclinica.mx



Nutrición Enteral



Descripción		Fórmulas estándar					Fórmulas especializadas					Polvos					
																	
		Fresubin®	Fresubin® Fibra	Fresubin® PLS	Frebini®	Fresubin® –RNL	Fresekabi® D	Supportan® DKN	Fresubin® HPC	Diben–HPC	Survimed® OPD	Fresupport RNL®	Fresubin® Polvo	Frebini®	BYN Fórmula Equilibrada®	Protebyn	KabiGmine® OX
		Dieta polimérica sin fibra.	Dieta polimérica con fibra.	Dieta polimérica sin fibra hipercalórica.	Dieta polimérica sin fibra hipercalórica para niños de 1 a 12 años.	Dieta polimérica hipercalórica baja en proteínas y electrolitos	Dieta polimérica sin fibra baja en carbohidratos, adicionada con omega–3 y antioxidantes.	Dieta polimérica con fibra hipercalórica.	Dieta hipercalórica, hiperproteica, sin fibra.	Dieta polimérica hipercalórica baja en carbohidratos con fibra, EPA y DHA.	Fórmula semielemental con hidratos de carbono, proteínas, lípidos y micronutrientes, sin fibra.	Dieta polimérica con fibra para pacientes que requieren de proteínas y electrolitos, polvo.	Dieta polimérica sin fibra, polvo.	Dieta polimérica sin fibra hipercalórica para niños de 1 a 12 años, polvo.	Dieta polimérica a base de caseinato de calcio, grasas, vitaminas y minerales.	Dieta modular a base de caseinato de calcio.	Dieta Modular (Glutamina, Vitaminas, Antioxidantes y Oligoelementos).
Contribuye a una buena nutrición en:		• Desnutrición. • Riesgo de desnutrición • Anorexia. • Geriatria. • Pre y postcirugía. • Problemas gastrointestinales. • Problemas de masticación y deglución.	• Anorexia. • Desnutrición. • Problemas gastrointestinales. • Problemas de masticación y deglución. • Pacientes pre y postoperato–rios. • Geriatria. • Quemaduras. • Pérdida de conciencia.	• Desnutrición. • Pérdida de peso. • Anorexia. • Geriatria. • Pre y post–cirugía. • Problemas de masticación y deglución. • Cardiopatías.	• Riesgo de desnutrición. • Desnutrición. • Pérdida de peso. • Anorexia. • Dificultad para masticar y deglutir. • Post–cirugía.	• Pacientes con restricción proteica y alta ingesta calórica. • Riesgo de desnutrición. • Pacientes en terapia conservadora renal (para asegurar el aporte calórico diario sin impactar a nivel proteico y de electrolitos).	• Pacientes con intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus tipo 1 y 2. • Pacientes con hiperglucemia inducida por estrés.	• Pacientes que requieren una dieta polimérica con fibra hipercalórica, hiperproteica, baja en hidratos de carbono, con omega 3 y antioxidantes (Oncológicos, con EPOC, con pérdida de peso involuntaria y otras enfermedades catabólicas).	• Pacientes en terapia intensiva. • En riesgo de desnutrición. • Con elevadas necesidades energéticas y proteicas o restricción de líquidos, que requieren una dieta baja en fibra.	• Pacientes con o en riesgo de desnutrición relacionada con una enfermedad, en particular con intolerancia a la glucosa, como en: • Resistencia a la insulina debido a enfermedades agudas o crónicas. • Diabetes mellitus.	Para el tratamiento dietético de pacientes en terapia intensiva, en particular con problemas de malabsorción intestinal, con riesgo de desnutrición.	• Pérdidas proteínicas importantes, así como recuperación especializada de electrolitos para el paciente con Enfermedad Renal Crónica en terapia de reemplazo renal (diálisis y/o hemodiálisis).	• Riesgo de desnutrición • Anorexia. • Problemas de masticación y deglución. • Pacientes pre y postoperatorios. • Geriatria. • Quemaduras. • Pérdida de conciencia	• Niños de entre 1 a 12 años de edad con necesidades especiales de nutrientes y requerimientos elevados de energía. • Alteraciones de la deglución, digestión y absorción de nutrientes. • Estrés metabólico.	Para cubrir los requerimientos nutricionales o para complementarios. Se recomienda en el apoyo nutricional de las siguientes patologías: • Anorexia. • Desnutrición. • Problemas de masticación y deglución. Estados hipermetabólicos: • Traumatismo, quemaduras, sepsis. • Preparación prequirúrgica y posquirúrgica.	• Pérdidas excesivas de proteínas por heridas, quemaduras, procesos quirúrgicos. • Ingestión baja de proteínas por pérdida de apetito o desnutrición. • Intolerancia a la sacarosa, lactosa, maltosa, proteína de soya. • Para aumentar el contenido de proteínas en dietas para la alimentación oral o en dietas para alimentación enteral. • Coadyuvante en casos de diarrea posquirúrgica gástrica.	Coadyuvante en el tratamiento dietético de pacientes: • Post– quirúrgicos. • Con Fístulas. • Inflamación crónica. • Quemaduras. • Diarreas severas. • Mucositis.
Características		Proporciona 1 kcal/mL. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Distribución energética de acuerdo a la IDR. • Para dietas bajas en sodio. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Contiene derivados de trigo,leche y soya. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/mL. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Distribución energética de acuerdo a la IDR. • Para dietas bajas en sodio. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Mejora los movimientos intestinales por su contenido de fibra. • Fácil manejo. • Contiene derivados de trigo, leche y soya. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/mL. • Ideal para requerimientos altos de energía. • Para dietas restringidas en líquidos (mayor concentración de energía en un volumen reducido). • Distribución energética de acuerdo a la IDR. • Para dietas bajas en sodio. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Contiene derivados de trigo, leche y soya. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/mL. • Ideal para niños que requieren un aporte alimenticio extra. • Para dietas restringidas en líquidos y anorexia (mayor concentración de energía en un volumen reducido). • Enriquecido con Inositol, Carnitina y Taurina. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 2 kcal/mL. • Baja en aporte proteico: 6g/200mL. • Clínicamente libre de lactosa. • Contiene Omega 3. • 1 ración aporta el 20% de la IDR de macronutrientes recomendados en pacientes con ERC. • Ideal para pacientes con síntomas de anorexia. • Fácil digestión – 500mOsm/L. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/mL. • Disminuye el riesgo de desnutrición en el paciente diabético. • Mejora el control glucémico y la hiperlipidemia comparado con dietas con mayor contenido de hidratos de carbono. • Favorece la disminución de triglicéridos en plasma. • Facilita el sano funcionamiento intestinal. • Mejor tolerancia al estar libre de lactosa y gluten. • Ofrece protección contra el daño celular causado por radicales libres. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/mL. • Alto contenido en proteínas y bajo en carbohidratos. • Con TCM para una fácil absorción. • Rico en omega–3 (EPA y DHA) para mejorar el control glucémico y la sensibilidad a la insulina , con aceite de pescado para la protección cardiovascular. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 2 kcal/mL. • Alto contenido en lípidos y proteínas. • Aporte óptimo de Vitamina D ₃ , 10 µg (400 UI) por cada 200 mL. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para dietas restringidas en líquidos y falta de apetito (mayor concentración de energía en un volumen reducido). • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/mL. • Libre de gluten, lactosa y purina, bajo en colesterol y sodio. • Rico en ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) para mejorar el control glucémico y la sensibilidad a la insulina , con aceite de pescado para la protección cardiovascular. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Con TCM para una fácil absorción. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/mL. • Proteína de alto valor nutricional con fácil digestión y absorción. • Con TCM para una fácil absorción. • Fácil administración a través de sondas de alimentación por su presentación líquida. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/mL. • Contiene Omega 3. • Sin olor ni sabor, lo que permite combinarse con alimentos salados o dulces. • En dosis correcta, eleva niveles de albúmina y prealbúmina sérica. • Previene y recupera del Desgaste Energético–Proteico. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1 kcal/mL. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Distribución energética de acuerdo a la IDR. • Para dietas bajas en sodio. • Libre de lactosa, gluten y colesterol. • Fácil manejo en hospitales y en casa. • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc.). • Reconstituido equivale a siete latas líquidas. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Proporciona 1.5 kcal/mL. • Ideal para niños que requieren un aporte alimenticio extra. • Para dietas restringidas en líquidos y anorexia (mayor concentración de energía en un volumen reducido). • Enriquecido con Inositol, Carnitina y Taurina. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc). • Reconstituido equivale a seis latas líquidas. • Para administración vía oral y/o por sonda.	• Ideal para requerimientos altos de proteínas. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Reducida en sodio. • Libre de lactosa, gluten y colesterol • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc). • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	• Ideal para requerimientos altos de proteínas. • Ideal para dosificar según los requerimientos. • Fácil absorción. • Libre de lactosa, gluten y colesterol • Puede mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, caldos, etc). • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.	Contiene 10 g de glutamina por sobre. • Con vitaminas (C, E y β–caroteno) y minerales (Selenio y Zinc). • No contiene grasa, por lo que mejora la tolerancia durante la alimentación post–cirugía. • Puede ser mezclado con otros alimentos. • Fácil manejo en hospital y en casa. • Para administración vía oral y/o por sonda.
Sabores		Fresa Vainilla Chocolate Nuez	Fresa Vainilla Chocolate	Fresa Vainilla Chocolate	Fresa Vainilla Chocolate	Vainilla	Moka Fresa Capuchino	Frutas tropicales Capuchino	Frutos del bosque	Capuchino	Vainilla	Natural	Fresa Vainilla Chocolate	Fresa Vainilla	Natural Fresa Vainilla Chocolate	Natural	Naranja
Presentación		Lata con 236 ml	Lata con 236 ml	Lata con 236 ml	Lata con 236 ml	Botella con 200 ml	Lata con 236 ml	Botella con 200 ml	Botella con 200 ml	Botella con 200 ml	Botella con 200 ml	Bote con 454 g	Bote con 400 g	Bote con 454 g	Bote con 454 g	Bote con 100 g	Sobre con 22.4 g, Caja con 30 sobres
Información Nutricional	Energía	241.7 kcal	249.1 kcal	350 kcal	351 kcal	400 kcal	236 kcal	300 kcal	400 kcal	300 kcal	200 kcal	275.5 kcal	250.3 kcal	354.2 kcal	250 kcal	378 kcal	80 kcal
	Kcal/ml	1	1	1.5	1.5	2	1	1.5	2	1.5	1	1	1	1.5	1	–	–
	Carbohidratos	(53.8%)* 32.50 g	(55.9%)* 34.80 g	(56.3%)* 49.26 g	(50.0%)* 43.70 g	(52%)* 52.8 g	(37.0%)* 28.13 g	(33.0%)* 23.2 g	(45.0%)* 45.0 g	(35.0%)* 26.2 g	(56.4%)* 28.2 g	(16.7%)* 21.6 g	(56.9%)* 35.65 g	(54.0%)* 47.8 g	(64.0%)* 40.8 g	–	9.6 g
	Fibra	< 1 g	3 g	< 1 g	< 1 g	(1%)* 2.4 g	6.3 g	3 g	0 g	(3%)* 4.0 g	<0.2 g	13.14 g	0.8 g	0.2 g	–	–	1.2 g
	Proteínas	(14.6%)* 8.80 g	(14.1%)* 8.80 g	(14.7%)* 12.86 g	(10.0%)* 8.90 g	(6.0%)* 6 g	(18.0%)* 10.62 g	(27.0%)* 20 g	(20.0%)* 20.0 g	(20.0%)* 15.0 g	(18.6%)* 9.3 g	(29.0%)* 20 g	(14.0%)* 8.74 g	(9.9%)* 8.8 g	(17.0%)* 10.5 g	90.0 g	0 g
	Lípidos	(31.6%)* 8.50 g	(30.0%)* 8.30 g	(29.0%)* 11.28 g	(40.0%)* 15.70 g	(40%)* 17.8 g	(45.0%)* 11.80 g	(40.0%)* 13.4 g	(35.0%)* 15.6 g	(42.0%)* 14.0 g	(25.0%)* 5.6 g	(54.3%)* 16.6 g	(29.1%)* 8.08 g	(36.1%)* 14.2 g	(19.0%)* 5.4 g	1.0 g	–
	Agua	–	–	–	–	142 ml	–	152 mL	139 ml	158 ml	170 ml	–	–	–	–	–	–
	Sodio	139.4 mg	139.4 mg	170 mg	178 mg	136 mg	244.7 mg	95 mg	120 mg	140 mg	89.1 mg	17.9 mg	92.41 mg	165 mg	78 mg	–	Zinc – 3.4 mg
	Potasio	328.6 mg	328.6 mg	328.6 mg	246 mg	200 mg	314.9 mg	256 mg	320 mg	260 mg	400 mg	25.4 mg	281.19 mg	328.7 mg	309 mg	–	Selenio – 50 µg
	Taurina	–	–	–	24.78 mg	40 mg	–	–	–	–	–	–	–	24.8 mg	–	–	β –Caroteno – 1.7 mg
	L–Carnitina	–	–	–	7.08 mg	20 mg	–	–	–	–	–	25.4 mg	–	7.1 mg	–	–	Vitamina E – 83.0 mg de α–TE
	M–Inositol	–	–	–	52.9 mg	48 mg	–	–	–	–	–	–	–	53.1 µg	–	–	Vitamina C – 250.0 mg
	ω–3	–	–	–	–	120 mg	401 mg	1420 mg	–	108 mg	–	297 mg	–	–	–	–	–
	Glutamina	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10 g
	Osmolaridad *Distribución energética	371 mOsm/l	385 mOsm/l	517 mOsm/l	275 mOsm/l	500 mOsm/l	385 mOsm/l	385 mOsm/l, Frutas tropicales 435 mOsm/l, Capuchino	590 mOsm/l	390 mOsm/l	410 mOsm/l	–	–	–	–	–	–