

Serii numerice rapid convergente

Fie doua serii convergente avand aceeasi suma S

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n = S$$

Care dintre ele converge mai repede?

$$\text{Notam } S_n = \sum_{k=0}^n a_k \text{ si } T_n = \sum_{k=0}^n b_k \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = S \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (S - T_n) = 0$$

DEF : Spunem ca seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge mai repede decat seria $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ daca

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S - S_n}{S - T_n} = 0 \quad (*)$$

OBS : Se poate arata ca daca sirul (a_n) tinde la zero mai repede

decat sirul (b_n) , adica $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$, atunci are loc relatia (*)

(rezulta din criteriul Stolz - Cesaro - cazul 0/0)

$$\text{Ex : } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \text{ si } T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + k}$$

```


S[n_] := Sum[1/2^k, {k, 1, n}]
T[n_] := Sum[1/(k^2 + k), {k, 1, n}]
1. - S[10]
1. - T[10]

```

```
0.000976563
```

```
0.0909091
```

```
DiscretePlot[{1, S[n], T[n]}, {n, 1, 10}, Filling -> None, Joined -> True, PlotRange -> Full]
```



Cum putem construi o serie rapid convergenta pornind de la o serie data ?

Ex : Se da seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

Fie seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n} = 1$

Prin scadere termen cu termen obtinem

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^2 + n} \right) = \frac{\pi^2}{6} - 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + n^2} = \frac{\pi^2}{6} - 1 \Rightarrow$$

$$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3 + k^2} \quad \text{si} \quad T_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$$

`S[n_] := 1 + Sum[1/(k^3 + k^2), {k, 1, n}]`

`T[n_] := Sum[1/k^2, {k, 1, n}]`


`Pi^2/6. - S[10]`

`Pi^2/6. - T[10]`

0.00425724

0.0951663

`DiscretePlot[{Pi^2/6., S[n], T[n]}, {n, 1, 10},
Filling -> None, Joined -> True, PlotRange -> Full]`



Transformarea lui Kummer

Fie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ o serie convergenta ce se doreste a fi accelerata, iar

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ o serie convergenta avand suma cunoscuta C si cu proprietatea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{c_n} = r \in (0, +\infty)$$

Atunci seria

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = rC + \sum_{n=0}^{\infty} (b_n - rc_n) \text{ converge mai repede decat seria initiala}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n, \text{ spre aceeaasi suma } S.$$

Ex : Sa acceleram convergenta seriei

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{2n+1} = 4 \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \right) =$$

$$4 \left(1 - \frac{1}{3} \right) + 4 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{7} \right) + \dots = \frac{8}{1 \cdot 3} + \frac{8}{5 \cdot 7} + \frac{8}{9 \cdot 11} + \dots =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(4n+1) \cdot (4n+3)} = \frac{8}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{(4n+1) \cdot (4n+3)}$$

Utilizam seria cunoscuta de la seminar $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} = \frac{1}{2}$

Cu notatiile din transformare avem $C = \frac{1}{2}$ si $r = 2$, deci seria

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \frac{11}{3} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{32n+14}{(2n-1) \cdot (2n+1) \cdot (4n+1) \cdot (4n+3)}$$

converge mai repede spre suma S .

Ce valoare are S ?

Serii numerice remarcabile

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e \quad (\text{rapid})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{n! (1 + n^2 + n^4)} = e \quad (\text{rapid})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = \ln(2) \quad (\text{lent})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} = \ln(2) \quad (\text{rapid})$$

$$\frac{3}{2} + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(2n-3)!!}{(2n)!!} = \sqrt{2} \quad (\text{lent})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!}{2^{3n+1} (n!)^2} = \sqrt{2} \quad (\text{rapid})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{4}{2n+1} = \pi \quad (\text{lent})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{16^n} \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6} \right) = \pi \quad (\text{rapid})$$

Cat de repede converge utima serie ?

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{16^k} \left(\frac{4}{8k+1} - \frac{2}{8k+4} - \frac{1}{8k+5} - \frac{1}{8k+6} \right)$$

```

S[n_] := Sum[16^(-k) * (4 / (8*k + 1) - 2 / (8*k + 4) - 1 / (8*k + 5) - 1 / (8*k + 6)), {k, 0, n}]
N[S[1], 10]
N[S[3], 10]
N[S[5], 10]
N[Pi, 15]

```

```
3.141422466
```

```
3.141592458
```

```
3.141592653
```

```
3.14159265358979
```

```
3.141592653589793
```

Formule pentru π

```
Hyperlink["Pi Formulas", "https://mathworld.wolfram.com/PiFormulas.html"]
```

```
Pi Formulas
```