PCA of Environmental Variables (11 clusters)

log1p−transformed nutrients + scaled; 9 variables



PCA of Environmental Variables (points only)




Temperature (°C)
Temperature (°C)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Salinity (PSU)
Salinity (PSU)
27
29
31
DO (µmol/kg)
DO (µmol/kg)
300
350
400
NO3 (µM)
NO3 (µM)
0
5
10
15
FIECO−AFL (mg/m³)
FIECO−AFL (mg/m³)
0
5
10
15
20
Chl a (µg/l)
Chl a (µg/l)
5
10
15
20
25
NH4 (µM)
NH4 (µM)
0
1
2
3
4
5
Sampling depth (m)
Sampling depth (m)
10
20
30
40
50
PC1 (48.1%)
PC2 (20.7%)
−5.0
−2.5
0.0
2.5
2
0
−2
−4


PCA − dot size: Temperature (°C)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
Temperature (°C)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2


PCA − dot size: Salinity (PSU)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
Salinity (PSU)
27
29
31
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2


PCA − dot size: DO (µmol/kg)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
DO (µmol/kg)
300
350
400
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2


PCA − dot size: NO3 (µM)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
NO3 (µM)
0
5
10
15
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2


PCA − dot size: FIECO−AFL (mg/m³)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
FIECO−AFL (mg/m³)
0
5
10
15
20
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2


PCA − dot size: Chl a (µg/l)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
Chl a (µg/l)
5
10
15
20
25
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2


PCA − dot size: NH4 (µM)
PC2 (20.7%)
PC1 (48.1%)
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
Cluster
A1
A2
B1
B2a
B2b
C1a
C1b1
C1b2
C2a
C2b1
C2b2
NH4 (µM)
0
1
2
3
4
5

PCA − dot size: Sampling depth (m)