Unit CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES	CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DISCIPLINA/TURMA: F101060 – ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL - E01 PROFESSOR: 019560 - JONATAS DA SILVA JUNIOR	NOTA: 6,5

VERIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO:	1ª	2ª	Supletiva	Final

DISCENTE: Matheus Machado Ramos DATA: 01 10 2024

52 ~ 4
4 de Casla

1. O que representa a mediana?

a) O valor que mais se repete.
X) O valor central dos dados ordenados.
c) A média ponderada.
d) A soma dos valores dividida pelo total.
e) O menor valor do conjunto.

2. A amplitude de um conjunto de dados é:

a) A diferença entre média e moda.
X) A diferença entre o maior e o menor valor.
c) O desvio padrão.
d) A soma de todos os valores.
e) O intervalo interquartílico.

3. A probabilidade condicional P(A|B) significa:

X) A probabilidade de A acontecer dado que B ocorreu.
b) A soma das probabilidades de A e B.
c) Sempre a probabilidade de B.
d) A independência entre A e B.
e) A probabilidade de nenhum ocorrer.

4. O que é o espaço amostral em um lançamento de duas moedas?

a) {C, K}
X) {CC, CK, KC, KK}
c) {0,1}
d) {1,2}
e) Apenas os resultados favoráveis.

5. Em termos de interpretação, o desvio-padrão mede:

a) A variação conjunta de duas variáveis.
b) A dispersão média em torno da média.
c) A tendência central.
d) A probabilidade de um evento.
e) O valor central.

6. A covariância próxima de zero indica que:

a) Existe forte correlação positiva.
b) Existe forte correlação negativa.
c) Não há relação linear clara entre as variáveis.
d) Uma variável determina a outra.
e) As variáveis são mutuamente exclusivas.

Unit CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES	**CURSO:** CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO **DISCIPLINA/TURMA:** F101060 – ESTATÍSTICA COMPUTACIONAL - E01 **PROFESSOR:** 019560 - JONATAS DA SILVA JUNIOR				**NOTA**
VERIFICAÇÃO DE CONHECIMENTO:	1ª	2ª	Supletiva	Final	
DISCENTE: Matheus Machado Ramos				**DATA:** 01 10	20

7. (Cálculo)

Dados: [2, 4, 6, 8, 10].

a) Calcule a média e a mediana.

b) Calcule a variância populacional e o desvio-padrão populacional.

8. (Cálculo)

Quantos arranjos simples de 3 elementos podem ser feitos a partir de 15 observações?

Texto formativo:

O monitoramento de tempos de login em sistemas computacionais fornece informações valiosas sobre o desempenho da infraestrutura de rede. Quando há valores muito discrepantes, como picos de lentidão, os quartis ajudam a separar o comportamento típico do atípico. O IQR permite avaliar a estabilidade da maioria dos usuários, sem que valores extremos prejudiquem a interpretação.

9. (Cálculo)

0 1 2 3 4 5 6 7

Conjunto de dados: [2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15].

a) Calcule Q1, Q2 e Q3.

b) Encontre o IQR.

7-)

a) $\frac{2+4+6+8+10}{5} = \frac{30}{5} = 6$ 2,0

- Média = 6
- Mediana = 6 → dado do meio

b) Variância = 8

$6-2=4$ $\quad 4^2+2^2+0^2+(-2)^2+(-4)^2=40$

$6-4=2$ $\quad \frac{40}{5}=8$

$6-6=0$

$6-8=-2$

$6-10=-4$

desvio-Padrão

$\sqrt{8} \approx 2,83$

8-) $\frac{15!}{3(15-3)!} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{12?} = \frac{2?3}{12}$

$= 228$

a ordem importa