

Lösungen PVK Analysis

MB & LB, Vorlage gemäss SeSc

January 2, 2018

Die Verweise auf Theoreme und Propositionen beziehen sich auf das Skript der Vorlesung, welches Sie *hier* finden können. Die Verweise auf Serien beziehen sich auf das HS 15. Es handelt sich bei dieser Übungssammlung um eine überarbeitete Version der von SeSc zur Verfügung gestellten Vorlage.

1 sup, inf, max, min von Mengen

Aufgabe 1. Berechnen Sie das Supremum (kleinste obere Schranke) der Menge:

$$S := \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}_0 \right\} = \left\{ \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots \right\}.$$

Was gilt für das Supremum der Menge $M := S \cup \{1\}$?

Solution:

Um zu zeigen, dass eine reelle Zahl M die kleinste obere Schranke einer Menge S ist, geht man normalerweise in 2 Schritten vor.

1. Zeige, dass M eine obere Schranke von S ist, i.e. zeige, dass $M \geq s$ für alle $s \in S$.
2. Zeige, dass M die kleinste obere Schranke von S ist. Meist geschieht dies per Widerspruch, man nimmt an, dass ein $\epsilon > 0$ existiert, sodass $M - \epsilon$ nach wie vor eine obere Schranke von S ist. Man findet dann ein Element $s \in S$ mit $s > M - \epsilon$, was zeigt, dass $M - \epsilon$ keine obere Schranke von S ist.

Wir stellen nun fest, dass jedes Element $s \in S$ kleiner als 1 ist, da $\frac{n}{n+1} < 1$. Wir behauptet, dass 1 das Supremum der Menge ist. Nehme zum Widerspruch an, dass 1 nicht die kleinste obere Schranke von S ist, d.h. es existiert $\epsilon > 0$ sodass $1 - \epsilon$ auch eine obere Schranke von S ist.

Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$ sodass $n > \frac{1}{\epsilon} - 1$, dann gilt $1 - \epsilon < \frac{n_0}{n_0+1}$ was zeigt, dass $1 - \epsilon$ keine obere Schranke von S ist, da $\epsilon > 0$ beliebig war, muss 1 die kleinste obere Schranke von S sein.

Unsere Bemühungen lassen nun schliessen, dass $\sup M = \max M = 1$ gelten muss, da 1 das Supremum der Menge S ist und insbesondere gilt $1 \in M$.

Aufgabe 2. Es sei $A \subset \mathbb{R}$ und $A \neq \emptyset$, desweiteren definieren wir $-A := \{x \in \mathbb{R} : -x \in A\}$. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

- i.) A unbeschränkt $\iff \sup A = \infty$.
- ii.) A ist endlich $\implies \max A = \sup A$.
- iii.) $\min A$ existiert $\implies \min A = -\max(-A)$.
- iv.) $\sup A \notin A$.

Solution:

- i.) Falsch, Gegenbeispiel $A = (-\infty, 0]$ ist unbeschränkt, aber $\sup A = 0$.
- ii.) Wahr.
- iii.) Wahr. Sei $x \in A$, dann gilt $-x \in -A$. Damit $x = -(-x) \geq -\max(-A)$. Da $-\max(-A) \in A$, folgt die Aussage.
- iv.) Falsch. $A = \{42\}$. Dann ist $\sup A = 42 \in A$.

Aufgabe 3. Finden Sie das \max , \min , \sup und \inf der folgenden Menge und beweisen Sie ihre Aussage.

$$S := \left\{ \frac{2n+1}{n+1} : n \in \mathbb{N}_{\geq 1} \right\} = \left\{ \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{7}{4}, \frac{9}{5}, \frac{11}{6}, \dots \right\}.$$

Solution:

Der kleinste Term scheint $\frac{3}{2}$ zu sein und es scheint kein grösstes Element zu geben, aber alle Elemente sind kleiner als 2 und da $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2$ behaupten wir folgende Aussagen:

- a) Es gibt kein Maximum, b) $\sup S = 2$ und c) $\min S = \inf S = \frac{3}{2}$.

Wir beginnen mit dem Supremum, können wir nämlich zeigen, dass $\sup S = 2$ dann kann S kein Maximum besitzen, da $2 \notin S$. Es gilt offensichtlich

$$\frac{2n+1}{n+1} < 2 \iff 2n+1 < 2n+2 \iff 1 < 2.$$

Da diese Aussage immer wahr ist, folgern wir, dass 2 in der Tat eine obere Schranke von S ist. Nun zeigen wir, dass 2 die kleinste obere Schranke von S ist. Falls 2 nicht die kleinste obere Schranke von S wäre, so würde $\epsilon > 0$ existieren sodass $2 - \epsilon$ eine obere Schranke von S ist. Wir behaupten, es existiert eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ sodass

$$2 - \epsilon < \frac{2n+1}{n+1}$$

gilt und somit $2 - \epsilon$ keine obere Schranke von S ist. Es gilt jedoch offensichtlich

$$2 - \epsilon < \frac{2n+1}{n+1} \iff -\epsilon < \frac{2n+1}{n+1} - 2 \iff \epsilon > \frac{1}{n+1} \iff n > \frac{1}{\epsilon} - 1$$

Wählen wir also $n \in \mathbb{N}$ sodass $n > \frac{1}{\epsilon} - 1$, dann gilt $2 - \epsilon < \frac{2n+1}{n+1}$, somit haben wir gezeigt, dass $\sup S = 2$. Um etwas präziser zu zeigen, dass $2 \notin S$ gilt, nehmen wir an, dass eine natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}$ existiert sodass

$$2 = \frac{2n+1}{n+1} \iff 2(n+1) = 2n+1 \iff 2 = 1$$

was natürlich ein Widerspruch ist, also $2 \notin S$ und somit existiert kein Maximum.

Schliesslich zeigen wir, dass $\min S = \frac{3}{2}$. Offensichtlich gilt $\frac{3}{2} \in S$. Es genügt also zu zeigen, dass $\frac{3}{2}$ eine untere Schranke von S ist, wir haben aber offensichtlich

$$\frac{2n+1}{n+1} \geq \frac{3}{2} \iff 2(2n+1) \geq 3(n+1) \iff n \geq 1$$

Was natürlich wahr ist für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ wie in der Menge von S spezifiziert, also gilt $\min S = \frac{3}{2}$.

Aufgabe 4. Es sei $S := (1, 5]$. Beweisen Sie, dass $\inf S = 1$.

Solution:

Per Definition von S erfüllt jedes $x \in S$ die Ungleichung $1 < x \leq 5$ und somit ist 1 natürlich eine untere Schranke von S . Wir wollen zeigen, dass 1 die grösste untere Schranke von S ist, insbesondere bedeutet dies das Wort "offensichtlich" möglichst zu vermeiden.

Wir nehmen also an, dass 1 nicht die grösste untere Schranke von S ist, dann existiere ein $\epsilon > 0$ sodass $1 + \epsilon$ eine untere Schranke von S ist. Um ein Widerspruch zu erhalten finden wir ein element $x \in S$ sodass $1 < x < 1 + \epsilon$, was zeigt, dass $1 + \epsilon$ keine untere Schranke von S sein kann.

Wir wählen $x = 1 + \frac{\epsilon}{2}$, dann gilt offensichtlich

$$1 < x < 1 + \epsilon \leq 5$$

da per Annahme $1 + \epsilon$ eine untere Schranke von S war. Also ist $1 + \epsilon$ keine untere Schranke von S und somit haben wir gezeigt, dass 1 die grösste untere Schranke von S ist.

2 Vollständige Induktion

Aufgabe 5.

i.) Beweisen Sie die Bernoulli-Ungleichung:

$$\forall x > -1, \forall n \in \mathbb{N} : (1+x)^n \geq 1+nx.$$

mittels Induktion.

ii.) Seien $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ und $x_1, \dots, x_n \geq 0$. Zeigen Sie:

$$\prod_{i=1}^n (1+x_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n x_i.$$

Solution:

i.) Sei $x > -1$. Zuerst zeigen wir den Fall $n = 0$.

$$(1+x)^0 = 1 = 1 + 0 \cdot x.$$

Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ beliebig, aber fix, sodass $(1+x)^n \geq 1+nx$ (IA).

Dann berechnen wir

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)(1+x)^n \stackrel{\text{IA}, x > -1}{\geq} (1+x)(1+nx) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x.$$

ii.) Zuerst zeigen wir den Fall $n = 2$. Seien $x_1, x_2 \geq 0$.

$$\prod_{i=1}^2 (1+x_i) = 1 + (x_1 + x_2) + x_1 \cdot x_2 \stackrel{x_1, x_2 \geq 0}{\geq} 1 + (x_1 + x_2) = 1 + \sum_{i=1}^2 x_i.$$

Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ beliebig, aber fix, sodass $\prod_{i=1}^n (1+x_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n x_i$ für alle $x_1, \dots, x_n \geq 0$ (IA).

Dann berechnen wir für $x_1, \dots, x_{n+1} \geq 0$

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{n+1} (1+x_i) &= (1+x_{n+1}) \cdot \prod_{i=1}^n (1+x_i) \stackrel{\text{IA}}{\geq} (1+x_{n+1}) \left(1 + \sum_{i=1}^n x_i\right) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{n+1} x_i + x_{n+1} \cdot \sum_{i=1}^n x_i \stackrel{x_i \geq 0}{\geq} 1 + \sum_{i=1}^{n+1} x_i. \end{aligned}$$

Aufgabe 6. Zeigen Sie, dass:

$$\frac{4^{2n} - 3^n}{13} \in \mathbb{N}.$$

für alle $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

Solution:

Zuerst zeigen wir den Fall $n = 1$.

$$\frac{4^2 - 3^1}{13} = \frac{13}{13} = 1 \in \mathbb{N}.$$

Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ beliebig, aber fix, sodass $\frac{4^{2n}-3^n}{13} \in \mathbb{N}$.
Dann berechnen wir

$$\frac{4^{2(n+1)} - 3^{(n+1)}}{13} = \frac{4^2(4^{2n} - 3^n)}{13} + \frac{(4^2 - 3)3^n}{13} = 4^2 \underbrace{\frac{4^{2n} - 3^n}{13}}_{\in \mathbb{N} \text{ nach IA}} + 3^n \in \mathbb{N}.$$

Aufgabe 7.

- i) Zeigen Sie, dass der kleinste, nicht triviale Teiler einer natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ stets eine Primzahl ist. Hier ist keine vollständige Induktion notwendig, ein Beweis per Widerspruch genügt völlig.
- ii) Zeigen Sie, dass jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ als Produkt von Primzahlen in der kanonischen Form $n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$, wobei $p_1 < p_2 < \cdots < p_k \in \mathbb{P}$ und $a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}_0$, geschrieben werden kann. Diese Darstellung ist desweiteren eindeutig, dies muss jedoch nicht gezeigt werden.

Solution:

- i) Zum Widerspruch sei d_0 der kleinste, nicht triviale Teiler von $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ ohne dabei eine Primzahl zu sein. Da nun d_0 keine Primzahl ist, existiert per Definition eine Zahl v wobei $1 < v < d_0$ sodass $v \mid d_0$, per Transitivität gilt dann aber auch $v \mid n$ da bereits $d_0 \mid n$. Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, dass d_0 der kleinste, nicht triviale Teiler von n war.
- ii) Für $n = 2$ ist n eine Primzahl und die Aussage somit trivial Wahr. Für den Induktionsschritt nehmen wir an, dass wir für jede natürliche Zahl $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ die Darstellung $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ wie in der Aufgabenstellung haben. Falls nun $n+1$ eine Primzahl ist, so gibt es nicht zu zeigen, ist $n+1$ jedoch keine Primzahl so muss gelten $n+1 = mq$ wobei $1 < m \leq q \leq n$, aber für solche Zahlen haben wir per Induktionsannahme kanonische Darstellungen der Form $m = p_1^{b_1} \cdots p_k^{b_k}$ und $q = s_1^{c_1} \cdots s_l^{c_l}$ haben wobei $p_1 < \cdots < p_k$ und $s_1 < \cdots < s_l$ alle Primzahlen sind und die Exponenten natürliche Zahlen. Zusammenfassen der Primzahlen und Neuordnung/Neubeschriftung liefert dann die Aussage.

Aufgabe 8 (★ Trig Heavy). Wir definieren die Chebyshev Polynome für alle $x \in \mathbb{R}$ wie folgt:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1. \\ P_1(x) &= x. \\ P_{n+1}(x) &= xP_n(x) - P_{n-1}(x), \text{ für } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass gilt:

$$P_n(2 \cos(\theta)) = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin(\theta)}, \quad \theta \in (0, \pi).$$

Solution:

Wir zeigen die beiden Fälle $n = 0$ und $n = 1$, da wir in dem Induktionsschritt sowohl $k = n$ und $k = n - 1$ benötigen werden. Für $n = 0$ haben wir die triviale Aussage

$$1 = P_0(2 \cos \theta) = \frac{\sin \theta}{\sin \theta} = 1$$

Für $n = 1$ haben wir die Aussage

$$2 \cos \theta = P_1(2 \cos \theta) = \frac{\sin 2\theta}{\sin \theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{\sin \theta} = 2 \cos \theta$$

Nehmen wir nun an, dass die Aussage für $n = k$ und $n = k - 1$ für $k > 0$ wahr ist, i.e. wir haben die beiden Gleichungen

$$P_k(2 \cos \theta) = \frac{\sin((k+1)\theta)}{\sin \theta}, \text{ und } P_{k-1}(2 \cos \theta) = \frac{\sin(k\theta)}{\sin \theta}$$

Per Definition von P_{k+1} haben wir nun

$$\begin{aligned} P_{k+1}(2 \cos \theta) &= 2 \cos \theta P_k(2 \cos \theta) - P_{k-1}(2 \cos \theta) \\ &= 2 \cos \theta \frac{\sin((k+1)\theta)}{\sin \theta} - \frac{\sin(k\theta)}{\sin \theta} \end{aligned}$$

Wir schreiben $k\theta = (k+1)\theta - \theta$ und erhalten

$$\begin{aligned} P_{k+1}(2 \cos \theta) &= \frac{2 \cos \theta \sin((k+1)\theta) - \sin((k+1)\theta - \theta)}{\sin \theta} \\ &= \frac{2 \cos \theta \sin((k+1)\theta) - \cos \theta \sin((k+1)\theta) + \cos((k+1)\theta) \sin \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\cos \theta \sin((k+1)\theta) + \cos((k+1)\theta) \sin \theta}{\sin \theta} \\ &= \frac{\sin((k+2)\theta)}{\sin \theta} \end{aligned}$$

Aufgabe 9. (★) Sei $n \in \mathbb{N}$ und $a_{jk} \in \mathbb{C}$ für $j = 0, \dots, n+1$, $k = 0, \dots, n$. Zeigen Sie, dass:

$$\sum_{j=0}^{n+1} \sum_{k=0}^n a_{jk} = \sum_{0 \leq j \leq k \leq n} a_{jk} + \sum_{0 \leq k < j \leq n+1} a_{jk}.$$

Solution:

Sei zuerst $n = 0$. Dann erhalten wir einfach

$$\sum_{j=0}^{n+1} \sum_{k=0}^n a_{jk} = a_{00} + a_{10} = \sum_{0 \leq j \leq k \leq n} a_{jk} + \sum_{0 \leq k < j \leq n+1} a_{jk}.$$

Nehmen wir nun an, dass die Formel für ein $n \in \mathbb{N}$ gültig ist. Dann gilt

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{n+2} \sum_{k=0}^{n+1} a_{jk} &= \sum_{j=0}^{n+2} \left(\sum_{k=0}^n a_{jk} + a_{j,n+1} \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n+1} \left(\sum_{k=0}^n a_{jk} + a_{j,n+1} \right) + \left(\sum_{k=0}^n a_{n+2,k} + a_{n+2,n+1} \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n+1} \sum_{k=0}^n a_{jk} + \sum_{j=0}^{n+1} a_{j,n+1} + \sum_{k=0}^{n+1} a_{n+2,k} \\ &= \sum_{0 \leq j \leq k \leq n} a_{jk} + \sum_{0 \leq k < j \leq n+1} a_{jk} + \sum_{j=0}^{n+1} a_{j,n+1} + \sum_{k=0}^{n+1} a_{n+2,k} \\ &= \sum_{0 \leq j \leq k \leq n+1} a_{jk} + \sum_{0 \leq k < j \leq n+2} a_{jk}. \end{aligned}$$

womit der Induktionsschritt gezeigt wäre.

3 Folgen

Aufgabe 10. Seien $(x_i)_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ und $x \in \mathbb{R}$.

- i.) Zeigen Sie, falls jede Teilfolge $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge $(x_{n_{i_j}})_{j \in \mathbb{N}}$ besitzt, die gegen x konvergiert, dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.
- ii.) Finden Sie eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ so, dass für jede Teilfolge $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ eine konvergente Teilfolge $(x_{n_{i_j}})_{j \in \mathbb{N}}$ existiert, aber $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nicht konvergiert.

Solution:

i.) Version 1

Seien $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $x \in \mathbb{R}$ wie in der Aufgabenstellung. Wir nehmen an, dass $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ nicht gegen x konvergiert, d.h.

$$\exists \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N : |x_n - x| \geq \epsilon.$$

Wir wählen ein $\epsilon > 0$ und eine Teilfolge $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$, sodass für alle $i \in \mathbb{N}$ gilt $|x_{n_i} - x| \geq \epsilon$. Dies ist ein Widerspruch dazu, dass eine Teilfolge $(x_{n_{i_j}})_{j \in \mathbb{N}}$ existiert mit $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{n_{i_j}} = x$.

Version 2

Wir wissen, es gibt Teilfolgen $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$, $(x_{m_i})_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, sodass $\lim_{i \rightarrow \infty} x_{n_i} = \liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$ und $\lim_{i \rightarrow \infty} x_{m_i} = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$. Da jeweils eine Teilfolge von den obigen Reihen gegen x konvergiert und der Limes konvergenter Folgen gleich der Limes seiner Teilfolgen ist (Prop. 3.19), gilt $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n = x = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$. Aus Satz 3.13 folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

- ii.) $x_n = (-1)^n$ konvergiert nicht. Sei $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ eine Teilfolge von $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dann ist $A_1 := \{n_i \in \mathbb{N} : n_i \text{ ist ungerade}\}$ oder $A_2 := \{n_i \in \mathbb{N} : n_i \text{ ist gerade}\}$ abzählbar unendlich. Wähle $i \in \{1, 2\}$ sodass A_i unendlich ist, dann ist $(x_l)_{l \in A_i}$ eine konvergente Teilfolge von $(x_{n_i})_{i \in \mathbb{N}}$ (mit Grenzwert $(-1)^i$).

Aufgabe 11. Sei $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$, $z \in \mathbb{C}$. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

- i.) $z_n \rightarrow z \iff \operatorname{Re}(z_n) \rightarrow \operatorname{Re}(z) \text{ und } \operatorname{Im}(z_n) \rightarrow \operatorname{Im}(z)$.
- ii.) $|z_n| \rightarrow |z| \implies z_n \rightarrow z$.
- iii.) $z_n \rightarrow z \implies |z_n| \rightarrow |z|$.
- iv.) $z_n \in \mathbb{R}$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und $z_n \rightarrow z \implies z \in \mathbb{R}$.

Solution:

- i.) Wahr, siehe Seite 53.
- ii.) Falsch, Gegenbeispiel $z_n = (-1)^n, z = i$.
- iii.) Wahr, folgt aus der umgekehrten Dreiecksungleichung und dem Sandwichsatz (Prop 3.8) $0 \leq ||z_n| - |z|| \leq |z_n - z| \rightarrow 0$.
- iv.) Wahr, folgt aus der ersten Aussage.

Aufgabe 12. Seien $m \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^m$ and $\lambda \in \mathbb{R}$. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aufgaben, ob sie wahr oder falsch sind (mit Beweis oder Gegenbeispiel).

- i.) $(\|x_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert $\implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert.
- ii.) $(x_n \cdot y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert $\implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert.
- iii.) $(\lambda x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert $\implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert.
- iv.) Jede beschränkte Folge konvergiert.

Solution:

- i.) Falsch, Gegenbeispiel $x_n = (-1)^n$.
- ii.) Falsch, Gegenbeispiel $x_n = n, y_n = \frac{1}{n}$. Alternativ $x_n = (-1)^n, y_n = 0$.
- iii.) Falsch, Gegenbeispiel $\lambda = 0, x_n = (-1)^n$.
- iv.) Falsch, Gegenbeispiel $x_n = (-1)^n$.

Aufgabe 13. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

- i.)
$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n).$$
- ii.)
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{n-3}\right)^{(n+\sqrt{n})/2}.$$
- iii.)
$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n} - 5n^3}{n^3 + n(n+1)(n+2)}.$$

Solution:

- i.) Für $n > 0$ haben wir

$$\sqrt{n^2 + n} - n = \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1}$$

Damit haben wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}.$$

Also insbesondere

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n) = \frac{1}{2}.$$

- ii.) Wir schreiben

$$\left(1 - \frac{5}{n-3}\right)^{(n+\sqrt{n})/2} = \underbrace{\sqrt{\left(1 - \frac{5}{n-3}\right)^{n-3}}}_{\implies \sqrt{e^{-5}} = e^{-5/2}} \cdot \underbrace{\sqrt{\left(1 - \frac{5}{n-3}\right)^3}}_{\implies \sqrt{1^3} = 1} \cdot \sqrt{\left(1 - \frac{5}{n-3}\right)^{\sqrt{n}}}.$$

Behauptung 1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{n-3}\right)^{\sqrt{n}} = 1.$$

Proof.

$$\log \left(\left(1 - \frac{5}{n-3} \right)^{\sqrt{n}} \right) = \frac{\sqrt{n}}{n-3} \log \left(\left(1 - \frac{5}{n-3} \right)^{n-3} \right) \Rightarrow 0 \cdot \log(e^{-5}) = 0.$$

Damit erhalten wir

$$\left(1 - \frac{5}{n-3} \right)^{\sqrt{n}} = e^{\log \left(\left(1 - \frac{5}{n-3} \right)^{\sqrt{n}} \right)} \Rightarrow e^0 = 1.$$

□

Wenn wir alles zusammensetzen, erhalten wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{n-3} \right)^{(n+\sqrt{n})/2} = e^{-5/2} \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = e^{-5/2}.$$

iii.) Zuerst zeigen wir

Behauptung 2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} - 5n^3}{n^3 + n(n+1)(n+2)} = -\frac{5}{2}.$$

Proof. Wir berechnen

$$\frac{\sqrt{n} - 5n^3}{n^3 + n(n+1)(n+2)} = \frac{\frac{\sqrt{n}}{n^3} - 5}{1 + 1(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n})} \rightarrow -\frac{5}{2}, \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

□

Der Faktor $(-1)^n$ oszilliert zwischen $+1$ und -1 . Teilfolgen mit geraden Gliedern (bis auf endlich viele Glieder) liefern Häufungspunkt $-5/2$. Teilfolgen mit ungeraden Gliedern (bis auf endlich viele Glieder) liefern Häufungspunkt $5/2$. Alle anderen Teilfolgen (unendlich viele gerade und unendlich viele ungerade Glieder) können nicht konvergieren. Da der Limes Inferior der kleinste Häufungspunkt ist, folgt

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n} - 5n^3}{n^3 + n(n+1)(n+2)} = -\frac{5}{2}.$$

Aufgabe 14. Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist.

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ mit Häufungspunkt $h \in \mathbb{R}$.

i.) h ist der Grenzwert von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

ii.) h ist der einzige Häufungspunkt in $\mathbb{R} \Rightarrow a_n \rightarrow h$.

iii.) $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert $\Rightarrow a_n \rightarrow h$.

iv.) Es existiert eine Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, die gegen h konvergiert.

v.) $\forall \epsilon > 0 \forall N \in \mathbb{N} \exists n > N : |a_n - h| < \epsilon$.

Solution:

i.) Falsch, Gegenbeispiel $(-1)^n$ und $h = 1$.

ii.) Falsch, Gegenbeispiel $a_{2n} = 0$, $a_{2n+1} = n$ und $h = 0$.

iii.) Wahr, Kor. 3.17.

iv.) Wahr, Prop. 3.20.

v.) Wahr, das ist die Definition eines Häufungspunktes.

Aufgabe 15. (★)

i.) Berechnen Sie alle Häufungspunkte der Folge:

$$a_n = \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{n+1}.$$

ii.) Seien $a_i > 0$ für alle $i = 1, \dots, p$. Zeigen Sie, dass:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + \dots + a_p^n)^{1/n} = \max_{i=1, \dots, p} a_i.$$

Solution:

i.) Zuerst beobachten wir

$$\left(1 + \frac{3}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n \left(1 + \frac{3}{n}\right) \rightarrow e^3 \cdot 1 = e^3, \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Für $k \in \mathbb{N}$ und $j \in \{1, 3\}$ gilt

$$\sin\left(\frac{2k\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{und} \quad \sin\left(\frac{(4k+j)\pi}{2}\right) = (-1)^{j+1}.$$

Damit sind $0, -e^3$ und e^3 die Häufungspunkte von $\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \left(1 + \frac{3}{n}\right)^{n+1}$.

ii.) Wir berechnen

$$\begin{aligned} \max_{i \in \{1, \dots, p\}} a_i &= \left(\max_{i \in \{1, \dots, p\}} a_i^n \right)^{1/n} \leq (a_1^n + \dots + a_p^n)^{1/n} \leq \left(n \cdot \max_{i \in \{1, \dots, p\}} a_i^n \right)^{1/n} \\ &= n^{1/n} \max_{i \in \{1, \dots, p\}} a_i \rightarrow \max_{i \in \{1, \dots, p\}} a_i, \quad \text{für } n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Aus dem Sandwichsatz (Prop. 3.8) folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + \dots + a_p^n)^{1/n} = \max_{i=1, \dots, p} a_i$.

Aufgabe 16. (★) Sei eine reelle Folge $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ rekursiv definiert durch:

$$a_0 = 1, \quad a_{k+1} = \sqrt{|a_k|} + \frac{15}{4} \quad \text{für } k \in \mathbb{N}.$$

i.) Zeigen Sie, dass $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert.

ii.) Berechnen Sie den Grenzwert von $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$.

Solution:


- i.) Die Idee ist, dass wir zeigen, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton steigend und beschränkt ist (Prop. 3.11 erledigt den Rest). Zuerst beobachten wir, dass $a_0 = 1 > 0$ und für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ gilt $a_n \geq \frac{15}{4} > 0$. Damit gilt für alle $n \in \mathbb{N}$: $a_n > 0$. Wir wollen nun, die Monotonie zeigen, d.h. wir versuchen zu zeigen, dass

$$1 \leq \frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{\sqrt{a_k}} + \frac{15}{4} \cdot \frac{1}{a_k} \stackrel{a_k > 0}{\iff} a_k \leq \sqrt{a_k} + \frac{15}{4}. \quad (1)$$

Wir versuchen nun zu erraten, welche Art von Abschätzung wir zeigen müssen. Da $a_k > 0$ können wir (für ein beliebiges, aber festes k) schreiben $a_k = x^2$ für ein $x > 0$. Dann gilt

$$(1) \iff x + \frac{15}{4} \geq x^2.$$

Geometrisch sieht dies so aus



Also gilt (1) solange $x \leq x_0$. Für x_0 gilt $x_0^2 = x_0 + \frac{15}{4}$. Wir müssen also $x_0^2 - x_0 - \frac{15}{4} = 0$ lösen. Mittels der Lösungsformel für quadratische Gleichungen erhalten wir

$$x_0 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-\frac{15}{4})}}{2} = \frac{1 \pm 4}{2}.$$

Da $x_0 > 0$ folgt $x_0 = \frac{5}{2}$.

D.h. für $a_k \leq x_0^2 = \frac{25}{4}$ ist (1) erfüllt, die Folge also monoton wachsend. Wir zeigen nun die

Behauptung 3.

$$\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq \frac{25}{4}.$$

Proof. Induktion über k . Der Induktionsanfang $k = 0$ ist einfach $a_0 = 1 < \frac{25}{4}$. Wir nehmen nun an, dass für ein beliebiges, aber festes $k \in \mathbb{N}$ gilt $a_k \leq \frac{25}{4}$. Dann berechnen wir

$$a_{k+1} = \sqrt{a_k} + \frac{15}{4} \leq \sqrt{\frac{25}{4}} + \frac{15}{4} = \frac{5}{2} + \frac{15}{4} = \frac{25}{4}.$$

Damit haben wir gezeigt, dass (1) immer erfüllt ist, d.h. $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist monoton wachsend. Weiter haben wir gezeigt, dass $0 < a_k \leq 25/4$. Also ist $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ monoton und beschränkt, also konvergent. \square

ii.) Wir haben in i.) gezeigt, dass $a := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \geq 0$. Es gilt

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} + \frac{15}{4} \stackrel{\text{stetig}}{=} \sqrt{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n} + \frac{15}{4} = \sqrt{a} + \frac{15}{4}.$$

Wir setzen $x = \sqrt{a}$, dann gilt

$$x^2 = x + \frac{15}{4} \implies x^2 - x - \frac{15}{4} = 0 \stackrel{x=\sqrt{a} \geq 0}{\implies} x = \frac{1 + \sqrt{1 - 4 \cdot (-\frac{15}{4})}}{2} = \frac{5}{2}.$$

Damit gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = x^2 = \frac{25}{4}$.

Aufgabe 17. (★)

i.) Berechnen Sie den folgenden Grenzwert:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(\left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right).$$

ii.) Berechnen Sie alle Häufungspunkte der komplexen Folge:

$$z_n = (n^4 - n^2 + 2)^{1/n} \sin \left(\frac{\pi n}{2} \right) + i \frac{n+e}{2n+1} (-1)^n.$$

iii.) Zeigen Sie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1) \cos \left(\frac{1}{n+1} \right) - n \cos \left(\frac{1}{n} \right) \right] = 1.$$

Solution:

i.) Wir berechnen

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} \longrightarrow e^{-1} \cdot \frac{1}{1} = e^{-1}, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

Aus der Stetigkeit des Logarithmus folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(\left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right) = \log \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right) = \log(e^{-1}) = -1.$$

ii.) Wir berechnen

$$(n^4 - n^2 + 2)^{1/n} = (n^{1/n})^4 \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^4} \right)^{1/n} \longrightarrow 1^4 \cdot 1 = 1, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty$$

und

$$\frac{n+e}{2n+1} = \frac{n}{2n+1} + \frac{e}{2n+1} = \frac{1}{2 + \frac{1}{n}} + \frac{e}{2n+1} \longrightarrow \frac{1}{2}, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

Wir erinnern uns daran, dass gilt

$$\sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) = \begin{cases} 0, & \text{für } n = 2k, \ k \in \mathbb{N} \\ 1, & \text{für } n = 4k + 1, \ k \in \mathbb{N} \\ -1, & \text{für } n = 4k + 3, \ k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Daraus folgt

$$z_{2k} \longrightarrow \frac{i}{2}, \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

$$z_{4k+1} \longrightarrow 1 - \frac{i}{2}, \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

$$z_{4k+3} \longrightarrow -1 - \frac{i}{2}, \quad \text{für } k \longrightarrow \infty,$$

Da diese drei Teilfolgen die ganze Folge überdecken, kann es keine anderen Häufungspunkte geben. Damit sind die Häufungspunkte von $((n^4 - n^2 + 2)^{1/n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) + i \frac{n+e}{2n+1} (-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ gerade die Elemente von $\{\frac{i}{2}, 1 - \frac{i}{2}, -1 - \frac{i}{2}\}$.

iii.) Wir berechnen

$$(n+1) \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - n \cos\left(\frac{1}{n}\right) = \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) + n \left(\cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)$$

Wir kümmern uns zuerst um den zweiten Term. Der Mittelwertsatz (Satz 8.9) sagt uns, dass ein $\xi \in (\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n})$ existiert, sodass

$$\cos\left(\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) = -\sin(\xi) \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = -\sin(\xi) \left(\frac{1}{n \cdot (n+1)} \right)$$

Also gilt

$$0 \leq \left| n \left(\cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right| = \left| -\sin(\xi) \cdot \frac{1}{n+1} \right| \leq \frac{1}{n+1} \longrightarrow 0, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

Damit gilt

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n+1) \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - n \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{n+1}\right) + \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\cos\left(\frac{1}{n+1}\right) - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \cos(0) + 0 = 1. \end{aligned}$$

Aufgabe 18 (★).

i) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reelle Folge derart, dass für ihre Inkremente gilt $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$. Zeigen Sie, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy Folge ist. Bedeutet dies, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert? Warum?

ii) Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reelle Folge, welche rekursiv definiert ist mittels:

$$a_{n+2} = \frac{a_n + a_{n+1}}{2}, \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}.$$

Zeigen Sie, dass dies eine Cauchy Folge ist. Verwenden Sie Teil i).

iii) Berechnen Sie den Grenzwert der Folge aus Teil ii).

Solution:

- i) Sei $\epsilon > 0$ fest aber beliebig. Seien $m \leq n$ beliebige natürliche Zahlen, wir setzen $k = n - m \geq 0$ und betrachten den Ausdruck $|a_m - a_{m+k}|$, falls $k = 1$ dann wissen wir bereits, dass $|a_m - a_{m+k}| \leq 2^{-m}$. Verwenden wir nun sukzessive die Dreiecksungleichung erhalten wir

$$\begin{aligned} |a_m - a_{m+k}| &= |(a_m - a_{m+1}) + (a_{m+1} - a_{m+2}) + \cdots + (a_{m+k-1} - a_{m+k})| \\ &\leq |a_m - a_{m+1}| + |a_{m+1} - a_{m+2}| + \cdots + |a_{m+k-1} - a_{m+k}| \\ &\leq 2^{-m} + 2^{-(m+1)} + \cdots + 2^{-(m+k-1)} < \sum_{k=m}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{m-1}} \end{aligned}$$

Dies zeigt, dass falls $m, n \geq n_0$ dann haben wir stets die Ungleichung

$$|a_m - a_n| < \frac{1}{2^{m-1}} \leq \frac{1}{2^{n_0-1}}$$

Wir wählen also $n_0 \in \mathbb{N}$ derart, dass $\frac{1}{2^{n_0-1}} \leq \epsilon$ oder äquivalent $n_0 \geq \log_2 \frac{2}{\epsilon}$. Wir wissen nun, dass $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy Folge in \mathbb{R} ist, da \mathbb{R} vollständig ist konvergiert diese Cauchy Folge auch.

- ii) Wir bemerken, dass per Definition gilt

$$a_{n+2} - a_{n+1} = -\frac{a_{n+1} - a_n}{2} = \cdots = (-1)^n \frac{a_2 - a_1}{2^n}$$

Folglich gilt für alle $n \in \mathbb{N}$ für die Inkremente

$$|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq |a_2 - a_1| 2^{-n}$$

Die Behauptung folgt also dank Teil i).

- iii) Es sei $c := a_2 - a_1$. Wir verwenden die Darstellung von a_n als Teleskopische Summe. Wir betrachten also

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_1 + \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{c}{2^{k-1}} \\ &= a_1 + c \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{-1}{2} \right)^k \end{aligned}$$

Lassen wir nun $n \rightarrow \infty$ streben und verwenden die Geometrische Reihe mit $r = -1/2$ erhalten wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a_1 + c \frac{1}{1 - (-1/2)} = a_1 + c \frac{2}{3} = a_1 + \frac{2}{3}(a_2 - a_1) = \frac{a_1 - 2a_2}{3}$$

4 Reihen

Aufgabe 19. Verwenden Sie den Cauchy'schen Verdichtungssatz (Kondensationssatz) um zu zeigen, dass die nachfolgenden Reihen divergieren respektive konvergieren:

i)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

ii)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

iii)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}, \text{ wobei } s > 1.$$

Solution:

Dank dem Cauchy'schen Kondensationssatz wissen wir, dass für eine nicht-negative, nicht-wachsende Folge $f(n)$ von reellen Zahl gilt $\sum f(n) < \infty \iff \sum 2^n f(2^n)$ also erhalten wir

i)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 1 = \infty$$

da $a_n = 1$ keine Nullfolge ist.

ii)

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} < \infty$$

da geometrische Reihe mit $r = \frac{1}{2}$.

iii) Wir erhalten durch den Cauchy'schen Kondensationssatz die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{(2^n)^s} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^{ns}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{s-1}} \right)^n < \infty$$

Da $s > 1$ und wir erneut eine Geometrische Reihe erhalten mit $0 \leq r = 2^{1-s} < 1$.

Aufgabe 20. (★) Bestimmen Sie für die folgenden Reihen, ob sie konvergent und ob sie absolut konvergent sind:

i.)

$$\sum_{k \geq 0} \frac{2k}{3k^3 + 1}.$$

ii.)

$$\sum_{k \geq 2} \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)}.$$

iii.)

$$\sum_{k \geq 1} \frac{2^k k!}{k^k}.$$

Solution:

i.) Wir berechnen für $k \geq 1$

$$\left| \frac{2k}{3k^3 + 1} \right| = \frac{2k}{3k^3 + 1} \leq \frac{2k}{3k^3} \leq \frac{1}{k^2}.$$

Wir wissen, dass $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k^2}$ konvergiert (siehe Seite 43, Anwendung des Cauchy Verdichtungskriterium), folgt mit dem Majorantenkriterium (Prop. 4.8), dass $\sum_{k \geq 0} \frac{2k}{3k^3 + 1}$ absolut konvergiert.

ii.) Es gilt für $k \in \mathbb{N}$ gilt $\sin(k\pi) = 0$ und $\sin((2k+1)\pi/2) = (-1)^k$. Damit gilt

$$\sum_{k \geq 2} \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)} = \sum_{k \geq 1} \frac{\sin((2k+1)\pi/2)}{\log(2k+1)} = \sum_{k \geq 1} \frac{(-1)^k}{\log(2k+1)}.$$

Da $\frac{1}{\log(2k+1)} > 0$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\log(2k+1)} = 0$, folgt aus dem Leibnizkriterium (Prop. 4.15), dass $\sum_{k \geq 2} \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)}$ konvergiert.

Wir zeigen, dass $\sum_{k \geq 2} \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)}$ nicht absolut konvergiert. Dazu brauchen wir die folgende

Behauptung 4.

$$\forall j \in \mathbb{N} : 2j + 1 > \log(2j + 1).$$

Proof. Wir definieren $h(x) = 2j + 1 - \log(2j + 1)$.

Dann gilt $h(0) = 1$ und $h'(x) = 2 - \frac{1}{2j+1} > 0$. □

Damit erhalten wir

$$\sum_{k \geq 2} \left| \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)} \right| = \sum_{k \geq 1} \left| \frac{(-1)^k}{\log(2k+1)} \right| = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{\log(2k+1)} > \sum_{k \geq 1} \frac{1}{2k+1} > \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}.$$

Da die harmonische Reihe divergiert, divergiert $\sum_{k \geq 2} \left| \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)} \right|$, d.h. $\sum_{k \geq 2} \frac{\sin(k\pi/2)}{\log(k)}$ konvergiert nicht absolut.

iii.) Sei $a_n = \frac{2^k k!}{k^k}$. Wir berechnen

$$\begin{aligned} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} &= \frac{2^{k+1}(k+1)!}{(k+1)^{k+1}} \cdot \frac{k^k}{2^k k!} = 2(k+1) \frac{k^k}{(k+1)^{k+1}} = 2 \left(\frac{k}{k+1} \right)^k = 2 \left(1 - \frac{1}{k+1} \right)^k \\ &= 2 \left(1 - \frac{1}{k+1} \right)^{k+1} \frac{1}{1 - \frac{1}{k+1}} \rightarrow 2e^{-1} = \frac{2}{e}, \quad \text{für } k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Aus dem Quotientenkriterium (Satz 4.12) folgt, dass $\sum_{k \geq 1} \frac{2^k k!}{k^k}$ absolut konvergiert.

Aufgabe 21. (★) Untersuchen Sie die folgenden Reihen auf Konvergenz und absolute Konvergenz:

i.)

$$\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1}.$$

ii.)

$$\sum_{n \geq 0} \left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^{3n}.$$

iii.)

$$\sum_{n \geq 0} \frac{\exp(3n \log(n))}{(k!)^2}.$$

Solution:

i.) Wir berechnen für $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{\sqrt{n+2}}{n+2} < \frac{\sqrt{n}}{n+1} \iff \frac{n+1}{(n+2)^2} < \frac{n}{(n+1)^2}$$

$$\iff n^3 + 3n^2 + 3n + 1 = (n+1)^3 < (n+2)^2 n = n^3 + 4n^2 + 4n \iff 0 < n^2 + n - 1.$$

Also ist $(\frac{\sqrt{n}}{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ monoton fallend. Damit können wir das Leibnizkriterium (Prop. 4.15) anwenden, und damit konvergiert $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1}$.

Wir zeigen, dass $\sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1}$ nicht absolut konvergiert. Dazu berechnen wir für $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$\left| (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right| = \frac{\sqrt{n}}{n+1} \geq \frac{\sqrt{n}}{2n} = \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Wir wissen (Anwendung des Verdichtungskriteriums, S. 43), dass $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}}$ divergiert, damit divergiert auch $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2\sqrt{n}}$. Und schliesslich divergiert deswegen $\sum_{n \geq 0} \left| (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right|$. Also ist $\sum_{n \geq 0} \left| (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+1} \right|$ nicht absolut konvergent.

ii.) Wir berechnen

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^{3n} \right|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^3 = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+\frac{5}{n}}{3-\frac{2}{n}} \right)^3 = \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} \right)^3 = \frac{1}{27} < 1.$$

Aus dem Wurzelkriterium (Satz 4.11) folgt, dass $\sum_{n \geq 0} \left(\frac{n+5}{3n-2} \right)^{3n}$ absolut konvergiert.

iii.) Zuerst bemerken wir, dass $\frac{e^{3n \log(n)}}{(n!)^2} = \frac{n^{3n}}{(n!)^2}$. Es gibt verschiedene Arten, um zu zeigen, dass die Reihe divergiert. Hier sind zwei Möglichkeiten.

Möglichkeit 1 : Nullfolgenkriterium

$$\frac{e^{3n \log(n)}}{(n!)^2} = \frac{n^{3n}}{(n!)^2} = n^n \cdot \left(\frac{n^n}{n!} \right)^2 = n^n \cdot \left(\frac{n^n}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \right)^2 \geq n^n \cdot 1^2 \geq 1.$$

Damit ist $(\frac{e^{3n \log(n)}}{(n!)^2})_{n \in \mathbb{N}}$ keine Nullfolge und mit dem Nullfolgenkriterium (Prop. 4.2) folgt, dass $\sum_{n \geq 0} \frac{\exp(3n \log(n))}{(k!)^2}$ divergiert.

Möglichkeit 2 : Quotientenkriterium

Wir berechnen

$$\begin{aligned}\frac{\left(\frac{(n+1)^{3n+3}}{((n+1)!)^2}\right)}{\left(\frac{n^{3n}}{(n!)^2}\right)} &= \frac{(n+1)^{3n+3}}{n^{3n}} \cdot \frac{(n!)^2}{((n+1)!)^2} = \frac{(n+1)^{3n}}{n^{3n}} \cdot (n+1)^3 \cdot \frac{1}{(n+1)^2} \\ &= \underbrace{\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^3}_{\rightarrow e^3, \text{ für } n \rightarrow \infty} \cdot \underbrace{(n+1)}_{\rightarrow \infty, \text{ für } n \rightarrow \infty} \rightarrow \infty.\end{aligned}$$

Aus dem Quotientenkriterium (Satz 4.12) folgt, dass $\sum_{n \geq 0} \frac{\exp(3n \log(n))}{(k!)^2}$ nicht absolut konvergiert. Da alle Terme nichtnegativ sind (dann ist absolute Konvergenz und Konvergenz das gleiche), folgt, dass $\sum_{n \geq 0} \frac{\exp(3n \log(n))}{(k!)^2}$ nicht konvergiert.

Aufgabe 22. (★) Berechnen Sie

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right).$$

Solution:

Wir berechnen

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k \cdot (k+1)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1} + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k} - \sum_{k=2}^{n-1} \frac{1}{k} - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = 1.\end{aligned}$$

Aufgabe 23.

i) Existiert ein $s > 0$ sodass die nachfolgende Reihe konvergiert?

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log(n)^s}.$$

ii) Für welche $s \in \mathbb{R}$ ist die nachfolgende Reihe konvergent?

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log^s(n)}.$$

Solution:

Wir verwenden das Cauchy Kondensationsverfahren

i)

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log(n)^s} < \infty &\iff \sum_{n=2}^{\infty} 2^n \frac{1}{\log(2^n)^s} < \infty \\ &\iff \frac{1}{\log(2)^s} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n^s} < \infty\end{aligned}$$

Jedoch konvergiert die letzte Reihe nicht, da $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^s} = \infty$ keine Nullfolge ist für alle $s > 0$. Also existiert kein $s > 0$ sodass die Reihe konvergiert.

ii)

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log^s(n)} < \infty &\iff \sum_{n=2}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^n \log^s(2^n)} < \infty \\ &\iff C \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^s} < \infty \end{aligned}$$

Die letzte Reihe konvergiert genau dann wenn $s > 1$

Aufgabe 24. Zeigen Sie, dass die nachfolgende Reihe konvergiert:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^2 + 2k + 3}{6k^5 + 6}.$$

Solution:

Für $n \in \mathbb{N}$ betrachten wir die Partialsumme

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k^2 + 2k + 3}{6k^5 + 6} = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{k^5 + 1} + \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n \frac{k}{k^5 + 1} + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^5 + 1}$$

Offensichtlich gilt, dass $k^5 + 1 \geq k^5$ und somit $\frac{1}{k^5 + 1} \leq \frac{1}{k^5}$, wir erhalten also die Abschätzung

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k^2 + 2k + 3}{6k^5 + 6} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^4} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^5}$$

Lassen wir nun $n \rightarrow \infty$, dann erkennen wir die konvergenten Reihen, wir schliessen dass die Reihe konvergiert.

Alternativ können wir auch das Vergleichskriterium verwenden, denn es gilt

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 + 2n + 3}{6n^5 + 6} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$$

Wir berechnen hierfür

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n^2 + 2n + 3}{6n^5 + 6}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3(2n^2 + 2n + 3)}{6n^5 + 6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^5}{6n^5} = \frac{1}{3} \in (0, \infty)$$

wobei wir verwendet haben, dass die Dominanten Terme die der Ordnung n^5 sind, somit verhält sich die Reihe Vergleichbar mit der konvergenten Reihe $\sum \frac{1}{n^3}$.

Aufgabe 25. Zeigen Sie, dass die folgende Reihe konvergiert:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}.$$

Solution:

Wir verwenden das Integralkriterium, d.h. wir betrachten den Integral

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = \tan^{-1} \Big|_{x=0}^{\infty} = \frac{\pi}{2} < \infty$$

Also konvergiert die Reihe, was zu zeigen war.

Aufgabe 26. Bestimmen Sie, ob die nachfolgende Reihe konvergiert:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n e^{-n^2}.$$

Solution:

Wir verwenden den Integraltest und erhalten

$$\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_{x=0}^{x=\infty} = \frac{1}{2} < \infty$$

und folglich konvergiert die Reihe.

5 Stetigkeit und Grenzwerte von Funktionen

Aufgabe 27. Zeigen Sie, mit Hilfe der Definition der Stetigkeit, dass die folgende Funktion in $x = 1$ stetig ist:

$$h : \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{-1\} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ x & \longmapsto \frac{x^2+x+1}{x+1}. \end{cases}$$

Solution:

Sei $\epsilon > 0$ fest aber beliebig, es sei δ sodass $0 < |x-1| < \delta$, und wir können stets ohne Einschränkung annehmen, dass $\delta < 1$. Wir betrachten den Ausdruck

$$\begin{aligned} |h(x) - h(1)| &= \left| \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} - \frac{3}{2} \right| = \left| \frac{2x^2 + 2x + 2 - 3x - 3}{2(x + 1)} \right| = \left| \frac{x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}}{x + 1} \right| \\ &= \left| \frac{(x + \frac{1}{2})(x - 1)}{x + 1} \right| = \frac{|x + \frac{1}{2}| |x - 1|}{|x + 1|} < \frac{|x + \frac{1}{2}|}{|x + 1|} \delta \end{aligned}$$

Wir wollen also die Terme $x + \frac{1}{2}$ und $x + 1$ kontrollieren. Aus $|x - 1| < \delta$ erhalten wir jedoch sofort

$$\left| x + \frac{1}{2} \right| = \left| x - 1 + 1 + \frac{1}{2} \right| \leq |x - 1| + \frac{3}{2} < \delta + \frac{3}{2} < \frac{5}{2}$$

Es bleibt also nur noch der Ausdruck $|x + 1|$. Da wir per Annahme $0 < |x - 1| < \delta$ haben, also x sich beliebig nahe an 1 befindet, muss sich $x + 1$ beliebig Nahe an 2 befinden, also haben wir

$$2 - \delta < |x + 1| < 2 + \delta$$

und da $\delta < 1$ haben wir $|x + 1| > 1$, also erhalten wir

$$|h(x) - h(1)| < \frac{|x + \frac{1}{2}|}{|x + 1|} \delta < \frac{5}{2} \delta \stackrel{!}{<} \epsilon \iff \delta < \frac{\epsilon}{5}$$

Wir wählen also für ein beliebiges $\epsilon > 0$ ein δ derart, dass $0 < \delta < \min\{\frac{2\epsilon}{5}, 1\}$ und erhalten dass dann h stetig an der Stelle $x = 1$ ist, d.h. wir haben formal gezeigt, dass

$$\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = \frac{3}{2}$$

Aufgabe 28. Sind die 3 nachfolgenden Funktionen Lipschitz-stetig?

i) $f : (0, \infty) \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{1}{1+x^2}.$

ii) $f : [0, 1) \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \sqrt{x}.$

iii) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \sin x.$

iv) Finden Sie eine Funktion, welche gleichmässig stetig, aber nicht Lipschitz-stetig ist.

v) Finden Sie eine Funktion, die Lipschitz-stetig, aber nicht differenzierbar ist.

Solution:

i)

$$|f'(x)| = \left| \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \right| \leq 1 \implies \text{Ableitung beschränkt} \implies f \text{ ist Lipschitz-stetig.}$$

ii) Für die Ableitung an der Stelle $x = 0$ gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f'(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{1}{2\sqrt{x}} \right| = \infty$$

Also ist die Ableitung an der Stelle $x = 0$ unbeschränkt und somit ist f nicht Lipschitz-stetig.

iii) Offensichtlich ist die Ableitung durch die \cos Funktion gegeben, welche durch 1 beschränkt ist und somit ist f Lipschitz-stetig.

iv) Wir definieren $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt{x}$, dann ist f gleichmässig stetig, aber nicht Lipschitz.

v) Die Betragsfunktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto |x|$ ist ein möglicher Kandidat.

Aufgabe 29. *Beweisen Sie, falls $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und injektiv ist, dann ist f streng monoton.*

Solution:

Wir nehmen an, dass f nicht streng monoton ist. Dann existieren $x_1 < x_2 < x_3$, sodass $f(x_1) \leq f(x_2) \geq f(x_3)$ oder $f(x_1) \geq f(x_2) \leq f(x_3)$. Es gibt nun de facto vier Fälle, die man untersuchen muss. Man kann es mittels Überlegen auf einen Fall reduzieren. Falls jemandem dieses "ohne Beschränkung der Allgemeinheit" nicht zusagt, so soll er dies in Gedanken durch "man zeigt analog" ersetzen und es zeigen. Dies ist eine gute Übung.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, dass gilt $f(x_1) \leq f(x_2) \geq f(x_3)$. Falls dies nicht der Fall ist, betrachten wir $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) := -f(x)$. g ist stetig und injektiv, desweiteren ist g genau dann streng monoton, wenn f es ist.

Desweiteren können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass $f(x_1) \leq f(x_3)$. Andernfalls betrachten wir $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) := f(-x)$.

Wir haben nun alles auf den Fall $f(x_1) \leq f(x_3) \leq f(x_2)$ reduziert. Aus dem Zwischenwertsatz (Satz 6.16) folgt, dass es ein $\xi \in (x_1, x_2)$, sodass $f(x_3) = f(\xi)$, dies steht im Widerspruch, dass f injektiv ist.

Aufgabe 30. *(*) Sei $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktionenfolge und $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch ist.*

i.) *Alle f_n sind stetig und $f_n \rightarrow f$ punktweise $\implies f$ ist stetig.*

ii.) *Alle f_n sind stetig und $f_n \rightarrow f$ gleichmässig $\implies f$ ist stetig.*

iii.) *Alle f_n sind differenzierbar auf $(0, 1)$ und $f_n \rightarrow f$ gleichmässig $\implies f$ ist differenzierbar auf $(0, 1)$.*

Solution:

i.) Falsch. Gegenbeispiel, $f_n(x) = x^n$ und $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1 \\ 0, & x \neq 1. \end{cases}$

ii.) Wahr, Prop. 6.24.

iii.) Falsch. Gegenbeispiel, $f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1/2) \\ \frac{n}{2}(x - 1/2)^2, & x \in [1/2, 1/2 + 1/n) \\ x - 1/2, & x \in [1/2 + 1/n, 1], \end{cases}$ und

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1/2) \\ x - 1/2, & x \in [1/2, 1]. \end{cases}$$

Aufgabe 31. Beweisen Sie, falls $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und beschränkt ist, dann besitzt f einen Fixpunkt.

Solution:

Wir definieren $a := \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x)$ und $b := \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x)$. Dann gilt $\text{Im}(f) \subseteq [a, b]$ und wir können f einschränken auf $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$. Da f stetig ist, folgt die Behauptung dem Fixpunktsatz.

Aufgabe 32. (★) Sei $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmässig stetig. Zeigen Sie: Es existiert ein $c \in \mathbb{R}$, sodass für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in $(0, 1]$ mit $x_n \rightarrow 0$ gilt:

$$f(x_n) \rightarrow c \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Bemerkung (nicht Teil der Aufgabe): Das bedeutet, dass $\lim_{x \downarrow 0} f(x) = c$.

Solution:

Sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq (0, 1]$ mit $x_n \rightarrow 0$. Dann ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Cauchyfolge (da sie konvergiert). Da f gleichmässig stetig ist, ist $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ ebenfalls eine Cauchyfolge (Aufgabe 24). Da \mathbb{R} vollständig ist (Satz 3.23), existiert ein $c \in \mathbb{R}$, sodass $f(x_n) \rightarrow c$. Sei nun $(y_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq (0, 1]$, sodass $y_n \rightarrow 0$. Wir definieren für $n \in \mathbb{N}$

$$z_{2n} := x_n \quad \text{und} \quad z_{2n+1} := y_n.$$

Dann gilt $z_n \rightarrow 0$. Mit der gleichen Argumentation wie oben, erhalten wir, dass $(f(z_n))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert und damit gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_{2n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = c.$$

Aufgabe 33. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

i)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x}.$$

ii)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x x^5}{x^x}.$$

iii)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 3 - \sqrt{x^4 + 6x^2})x^2.$$

Solution:

i) Es gibt mehrere Möglichkeiten dies zu zeigen.

Möglichkeit 1 : Potenzreihe

Es gilt

$$\frac{\sin(ax)}{x} = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j a^{2j+1}}{(2j+1)!} x^{2j}.$$

Wir berechnen

$$\left| \frac{(-1)^j a^{2j+1}}{(2j+1)!} \right|^{\frac{1}{2j}} = \frac{|a|^{1+\frac{1}{2j}}}{((2j+1)!)^{\frac{1}{j}}} \rightarrow |a| \cdot 0 = 0, \quad \text{für } j \rightarrow \infty.$$

Die restlichen Koeffizienten von $\sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j a^{2j+1}}{(2j+1)!} z^{2j}$ sind 0. Damit ist der Konvergenzradius $\rho = \infty$. Wir setzen

$$f(z) = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j a^{2j+1}}{(2j+1)!} z^{2j}.$$

Nach Satz 7.2 ist f stetig. Damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = \sum_{j \geq 0} \frac{(-1)^j a^{2j+1}}{(2j+1)!} 0^{2j} = \frac{(-1)^0 a^{2 \cdot 0 + 1}}{(2 \cdot 0 + 1)!} = a.$$

Möglichkeit 2 : L'Hôpital

Es gilt $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(ax) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x$. Nenner und Zähler sind beide differenzierbar. Mit dem Satz von L'Hôpital (Satz 8.14) folgt

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \cdot \cos(ax)}{1} = a \cdot \cos(0) = a.$$

Wobei wir benutzt haben, dass \cos stetig ist und $\cos(0) = 1$.

ii) Wir berechnen

$$\frac{e^x x^5}{x^x} = e^5 \frac{e^{x-5}}{x^{x-5}} = e^5 \left(\frac{e}{x} \right)^{x-5}.$$

Für $x \geq 2e$ gilt

$$0 \leq e^5 \left(\frac{e}{x} \right)^{x-5} \leq \left(\frac{1}{2} \right)^{x-5} \longrightarrow 0, \quad \text{für } x \longrightarrow \infty.$$

Wobei wir benutzt haben, dass $2^{x-5} \longrightarrow \infty$ für $x \longrightarrow \infty$. Damit gilt $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x x^5}{x^x} = 0$.

iii) Wir berechnen

$$\begin{aligned} (x^2 + 3 - \sqrt{x^4 + 6x^2})x^2 &= \frac{(x^2 + 3 - \sqrt{x^4 + 6x^2})(x^2 + 3 + \sqrt{x^4 + 6x^2})x^2}{x^2 + 3 + \sqrt{x^4 + 6x^2}} \\ &= \frac{9x^2}{x^2 + 3 + \sqrt{x^4 + 6x^2}} = \frac{9}{1 + \frac{3}{x^2} + \sqrt{1 + \frac{6}{x^2}}} \longrightarrow \frac{9}{2}, \quad \text{für } x \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

Also $\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 3 - \sqrt{x^4 + 6x^2})x^2 = \frac{9}{2}$.

Aufgabe 34. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte (möglicherweise $\pm\infty$):

i)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

ii)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \cos x}{x + 3}.$$

iii)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 + \sin^2 x)}{x + 100}.$$

iv)

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 e^{\sin^3(\frac{1}{x})}.$$

Solution:

Wir verwenden in allen Lösungen, dass die trigonometrischen Funktionen von oben durch 1 und von unten durch -1 beschränkt sind. Wir erhalten dann:

i)

$$0 \leftarrow -x^2 \leq x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2 \rightarrow 0, \text{ als } x \rightarrow 0$$

da $x^2 \geq 0$.

ii) Wir haben $-1 \leq \cos(x) \leq 1$ und somit $1 \geq -\cos(x) \geq -1$ also

$$0 \leftarrow \frac{1}{x+3} \leq \frac{2 - \cos x}{x+3} \leq \frac{3}{x+3} \rightarrow 0 \text{ als } x \rightarrow \infty$$

iii) Es genügt die untere Abschätzung zu betrachten, wir erkennen dass

$$\frac{x^2}{x+100} \leq \frac{x^2(2 \sin^2 x)}{x+100}$$

und da die untere Schranke gegen unendlich divergiert, muss auch die obere Schranke nach unendlich divergieren.

iv) Da die Exponential Funktion monoton wachsend auf \mathbb{R} ist erhalten wir

$$0 \leftarrow x^2 e^{-1} \leq x^2 \exp\left(\sin^3\left(\frac{1}{x}\right)\right) \leq x^2 e^1 \rightarrow 0, \text{ als } x \rightarrow 0$$

Aufgabe 35. Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

i)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{x^2 + 1}\right)^{\frac{1}{\sin^2 x}}.$$

ii)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x+4}-2}.$$

Solution:

Wir verwenden den e^{\log} -Trick um diese beiden Aufgaben zu lösen.

i)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{x^2 + 1} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp \left(\log \left(\left(\sqrt{x^2 + 1} \right)^{\frac{1}{\sin^2 x}} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp \left(\frac{\log \sqrt{x^2 + 1}}{\sin^2 x} \right)$$

Da die Exponentialfunktion stetig ist, dürfen wir den Grenzwert mit der exp-funktion vertauschen (i.e. in ihr Argument hereinziehen). Für den Grenzwert der Funktion im Exponenten erhalten wir mit Hilfe des Satzes von Bernoulli De L'Hopital, dass

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(\sqrt{x^2 + 1})}{\sin^2 x} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x^2 + 1)}{2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{4 \sin x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{\frac{x}{2 \sin x}}_{\rightarrow 1/2} \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x^2) \cos x}}_{\rightarrow 1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

und somit erhalten wir für den Grenzwert $e^{1/2}$.

ii)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sqrt{x+4}-2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp \left(\log \left(x^{\sqrt{x+4}-2} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \exp \left((\sqrt{x+4} - 2) \log(x) \right)$$

Dann berechnen wir den Grenzwert für die Funktion im Exponenten, erneut mit Hilfe des Satzes von Bernoulli- de L'Hopital:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x+4} - 2) \log(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log(x)}{\frac{1}{\sqrt{x+4}-2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x+4}}}{(\sqrt{x+4}-2)^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-2 \cdot \sqrt{x+4} \cdot (\sqrt{x+4}-2)^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-4(\sqrt{x+4}-2)^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-8(\sqrt{x+4}-2) \frac{1}{2\sqrt{x+4}}}{1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \underbrace{-8(\sqrt{x+4}-2)}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{x+4}}}_{\rightarrow 1/4} = 0 \end{aligned}$$

Also erhalten wir als Grenzwert $e^0 = 1$.

Aufgabe 36. Berechnen Sie den folgenden Grenzwert:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{\tan x} \log(2+t) dt.$$

Solution:

Wir haben den Typ "0/0" da $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\tan x} \log(2+t) dt = 0$ Dank dem Hauptsatz der Integralrechnung erhalten wir

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^{\tan x} \log(2+t) dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(2 + \tan(x)) \cdot \frac{1}{\cos^2(x)}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(2 + \tan(x))}{\cos^2(x)} = \log(2)$$

Aufgabe 37. Berechnen Sie den folgenden Grenzwert. Tipp: Verwenden sie einen Fundamentallimes.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 3x + 2} \right)^{\frac{x^2+1}{x-3}}.$$

Solution:

Wir verwenden den Fundamentallimes $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. Wir berechnen also

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 + 2x}{x^2 - 3x + 2} \right)^{\frac{x^2+1}{x-3}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 3x + 2 + 3x - 2 + 2x}{x^2 - 3x + 2} \right)^{\frac{x^2+1}{x-3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5x - 2}{x^2 - 3x + 2} \right)^{\frac{x^2+1}{x-3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{\frac{x^2-3x+2}{5x-2}} \right)^{\frac{x^2-3x+2}{5x-2}} \right]^{\frac{5x-2}{x^2-3x+2} \cdot \frac{x^2+1}{x-3}} \end{aligned}$$

Der Ausdruck in den eckigen Klammern $[\cdot]$ konvergiert gemäss Fundamentallimes gegen e , also betrachten wir nun noch den Exponenten, dieser kann jedoch wie folgt vereinfacht werden

$$\frac{5x-2}{x^2-3x+2} \cdot \frac{x^2+1}{x-3} = \frac{5x^3 - 2x^2 + 5x - 2}{x^3 - 6x^2 + 12x - 6} \rightarrow 5 \text{ als } x \rightarrow \infty$$

Da die höchst auftretenden Potenzen beide Grad 3 aufweisen. Wir erhalten also den Grenzwert e^5 . Als kleine Bemerkung, wir haben verwendet, dass wir eine Funktion der folgenden Form betrachten

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{\lim g(x)}$$

unter der Annahme, dass die beiden Grenzwerte $\lim f(x)$ und $\lim g(x)$ existieren. Dies gilt gemäss dem e^{\log} -Trick. In der Tat wir betrachten

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)^{g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \exp \left(\log \left(f(x)^{g(x)} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \exp (g(x) \log(f(x))) = \exp(\lim g(x) \log(\lim f(x))) \\ &= \lim f(x)^{\lim g(x)} \end{aligned}$$

Da sowohl \exp als auch \log stetig sind.

6 Potenzreihen

Aufgabe 38. Sei $f : \mathbb{R}_{>-1} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log(1+x)$.

i.) Bestimmen Sie die Taylorreihe von f um $x_0 = 0$. Bestimmen Sie den Konvergenzradius ρ dieser Reihe.

ii.) Sei $R_2 f(x)$ das Restglied des Taylorpolynoms zweiter Ordnung. Zeigen Sie:

$$R_2 f(x) \geq 0, \quad \forall 0 \leq x < R.$$

iii.) Zeigen Sie für alle $n > 1$:

$$1 - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} \left(1 + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right) \leq \frac{1}{2n^2}.$$

Solution:

i.) Wir zeigen, dass

$$\log(1+x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n, \quad x \in (-1, 1).$$

Zuerst zeigen wir die folgende

Behauptung 5.

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{(1+x)^n}, \quad x \in \mathbb{R}_{>-1} \text{ und } n \in \mathbb{N}_{\geq 1}.$$

Proof. Wir beweisen dies mittels Induktion über n . Zuerst zeigen wir die Induktionsverankerung $n = 1$.

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} = \frac{(-1)^2(1-1)!}{(1+x)^1}.$$

Wir nehmen nun an, dass die Behauptung für $n \in \mathbb{N}$ wahr ist. Dann berechnen wir

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= \left(\frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{(1+x)^n} \right)' = (-1)^{n+1}(n-1)! \left((1+x)^{-n} \right)' \\ &= (-1)^{n+1}(n-1)!(-n)(1+x)^{-n-1} = \frac{(-1)^{(n+1)+1}((n+1)-1)!}{(1+x)^{n+1}}. \end{aligned}$$

□

Zusätzlich gilt $f^{(0)}(0) = f(0) = \log(1) = 0$. Damit erhalten wir für die Taylorreihe von f in $x_0 = 0$ den folgenden Ausdruck

$$\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} (x-0)^n = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{n!(1+0)^n} x^n = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n.$$

Der Konvergenzradius ist gegeben durch

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} n^{1/n}} = \frac{1}{1} = 1.$$

ii.) Möglichkeit 1 : Taylorreihe

Das Restglied des Taylorpolynoms zweiter Ordnung ist für $0 \leq x < 1$ gegeben durch

$$R_2 f(x) = \sum_{k \geq 3} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=3}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k \geq 0.$$

Wobei wir benutzt haben, dass

$$\begin{aligned} \sum_{k=3}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{(-1)^{(2k+1)+1}}{2k+1} x^{2k+1} + \frac{(-1)^{(2k+2)+1}}{2k+2} x^{2k+2} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{2k+1} x^{2k+1} - \frac{1}{2k+2} x^{2k+2} \right) = \sum_{k=1}^{n-1} \underbrace{\left(\frac{1}{2k+1} - \frac{1}{2k+2} x \right)}_{\geq 0} \underbrace{x^{2k+1}}_{\geq 0} \geq 0 \end{aligned}$$

Möglichkeit 2 : Lagrange Restglied

Alternativ kann man das Restglied von Lagrange (Satz 8.25) verwenden. Es existiert ein $\xi_x \in (0, x)$, sodass

$$R_2 f(x) = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{3!} x^3 \stackrel{\text{Behauptung 8}}{=} \frac{2!(-1)^4}{3!(1+\xi_x)^3} x^3 = \frac{1}{3} \cdot \underbrace{\frac{x^3}{(1+\xi_x)^3}}_{\geq 0, \text{ da } x \geq 0, \xi_x \geq 0} \geq 0$$

iii.) Für $n > 1$ gilt $0 < \frac{1}{n} < 1$. Wir können also schreiben

$$\log \left(1 + \frac{1}{n} \right) = f \left(\frac{1}{n} \right) = \frac{1}{n} - \frac{\left(\frac{1}{n} \right)^2}{2} + R_2 f \left(\frac{1}{n} \right).$$

Wenn wir diese Identität einsetzen erhalten wir

$$\begin{aligned} 1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-1} \left(1 + \log \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) &= 1 - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-1} \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 + R_2 f \left(\frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-1} \frac{1}{2n^2} - \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-1}}_{>0} \underbrace{\left(R_2 f \left(\frac{1}{n} \right) \right)}_{\geq 0, \text{ wegen ii.}} \leq \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-1} \frac{1}{2n^2} = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{2n^2} \leq \frac{1}{2n^2}. \end{aligned}$$

Aufgabe 39. Es sei $f_n : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = 2n \left((2x)^{1/n} - 1 \right)$.

i.) Zeigen Sie, dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ punktweise konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

Hinweise: Schreiben Sie $(2x)^{1/n} = \exp(1/n \cdot \log(2x))$.

ii.) Zeigen Sie, dass die Konvergenz auf dem Intervall $[1, 2]$ gleichmässig ist.

iii.) Ist die Konvergenz gleichmässig auf $[1, \infty)$?

Solution:

i.) Sei $x \geq 1$. Wir wenden den Satz über die Taylorapproximation mit Lagrange'schem Restglied

(Satz 8.25) an. Dann existiert ein $\xi_x \in (0, 1/n \log(2x))$, sodass

$$\begin{aligned}\exp\left(\frac{1}{n} \cdot \log(2x)\right) &= e^0 + e^0 \frac{1}{n} \cdot \log(2x) + \frac{e^{\xi_x}}{2} \left(\frac{1}{n} \cdot \log(2x)\right)^2 \\ &= 1 + \frac{1}{n} \cdot \log(2x) + \frac{e^{\xi_x}}{2} \left(\frac{1}{n} \cdot \log(2x)\right)^2\end{aligned}$$

Damit gilt

$$\begin{aligned}2n \left((2x)^{1/n} - 1 \right) &= 2n \left(\exp\left(\frac{1}{n} \cdot \log(2x)\right) - 1 \right) \\ &= 2 \cdot \log(2x) + \frac{e^{\xi_x}}{2n} \log(2x)^2 \longrightarrow 2 \log(2x) =: f(x), \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.\end{aligned}$$

ii.) Aus i.) wissen wir, dass es für jedes $x \in [1, 2]$ ein $\xi_x \in (0, 1/n \log(2x))$, sodass

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| 2 \cdot \log(2x) + \frac{e^{\xi_x}}{2n} \log(2x)^2 - f(x) \right| = \left| \frac{e^{\xi_x}}{2n} \log(2x)^2 \right|.$$

Da die Exponentialfunktion und der Logarithmus auf unserem Bereich monoton steigend und nichtnegativ sind, gilt

$$\sup_{x \in [1, 2]} |f_n(x) - f(x)| \leq \frac{e^{\frac{1}{n} \log(4)}}{2n} \log(4)^2 \leq \frac{e^{\log(4)}}{2n} \log(4)^2 \leq \frac{2 \cdot \log(16)}{n} \longrightarrow 0, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

iii.) Nein.

$$\left| f_n\left(\frac{n^n}{2}\right) - f\left(\frac{n^n}{2}\right) \right| = |2n(n-1) - 2 \log(n^n)| = |2n(n-1 - \log(n))| \longrightarrow \infty, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

Also

$$\sup_{x \in [1, \infty)} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow \infty, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty.$$

Aufgabe 40. (★) Bestimmen Sie die Konvergenzradien der folgenden Potenzreihen in $z \in \mathbb{C}$.

i.)

$$\sum_{m \geq 1} \left(\sum_{j=1}^m \frac{1}{j} \right) z^m.$$

ii.)

$$\sum_{k \geq 0} 4k^5 3^k z^{k^2}.$$

iii.)

$$\sum_{n \geq 1} \left(5 - \frac{2}{n} \right)^n z^n.$$

iv.)

$$\sum_{n \geq 0} i^{n-1} n^n z^n.$$

v.)

$$\sum_{n \geq 0} \frac{2^n}{n!} z^n.$$

Solution:

i.)

$$1 = 1^n = \left(n \cdot \frac{1}{n}\right)^{1/n} \leq \left|\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}\right|^{1/n} \leq n^{1/n} \rightarrow 1, \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Damit gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}\right|^{1/n} = 1$ und damit

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \left|\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}\right|^{1/n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left|\sum_{j=1}^n \frac{1}{j}\right|^{1/n}} = \frac{1}{1} = 1.$$

ii.) Die Koeffizienten sind

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ keine Quadratzahl} \\ 4n^{5/2} 3^{\sqrt{n}}, & n \text{ Quadratzahl.} \end{cases}$$

Wir berechnen

$$|a_{n^2}|^{1/n^2} = |4n^{5/2} \cdot 3^{\sqrt{n}}|^{1/n} = \underbrace{4^{1/n}}_{\rightarrow 1} \cdot \underbrace{\left(n^{1/n}\right)^{5/2}}_{\rightarrow 1^{5/2}=1} \cdot \underbrace{e^{\log(3)/\sqrt{n}}}_{\rightarrow e^0=1} \rightarrow 1, \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Damit erhalten wir

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n^2}|^{1/n^2}} = \frac{1}{1} = 1.$$

iii.) Wir berechnen

$$\rho = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \left|\left(5 - \frac{2}{n}\right)^n\right|^{1/n}} = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \left(5 - \frac{2}{n}\right)} = \frac{1}{5}.$$

iv.) Wir berechnen

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |i^{n-1} n^n|^{1/n} \stackrel{|i|=1}{=} \limsup_{n \rightarrow \infty} n = \infty.$$

Damit gilt

$$\rho = 0.$$

v.) Sei $k \in \mathbb{N}$, dann gilt für $n \geq k$

$$(n!)^{1/n} \geq \left(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (k-1) \cdot k \cdot \underbrace{k \cdot \dots \cdot k}_{n-k \text{ mal}}\right)^{1/n} \geq k^{(n-k)/n} = k^{1-k/n}$$

Damit gilt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n} \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} k^{1-k/n} = k.$$

Da $k \in \mathbb{N}$ beliebig war, gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} (n!)^{1/n} = \infty$. Es folgt

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \left|\frac{2^n}{n!}\right|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(n!)^{1/n}} = 0.$$

Also gilt

$$\rho = \infty.$$

Aufgabe 41. (★) Entscheiden Sie für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind:

- i.) Sei $\rho > 0$ der Konvergenzradius von $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$. Dann ist f auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| < \rho\}$ stetig.
- ii.) Sei $\rho > 0$ der Konvergenzradius von $f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$. Dann
- $$p_m(z) = \sum_{n=0}^m a_n z^n \longrightarrow f(z) \text{ gleichmässig auf } \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\} \text{ für alle } r < \rho.$$

Solution:

i.) Wahr, Satz 8.30.

ii.) Sei $0 \leq r < \rho$. Nach Satz 7.2 konvergiert $\sum_{n \geq 0} |a_n| \cdot r^n$. Insbesondere gilt $\sum_{n \geq m+1} |a_n| \cdot r^n \longrightarrow 0$ für $m \longrightarrow \infty$. Die folgende Rechnung zeigt die gleichmässige Konvergenz auf $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq r\}$

$$\begin{aligned} \sup_{|z| \leq r} |f(z) - p_m(z)| &= \sup_{|z| \leq r} \left| \sum_{n \geq m+1} a_n z^n \right| \leq \sup_{|z| \leq r} \sum_{n \geq m+1} |a_n| \cdot |z|^n \\ &= \sum_{n \geq m+1} |a_n| \cdot r^n \longrightarrow 0, \quad \text{für } m \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

Aufgabe 42. Berechnen Sie den folgenden Grenzwert mit Hilfe der Lagrange'schen Fehlerabschätzung:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right).$$

Solution:

Aus dem Satz über das Lagrang'sche Restglied (Satz 8.25) wissen wir, dass gilt

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + e^{\xi_x} \cdot \frac{x^3}{6},$$

wobei $\xi_x \in [0, x]$ für $x > 0$ und $\xi_x \in [x, 0]$ für $x < 0$. Damit folgt

$$\begin{aligned} \frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} &= \frac{1}{x + \frac{x^2}{2} + e^{\xi_x} \cdot \frac{x^3}{6}} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \left(\frac{1}{1 + \frac{x}{2} + e^{\xi_x} \cdot \frac{x^2}{6}} - 1 \right) = \frac{1}{x} \left(\frac{-\frac{x}{2} - e^{\xi_x} \cdot \frac{x^2}{6}}{1 + \frac{x}{2} + e^{\xi_x} \cdot \frac{x^2}{6}} \right) \\ &= \frac{-\frac{1}{2} - e^{\xi_x} \cdot \frac{x}{6}}{1 + \frac{x}{2} + e^{\xi_x} \cdot \frac{x^2}{6}} \end{aligned}$$

Da $|\xi_x| \leq |x|$, gilt $\xi_x \longrightarrow 0$ für $x \longrightarrow 0$. Damit erhalten wir mit der Stetigkeit der Exponentialfunktion

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2} - e^{\xi_x} \cdot \frac{x}{6}}{1 + \frac{x}{2} + e^{\xi_x} \cdot \frac{x^2}{6}} = \frac{-\frac{1}{2} - e^0 \cdot 0}{1 + \frac{0}{2} + e^0 \cdot \frac{0^2}{6}} = -\frac{1}{2}.$$

7 Differentialrechnung

Aufgabe 43. (★) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine gerade (d.h. $f(x) = f(-x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$), differenzierbare Funktion. Zeigen Sie, dass $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine ungerade Funktion ist, d.h. $f'(-x) = -f'(x)$.

Solution:

Sei $x \in \mathbb{R}$, dann gilt

$$\begin{aligned} f'(-x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-x+h) - f(-x)}{h} \stackrel{f \text{ gerade}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{-h} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = -f'(x). \end{aligned}$$

Aufgabe 44. Beweisen Sie die verallgemeinerte Bernoulli-Ungleichung, welche besagt, dass für alle $r \geq 1$, $x \geq 0$ gilt:

$$(1+x)^r \geq 1+rx.$$

Hint: Betrachten Sie die Funktion $h(x) = (1+x)^r - (1+rx)$.

Solution:

Die Behauptung ist äquivalent zu der Aussage $h(x) \geq 0$ für alle $x \geq 0$. Zuerst berechnen wir die Ableitung von h .

$$h'(x) = r(1+x)^{r-1} - r = r((1+x)^r - 1) \geq 0.$$

Damit ist h monoton steigend. Da $h(0) = 1^r - 1 = 0$, folgt, dass $h(x) \geq 0$ für alle $x \geq 0$ und damit die Behauptung.

Aufgabe 45. (★) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

i.) Zeigen Sie, dass f auf ganz \mathbb{R} differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

ii.) Ist f' an der Stelle $x = 0$ stetig?

Solution:

i.) Für $x \neq 0$ erhalten wir mit der Kettenregel (Prop. 8.5) und der Produktregel (Satz 8.3), dass f differenzierbar ist und dass gilt

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^2)' \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \left(\sin\left(\frac{1}{x}\right) \right)' = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) \right) \left(\frac{1}{x} \right)' \\ &= 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \left(\cos\left(\frac{1}{x}\right) \right) \left(\frac{-1}{x^2} \right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right). \end{aligned}$$

Für $x = 0$ berechnen wir

$$0 \leq \left| \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} \right| = \left| \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} \right| = |h| \cdot \left| \sin\left(\frac{1}{h}\right) \right| \leq |h| \rightarrow 0, \quad \text{für } h \rightarrow 0.$$

Damit gilt $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} \right| = 0$.

ii.) f' ist stetig in $x = 0$, genau dann wenn gilt $\lim_{h \rightarrow 0} f'(h) = f'(0)$, also

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[2h \sin \left(\frac{1}{h} \right) - \cos \left(\frac{1}{h} \right) \right] = f'(0) = 0.$$

Aus der Rechnung von i.) folgt $\lim_{h \rightarrow 0} 2h \sin \left(\frac{1}{h} \right) = 0$. Damit ist f' stetig in $x = 0$, genau dann wenn $\lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(\frac{1}{h} \right) = 0$. Dies ist jedoch nicht der Fall. Da

$$\cos \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{2n\pi} \right)} \right) = \cos(2n\pi) = 1 \quad \text{und} \quad \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty.$$

Also ist f' nicht stetig in $x = 0$.

Aufgabe 46. Sei $\epsilon > 0$. Wir definieren $f_\epsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_\epsilon(x) = |x|^{1+\epsilon}$. Zeigen Sie, dass f_ϵ auf ganz \mathbb{R} differenzierbar ist.

Solution:

Wir wissen, dass der Absolutbetrag ausserhalb von $x = 0$ differenzierbar ist. Auch wissen wir, dass $x \mapsto x^{1+\epsilon}$ differenzierbar ist (Seite 90). Die Komposition differenzierbarer Funktionen ist differenzierbar (Kettenregel, Prop. 8.5), also ist f_ϵ in $x \neq 0$ differenzierbar. Nun zeigen wir noch, dass f_ϵ in $x = 0$ differenzierbar ist

$$\left| \frac{f_\epsilon(h) - f_\epsilon(0)}{h - 0} \right| = \left| \frac{|h|^{1+\epsilon}}{h} \right| = |h|^\epsilon \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

Damit gilt $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_\epsilon(h) - f_\epsilon(0)}{h - 0} = 0$, also ist f_ϵ in $x = 0$ differenzierbar (mit $f'_\epsilon(0) = 0$).

Aufgabe 47. Bestimmen Sie alle Punkte, in denen:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

i.) stetig ist.

ii.) differenzierbar ist.

Solution:

i.) Wir zeigen, dass f nur in $x = 0$ stetig ist.

Sei $x \neq 0$. Da sowohl \mathbb{Q} , als auch $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dicht in \mathbb{R} liegen (Prop. 2.17 und Seite 62), existieren Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0 \neq x^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n).$$

Damit ist f nicht stetig in $x \neq 0$. Die gleiche Rechnung zeigt, dass f in $x = 0$ stetig ist.

ii.) Wir zeigen, dass f nur in $x = 0$ differenzierbar ist.

Da f nicht stetig ist in $x \neq 0$, ist f auch nicht differenzierbar in $x \neq 0$ (Prop. 8.2). Wir berechnen

$$\left| \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} \right| \leq \left| \frac{h^2}{h} \right| = |h| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

Damit gilt $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = 0$, also ist f in $x = 0$ differenzierbar (mit $f'(0) = 0$).

Das Ziel dieser Aufgabe war es, daran zu erinnern, dass eine Funktion, die in x differenzierbar ist, nicht in einer ganzen Umgebung von x differenzierbar sein muss.

Aufgabe 48. (★) Berechnen Sie die Ableitungen $f'(x)$ der folgenden Funktionen:

i.)

$$f(x) = \log\left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right) \quad \text{für } x \in (0, 1).$$

ii.)

$$f(x) = \sqrt{\frac{a + bx}{a - bx}} \quad \text{für } a, b > 0, \text{ für } x \in \left(\frac{-a}{b}, \frac{a}{b}\right).$$

iii.)

$$f(x) = x^{1/3}(1 - x)^{2/3}(1 + x)^{1/2} \quad \text{für } x \in (0, 1).$$

iv.)

$$f(x) = x^{\sqrt{x}} \quad \text{für } x > 0.$$

v.)

$$f(x) = \log(\tan(x)^{-1/3}) \quad \text{für } x \neq k\frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Solution:

i.)

$$\begin{aligned} f'(x) &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \frac{1}{\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}} \cdot \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x}\right)' \\ &\stackrel{\text{Quotientenregel}}{=} \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \cdot \frac{(1 + \sqrt{1 - x^2})'x - (1 + \sqrt{1 - x^2})(x)'}{x^2} \\ &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \cdot \frac{\frac{-2x}{2\sqrt{1 - x^2}} \cdot x - (1 + \sqrt{1 - x^2})}{x^2} = \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \cdot \frac{\left(\frac{-x^2 - \sqrt{1 - x^2} - (\sqrt{1 - x^2})^2}{\sqrt{1 - x^2}}\right)}{x^2} \\ &= \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \cdot \frac{\left(\frac{-1 - \sqrt{1 - x^2}}{\sqrt{1 - x^2}}\right)}{x^2} = \frac{x}{1 + \sqrt{1 - x^2}} \cdot \frac{-1 - \sqrt{1 - x^2}}{x^2 \cdot \sqrt{1 - x^2}} = \frac{-1}{x \cdot \sqrt{1 - x^2}}. \end{aligned}$$

ii.) Man prüft leicht nach, dass

$$a - bt > 0 \iff t > -\frac{a}{b} \quad \text{und} \quad a + bt > 0 \iff t < \frac{a}{b}.$$

Damit gilt

$$\frac{a + bt}{a - bt} \geq 0 \iff t \in \left(-\frac{a}{b}, \frac{a}{b}\right].$$

Wir rechnen

$$\begin{aligned} f'(x) &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \frac{1}{2\sqrt{\frac{a+bx}{a-bx}}} \cdot \left(\frac{a+bx}{a-bx}\right)' \stackrel{\text{Quotientenregel}}{=} \frac{\sqrt{a-bx}}{2\sqrt{a+bx}} \cdot \frac{b \cdot (a-bx) - (a+bx) \cdot (-b)}{(a-bx)^2} \\ &= \frac{\sqrt{a-bx}}{2\sqrt{a+bx}} \cdot \frac{b \cdot ((a-bx) + (a+bx))}{(a-bx)^2} = \frac{\sqrt{a-bx}}{\sqrt{a+bx}} \cdot \frac{ab}{(a-bx)^2} \end{aligned}$$

iii.)

$$f'(x) \stackrel{\text{Produktregel}}{=} \left(x^{1/3} \cdot (1-x)^{2/3} \right)' \cdot (1+x)^{1/2} + x^{1/3} \cdot (1-x)^{2/3} \left((1+x)^{1/2} \right)'$$

$$\stackrel{\text{Produktregel}}{=} \left(\left(x^{1/3} \right)' \cdot (1-x)^{2/3} + x^{1/3} \left((1-x)^{2/3} \right)' \right) \cdot (1+x)^{1/2} + x^{1/3} \cdot (1-x)^{2/3} \cdot \frac{1}{2} (1+x)^{-1/2}$$

$$\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \left(\frac{1}{3} x^{-2/3} \cdot (1-x)^{2/3} - x^{1/3} \cdot \frac{2}{3} (1-x)^{-1/3} \right) \cdot (1+x)^{1/2} + x^{1/3} \cdot (1-x)^{2/3} \cdot \frac{1}{2} (1+x)^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{3} x^{-2/3} \cdot (1-x)^{2/3} \cdot (1+x)^{1/2} - \frac{2}{3} x^{1/3} \cdot (1-x)^{-1/3} \cdot (1+x)^{1/2} + \frac{1}{2} x^{1/3} \cdot (1-x)^{2/3} \cdot (1+x)^{-1/2}$$

$$= \left(\frac{1}{3x^{1/3}} - \frac{2}{3(1-x)^{2/3}} + \frac{1}{2(1+x)^{1/2}} \right) \cdot x^{1/3} \cdot (1-x)^{2/3} \cdot (1+x)^{1/2}.$$

iv.)

$$f'(x) = \left(e^{\sqrt{x} \cdot \log(x)} \right)' \stackrel{\text{Produktregel}}{=} (\sqrt{x} \cdot \log(x))' \cdot \left(e^{\sqrt{x} \cdot \log(x)} \right)$$

$$\stackrel{\text{Produktregel}}{=} ((\sqrt{x})' \cdot \log(x) + \sqrt{x} \cdot (\log(x))') \cdot x^{\sqrt{x}} = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \log(x) + \frac{\sqrt{x}}{x} \right) \cdot x^{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x}} \left(\frac{\log(x)}{2} + 1 \right) x^{\sqrt{x}} = \left(\frac{\log(x)}{2} + 1 \right) x^{\sqrt{x}-1/2}.$$

v.)

$$f'(x) \stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \frac{1}{\tan(x)^{-1/3}} \cdot \left(\tan(x)^{-1/3} \right)' \stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \tan(x)^{1/3} \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) \tan(x)^{-4/3} \cdot (\tan(x))'$$

$$= -\frac{1}{3} \tan(x)^{-1} \cdot (1 + \tan(x)^2) = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{\tan(x)} + \tan(x) \right).$$

Aufgabe 49. (★) Seien $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen.

i.) Zeigen Sie, dass in allen Punkten $x \in (a, b)$ mit $f(x) \neq g(x)$ die Funktion $\max(f, g)$ differenzierbar ist.

ii.) Unter welcher Bedingung ist $\max(f, g)$ differenzierbar in einem Punkt $x \in (a, b)$ mit $f(x) = g(x)$.

Solution:

i.) Sei $x \in (a, b)$.

Fall 1 : $f(x) - g(x) > 0$

Da f, g stetig sind, ist $f - g$ ebenfalls stetig (Prop. 6.3) und damit existiert ein $\delta > 0$, sodass gilt $(f - g)|_{(x-\epsilon, x+\epsilon)} > 0$. Damit gilt

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\max(f, g)(x+h) - \max(f, g)(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x).$$

Fall 2 : $f(x) - g(x) < 0$

Da f, g stetig sind, ist $f - g$ ebenfalls stetig (Prop. 6.3) und damit existiert ein $\delta > 0$, sodass gilt $(f - g)|_{(x-\epsilon, x+\epsilon)} < 0$. Damit gilt

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\max(f, g)(x+h) - \max(f, g)(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'(x).$$

ii.)

Behauptung 6. Sei $x \in (a, b)$:

$$\max(f, g) \text{ ist differenzierbar in } x \iff f'(x) = g'(x).$$

Proof. " \implies " Wir zeigen die Kontraposition. Sei $f(x) \neq g(x)$, wir können ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass $f'(x) > g'(x)$ (ansonsten benennen wir unsere Funktionen um). Da

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f - g)(x+h) - \overbrace{(f - g)(x)}^{=0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(f - g)(x+h)}{h} = f'(x) - g'(x) > 0.$$

Damit existiert ein $h_0 > 0$, sodass für alle $0 < h \leq h_0$

$$\frac{(f - g)(x+h)}{h} > 0 \implies f(x+h) > g(x+h)$$

und für $-h_0 \leq h < 0$

$$\frac{(f - g)(x+h)}{h} > 0 \implies f(x+h) < g(x+h).$$

Damit gilt

$$\begin{aligned} \lim_{h \downarrow 0} \frac{\max(f, g)(x+h) - \max(f, g)(x)}{h} &= \lim_{h \downarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) \neq g'(x) \\ &= \lim_{h \downarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = \lim_{h \uparrow 0} \frac{\max(f, g)(x+h) - \max(f, g)(x)}{h}. \end{aligned}$$

Also existiert $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\max(f, g)(x+h) - \max(f, g)(x)}{h}$ nicht. Deswegen ist $\max(f, g)$ in x nicht differenzierbar.

" \Leftarrow " Sei nun $f'(x) = g'(x)$ für ein fixes $x \in (a, b)$. Sei $\epsilon > 0$.

Da $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$, existiert ein $\delta_1 > 0$, sodass für alle $0 < |h| < \delta_1$

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \epsilon.$$

Da $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} = g'(x)$, existiert ein $\delta_2 > 0$, sodass für alle $0 < |h| < \delta_2$

$$\left| \frac{g(x+h) - g(x)}{h} - g'(x) \right| < \epsilon.$$

Damit gilt auch für alle $0 < |h| < \delta_2$

$$\left| \frac{g(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| \stackrel{f(x)=g(x), f'(x)=g'(x)}{=} \left| \frac{g(x+h) - g(x)}{h} - g'(x) \right| < \epsilon.$$

Sei $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Dann gilt für $0 < |h| < \delta$

$$\left| \frac{\max(f, g)(x+h) - \max(f, g)(x)}{h} - f'(x) \right| \stackrel{f(x)=g(x)}{=} \left| \frac{\max(f, g)(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right|$$

$$\leq \max \left\{ \underbrace{\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right|}_{< \epsilon, \text{ da } \delta \leq \delta_1}, \underbrace{\left| \frac{g(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right|}_{< \epsilon, \text{ da } \delta \leq \delta_2} \right\} < \epsilon.$$

Damit gilt $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\max(f,g)(x+h) - \max(f,g)(x)}{h}$ konvergiert (gegen $f'(x)$), also ist $\max(f,g)$ in x differenzierbar. \square

Aufgabe 50. Seien $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, $f \in C^n([0,1], \mathbb{R})$ und $b \in \mathbb{R}$. Seien $0 \leq x_1 < \dots < x_{n+1} \leq 1$ sodass $f(x_i) = b$ für alle $i \in \{1, \dots, n+1\}$. Zeigen Sie, es existiert ein $\xi \in (x_1, x_{n+1})$ sodass $f^{(n)}(\xi) = 0$.

Hint: Induktion.

Solution:

Wir beweisen die Behauptung mittels Induktion über n .

Die Induktionsverankerung $n = 1$ folgt direkt aus dem Mittelwertsatz (Satz 8.9). Wir nehmen an, die Aussage gilt für $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Seien jetzt $0 \leq x_1 < \dots < x_{n+2} \leq 1$. Wir wenden die Induktionsverankerung an, auf die Paare $0 \leq x_i < x_{i+1} \leq 1$ für $i \in \{1, \dots, n+1\}$ und erhalten $\xi_1 < \dots < \xi_{n+1}$ mit $x_i < \xi_i < x_{i+1}$ und $f'(\xi_i) = 0$. Die Induktionsannahme liefert uns ein $\xi \in (x_1, x_{n+2})$ mit $f^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Aufgabe 51. Sei $K > 0$. Wir definieren:

$$f_n : [-K, K] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) := \begin{cases} \frac{n}{2}x^2 + \frac{1}{2n}, & x \in (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) \\ |x|, & \text{sonst.} \end{cases}$$

i.) Zeigen Sie, dass $f_n \in C^1([-K, K], \mathbb{R})$.

ii.) Berechnen Sie den Limes von $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ in $(C^0([-K, K], \mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0([-K, K], \mathbb{R})})$.

iii.) Schliessen Sie, dass $(C^1([-K, K], \mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0([-K, K], \mathbb{R})})$ nicht vollständig ist.

Solution:

Diese Aufgabe soll daran erinnern, dass der gleichmässige Limes von differenzierbaren Funktionen nicht differenzierbar sein muss. In anderen Worten, der Raum der differenzierbaren Funktionen ist nicht vollständig bezüglich der Supremumsnorm.

Man beachte, dass $(C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0(\mathbb{R}, \mathbb{R})})$ kein normierter Vektorraum ist und darum die ursprüngliche Aufgabe keinen Sinn macht (zum Beispiel ist $id \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, aber $\sup_{x \in \mathbb{R}} |id(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x| = \infty$). Weiter waren die ursprünglichen Funktionen nicht einmal stetig und insbesondere also nicht differenzierbar. Damit war auch das Gegenbeispiel zu Aufgabe 30 falsch. Man kann die obigen Funktionen benutzen um ein echtes Gegenbeispiel zu konstruieren.

i.) f_n ist für $x \neq \pm 1/n$ offensichtlich stetig. Nun müssen wir die Stetigkeit in $\pm 1/n$ beweisen, dazu benutzen wir Prop. 6.13

$$\lim_{x \downarrow \frac{-1}{n}} f_n(x) = \lim_{x \downarrow \frac{-1}{n}} \frac{n}{2}x^2 + \frac{1}{2n} = \frac{n}{2} \left(\frac{-1}{n} \right)^2 + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} = \lim_{x \uparrow \frac{-1}{n}} |x| = \lim_{x \uparrow \frac{-1}{n}} f_n(x).$$

$$\lim_{x \uparrow \frac{1}{n}} f_n(x) = \lim_{x \uparrow \frac{1}{n}} \frac{n}{2}x^2 + \frac{1}{2n} = \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \frac{1}{2n} = \frac{1}{n} = \lim_{x \downarrow \frac{1}{n}} |x| = \lim_{x \downarrow \frac{1}{n}} f_n(x).$$

Für die Differenzierbarkeit reicht es analog Serie 11, Aufgabe 2 zu zeigen, dass $\lim_{x \rightarrow a} f'_n(x)$ existiert für $a \neq \pm 1/n$. Dazu reicht es zu zeigen (Prop. 6.13), dass gilt $\lim_{x \uparrow a} f'_n(x) = \lim_{x \downarrow a} f'_n(x)$. Dies rechnen wir nun nach

$$\lim_{x \downarrow \frac{-1}{n}} f'_n(x) = \lim_{x \downarrow \frac{-1}{n}} nx = -1 = \lim_{x \uparrow \frac{-1}{n}} -1 = \lim_{x \uparrow \frac{-1}{n}} f'_n(x).$$

$$\lim_{x \uparrow \frac{1}{n}} f'_n(x) = \lim_{x \uparrow \frac{1}{n}} nx = 1 = \lim_{x \downarrow \frac{1}{n}} 1 = \lim_{x \downarrow \frac{1}{n}} f'_n(x).$$

Wobei wir benutzt haben, dass der Absolutbetrag differenzierbar ist für $x \neq 0$ und es gilt

$$|x|' = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Es bleibt zu zeigen, dass der Limes am Rand existiert (siehe Seite 97). Wir berechnen für $n \geq 1/K$

$$\lim_{x \downarrow -K} f'(x) = \lim_{x \downarrow -K} |x|' = \lim_{x \downarrow -K} -1 = -1.$$

$$\lim_{x \uparrow K} f'(x) = \lim_{x \uparrow K} |x|' = \lim_{x \uparrow K} 1 = 1.$$

und für $n < 1/K$

$$\lim_{x \downarrow -K} f'(x) = \lim_{x \downarrow -K} nx = -nK.$$

$$\lim_{x \uparrow K} f'(x) = \lim_{x \uparrow K} nx = nK.$$

ii.) Wir definieren

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|.$$

Wir zeigen, dass $f_n \longrightarrow f$ bezüglich $\|\cdot\|_{C^0([-K,K],\mathbb{R})}$. Für $n \geq 1/K$ gilt

$$\begin{aligned} 0 \leq \|f_n - f\|_{C^0([-K,K],\mathbb{R})} &= \sup_{x \in [-K,K]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})} |f_n(x) - f(x)| \\ &\leq \sup_{x \in (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})} (|f_n(x)| + |f(x)|) \leq \sup_{x \in (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})} |f_n(x)| + \sup_{x \in (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})} |f(x)| \\ &= \sup_{x \in (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})} \left| \frac{n}{2}x^2 + \frac{1}{2n} \right| + \sup_{x \in (\frac{-1}{n}, \frac{1}{n})} |x| = \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n} \right)^2 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{n} = \frac{2}{n} \longrightarrow 0, \quad \text{für } n \longrightarrow \infty. \end{aligned}$$

iii.) Es gilt $C^1([-K,K],\mathbb{R}) \subset C^0([-K,K],\mathbb{R})$ (Prop. 8.2). Wir wissen aus ii.), dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ in $(C^0([-K,K],\mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0([-K,K],\mathbb{R})})$ konvergiert. Damit gilt insbesondere, dass $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ eine Cauchyfolge in $(C^0([-K,K],\mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0([-K,K],\mathbb{R})})$ und damit auch eine Cauchyfolge in $(C^1([-K,K],\mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0([-K,K],\mathbb{R})})$ ist, da nach i.) $(f_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}} \subseteq C^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$. Jedoch gilt $f \notin C^1([-K,K],\mathbb{R})$ und damit ist $(C^1([-K,K],\mathbb{R}), \|\cdot\|_{C^0([-K,K],\mathbb{R})})$ nicht vollständig.

Aufgabe 52. (★)

i.) Berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen:

(a)

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{3x + 2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{2}{3} \right\}.$$

(b)

$$g(x) = \log((x + \sin(x))^2), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

(c)

$$h(x) = x^{\sin(\sqrt{x})}, \quad x > 0.$$

ii.) Finden Sie alle lokalen Extrema der Funktion $f(x) := (1+x)\sqrt{|x|}$, $x \in \mathbb{R}$.

Solution:

i.) (a)

$$\begin{aligned} f'(x) &\stackrel{\text{Quotientenregel}}{=} \frac{(x^2 - 2x + 1)' \cdot (3x + 2) - (x^2 - 2x + 1) \cdot (3x + 2)'}{(3x + 2)^2} \\ &= \frac{(2x - 2) \cdot (3x + 2) - (x^2 - 2x + 1) \cdot 3}{(3x + 2)^2} = \frac{2(x - 1)(3x + 2) - 3(x - 1)(x - 1)}{(3x + 2)^2} \\ &= \frac{(x - 1)(6x + 4 - 3x + 3)}{(3x + 2)^2} = \frac{(x - 1)(3x + 7)}{(3x + 2)^2}. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} g'(x) &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \frac{1}{(x + \sin(x))^2} \cdot ((x + \sin(x))^2)' \\ &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \frac{1}{(x + \sin(x))^2} \cdot 2((x + \sin(x)) \cdot (x + \sin(x)))' \\ &= \frac{1}{(x + \sin(x))^2} \cdot 2((x + \sin(x)) \cdot (1 + \cos(x))) = \frac{2 + 2\cos(x)}{x + \sin(x)}. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} h'(x) &= \left(e^{\sin(\sqrt{x}) \cdot \log(x)} \right)' \stackrel{\text{Kettenregel}}{=} (\sin(\sqrt{x}) \cdot \log(x))' \cdot \left(e^{\sin(\sqrt{x}) \cdot \log(x)} \right) \\ &\stackrel{\text{Produktregel}}{=} (\sin(\sqrt{x})' \cdot \log(x) + \sin(\sqrt{x}) \cdot \log(x)') \cdot x^{\sin(\sqrt{x})} \\ &\stackrel{\text{Kettenregel}}{=} \left(\cos(\sqrt{x}) \cdot (\sqrt{x})' \cdot \log(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x} \right) x^{\sin(\sqrt{x})} \\ &= \left(\frac{\cos(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}} \cdot \log(x) + \frac{\sin(\sqrt{x})}{x} \right) \cdot x^{\sin(\sqrt{x})}. \end{aligned}$$

ii.) Wir unterscheiden in unserer Analysis drei Fälle.

$x = 0$

Zuerst zeigen wir $x = 0$ ein lokales Minimum von f ist. Dazu bemerken wir $f(0) = 0$. Weiter gilt

$$0 < h \implies f(h) = \underbrace{(1+h)}_{>0} \underbrace{\sqrt{h}}_{>0} > 0$$

und

$$-1 < h < 0 \implies f(h) = \underbrace{(1+h)}_{>0} \underbrace{\sqrt{-h}}_{>0} > 0.$$

$x > 0$

Nun zeigen wir, dass f keine Extrema in $(0, \infty)$ besitzt. Für $x > 0$ gilt $f(x) = (1+x)\sqrt{x}$. f ist hier differenzierbar. Es gilt

$$0 = f'(x) \stackrel{\text{Produktregel}}{=} \sqrt{x} + \frac{1+x}{2\sqrt{x}} = \frac{3x+1}{2\sqrt{x}} \iff 0 = 3x+1 \iff x = -\frac{1}{3}.$$

Damit besitzt die Gleichung $f'(x) = 0$ in $(0, \infty)$ keine Lösung. Aus Prop. 8.7 folgt, dass f keine Extrema in $(0, \infty)$ besitzt.

$x < 0$ Für $x > 0$ gilt $f(x) = (1+x)\sqrt{-x}$. f ist hier differenzierbar. Es gilt

$$0 = f'(x) \stackrel{\text{Produktregel, Kettenregel}}{=} \sqrt{-x} - \frac{1+x}{2\sqrt{-x}} = -\frac{3x+1}{2\sqrt{-x}} \iff 0 = -3x-1 \iff x = -\frac{1}{3}.$$

Es gilt $f'(x) > 0$ für $x < -1/3$ und $f'(x) < 0$ für $-1/3 < x < 0$. Aus Prop. 8.13 folgt, dass $x = -1/3$ ein lokales Maximum von f ist. Dies kann man alternativ auch mit Prop. 8.26 beweisen, da

$$f''(x) \stackrel{\text{Quotientenregel}}{=} -\frac{6\sqrt{-x} + \frac{(3x+1)}{\sqrt{-x}}}{-4x} = -\frac{1}{-4x} \cdot \frac{-3x+1}{\sqrt{-x}}$$

und damit

$$f''\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{\sqrt{\frac{1}{3}}} > 0.$$

Damit sind $\{-1/3, 0\}$ alle lokalen Extrema von f .

Aufgabe 53. Zeigen Sie, dass die Exponentialabbildung auf \mathbb{R} konvex ist und zeigen Sie $e^x \geq 1+x$ für alle $x \in \mathbb{R}$.

Solution:

Es gilt $(e^x)'' = e^x > 0$. Aus Prop. 8.21 folgt, dass die Exponentialabbildung konvex ist. Aus Prop. 8.20 folgt

$$e^z \leq \frac{e^y - e^z}{y - z} \leq e^y, \quad \text{für } z \leq y.$$

Falls $x > 0$, setzen wir $z = 0, y = x$

$$1 = e^0 \leq \frac{e^x - e^0}{x - 0} = \frac{e^x - 1}{x} \implies 1 + x \leq e^x.$$

Falls $x < 0$, setzen wir $z = x, y = 0$

$$\frac{1 - e^x}{-x} = \frac{e^0 - e^x}{-x} \leq e^0 = 1 \implies 1 - e^x \leq -x \implies 1 + x \leq e^x.$$

Aufgabe 54. (★) Zeigen Sie, dass für alle $x, y \in \mathbb{R}$ mit $0 \leq y < x$ gilt:

$$ny^{n-1} \leq \frac{x^n - y^n}{x - y} \leq nx^{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Solution:

Für $y = 0$ ist die Aussage trivial. Sei $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ und $f : \mathbb{R}_{>0} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^n$. Es gilt $f^{(2)}(x) = n(n-1)x^{n-2} \geq 0$. Mit Prop. 8.21 ist f konvex und die Aussage folgt aus Prop. 8.20.

Aufgabe 55. (★) Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob Sie wahr oder falsch ist:

- i.) Als Folge in $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ hat $f_n(x) = x^n$ keine konvergente Teilfolge.
- ii.) Die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) = x^2 \cos(1/x)$ für $x \neq 0$ und $f(0) = 0$ ist in $x = 0$ differenzierbar.

- iii.) Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvex. Dann ist f auf \mathbb{R} differenzierbar.
- iv.) Ist $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ gleichmäßig stetig und auf $(0, 1)$ differenzierbar, dann ist f' beschränkt.
- v.) Ist $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und es gibt ein $x_0 \in (0, 1)$ mit $f'(x_0) = 0$, so hat f in x_0 ein lokales Extremum.

Solution:

i.) Wahr. Nehmen wir an, es gäbe eine gleichmäßig konvergente Teilfolge $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$. Diese konvergiert punktweise gegen $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} 0, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$. Damit $f_{n_k} \rightarrow f$ gleichmäßig. Da die f_n stetig sind, ist f stetig (Prop. 6.24). Dies ist offensichtlich nicht der Fall, also Widerspruch.

ii.) Wahr. Es gilt

$$0 \leq \left| \frac{h^2 \cos(\frac{1}{h}) - 0}{h - 0} \right| = |h| \cdot \left| \cos\left(\frac{1}{h}\right) \right| \leq |h| \rightarrow 0, \quad \text{für } h \rightarrow 0.$$

Damit gilt $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = 0$. Also ist f in $x = 0$ differenzierbar (mit $f'(0) = 0$).

iii.) Falsch, der Absolutbetrag ist ein Gegenbeispiel (nicht differenzierbar in $x = 0$).

iv.) Falsch. Gegenbeispiel $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} x^2 \cos(\frac{1}{x^3}), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ Man beweist analog

zu ii.), dass f stetig ist. Da $[0, 1]$ kompakt ist, ist f gleichmäßig stetig (Satz 6.22). Mittels der Kettenregel (Prop. 8.5) erhalten wir für $x \in (0, 1)$: $f'(x) = 2x \cos(\frac{1}{x^3}) + \frac{1}{x^2} \sin(\frac{1}{x^3})$. Der erste Term ist durch 1 beschränkt und der zweite ist unbeschränkt, also ist f' unbeschränkt.

Ein alternatives Gegenbeispiel ist $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \sqrt{x}$. Wieder folgt aus Satz 6.22, dass g gleichmäßig stetig ist. Jedoch ist $g'(x) = 1/\sqrt{x}$ unbeschränkt auf $(0, 1)$.

v.) Falsch, Gegenbeispiel $f(x) = (x - \frac{1}{2})^3$. $f'(\frac{1}{2}) = 2 \cdot (\frac{1}{2} - \frac{1}{2})^2 = 0$, aber $x = \frac{1}{2}$ ist weder lokales Maximum, noch Minimum von f . Da $f(\frac{1}{2}) = (\frac{1}{2} - \frac{1}{2})^3 = 0$.

Für $x < \frac{1}{2}$ gilt $x - \frac{1}{2} < 0$ und damit $f(x) = (x - \frac{1}{2})^3 < 0$.

Für $x > \frac{1}{2}$ gilt $x - \frac{1}{2} > 0$ und damit $f(x) = (x - \frac{1}{2})^3 > 0$.

Aufgabe 56. Sei im folgenden $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar.

- i) Verwenden Sie den Satz von Rolle um den Mittelwertsatz zu beweisen.
- ii) Sei $f'(x) = 0$ für alle $x \in (a, b)$, dann gilt: $f(x)$ ist auf (a, b) konstant.
- iii) Beweisen Sie die folgende Identität

$$\arctan(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}.$$

iv) Es gilt $f'(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$, dann ist f auf (a, b) monoton wachsend.

Solution:

i) Wir definieren die Hilfsfunktion $g(x) := f(x) - rx$ wobei $r = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, es gilt dann $g(a) = g(b)$ weil

$$g(x) = f(x) - rx = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x = \frac{f(x)(b - a) - (f(b) - f(a))x}{b - a}$$

Desweiteren erfüllt g die Annahme von Rolle's Theorem, also stetig auf $[a, b]$ und differenzierbar auf (a, b) . Also existiert eine $c \in (a, b)$ sodass $g'(c) = 0$ gilt. Also

$$g'(c) = 0 = f'(c) - r \iff f'(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

- ii) Seien $x_1, x_2 \in (a, b)$ beliebig. Die Voraussetzungen für den Mittelwertsatz sind erfüllt, also erhalten wir die Existenz eines $c \in (a, b)$ mit

$$\underbrace{f'(c)}_{=0} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \implies f(x_2) = f(x_1)$$

Also folgt, dass f auf (a, b) konstant sein muss.

- iii) Wir definieren $f(x) = \arctan(x) + \arccos(x)$, wir erhalten dann

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

Also muss gemäss ii) f konstant auf ganz \mathbb{R} sein. Wir bestimmen die Konstante indem wir f an der Stelle $x = 1$ auswerten, wir erhalten dann

$$f(1) = \arctan(1) + \arccos(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

Wir erhalten also

$$\arctan(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$$

- iv) Wir verwenden erneut den Mittelwertsatz welchen wir in Aufgabe i) bewiesen haben. Wir haben die Existenz eines $c \in (a, b)$ sodass

$$\underbrace{f'(c)}_{>0} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \tag{*}$$

Da aber natürlich auch $x_2 - x_1 > 0$ gilt, folgt aus (*), dass $f(x_2) - f(x_1) > 0$ also $f(x_2) > f(x_1)$ und somit ist f auf (a, b) monoton wachsend.

8 Integrationsrechnung

Aufgabe 57. Entscheiden Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind, begründen Sie Ihre Antwort.

i) Es sei $f : [a, b] \rightarrow [0, \infty)$. Dann gilt: $\int_a^b f(x) \, dx = 0 \iff f \equiv 0$.

ii) Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sodass $f \leq g$. Dann gilt: $\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$.

iii) Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Dann impliziert $\int_a^b f(x) \, dx > 0$, dass $f > 0$.

iv) Sei $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_+$ monoton fallend mit $\int_0^\infty f(x) \, dx < \infty$. Dann gilt: $\sum_{n=0}^\infty f(n) < \infty$.

Solution:

i.) Falsch. Sei z.B. $f(a) = 1$ und $f(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b]$. Dann ist f nicht konstant null, aber das Integral schon.

Bemerkung: Falls f zusätzlich noch stetig ist, wäre die Aussage wahr.

ii.) Wahr, Theorem aus Vorlesung, bekannt als die Monotonie des Integrals.

iii.) Falsch. Der negative Teil von f muss nur eine kleinere Fläche haben, als der positive Teil, z.B. $f : [-1, 3] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$. Dann gilt

$$\int_{-1}^3 f(x) \, dx = \left. \frac{1}{2}x^2 \right|_{-1}^3 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4 > 0$$

und $f(-1) = -1 < 0$.

iv.) Wahr. Wir benutzen das Integralkriterium für Reihen (Satz 10.5.11). Das liefert uns die Konvergenz der Reihe, sobald wir gezeigt haben, dass $\int_0^\infty g(x) \, dx < \infty$, wobei $g(x) := f(n)$ falls $x \in [n, n+1)$. Da f monoton fallend ist, gilt $g(x) = f(n) \leq f(n-1) \leq f(x-1) \quad \forall x \in [n, n+1), n \in \mathbb{N}$. Also gilt $g(x) \leq f(x-1) \quad \forall x \in [0, \infty)$ und deshalb

$$\int_0^\infty g(x) \, dx = \int_0^1 g(x) \, dx + \int_1^\infty g(x) \, dx \leq a_0 + \int_1^\infty f(x-1) \, dx = a_0 + \int_0^\infty f(x) \, dx < \infty.$$

Aufgabe 58. Es sei $t \in \mathbb{R}_{>1}$. Berechnen Sie die folgenden Integrale:

i)

$$\int_0^t x^2 (\ln(x))^2 \, dx.$$

ii)

$$\int_1^3 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} \, dx.$$

iii)

$$\int_0^t \sin(3x) \cos(5x) \, dx.$$

iv)

$$\int_{-2}^3 \frac{56x^7 \cos(\ln(x^8 + 6))}{x^8 + 6} dx.$$

v)

$$\int_0^3 \frac{\cos(x)}{1 + \cos(x)} dx.$$

vi)

$$\int_{-1}^1 \cos(3x) \sqrt{x^4 + 3x^2 + 4} dx.$$

vii)

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}} dx.$$

viii)

$$\int_0^1 \ln(1 + x^2) dx.$$

ix)

$$\int_2^4 \frac{x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^2 + x - 2} dx.$$

Solution:

i.) Wir benutzen zwei mal partielle Integration (PI).

$$\begin{aligned} \int_1^t x^2 (\ln(x))^2 dx &\stackrel{PI}{=} \frac{1}{3} x^3 (\ln(x))^2 \Big|_1^t - \int_1^t \frac{1}{3} x^3 \cdot 2 \frac{1}{x} \ln(x) dx \\ &= \frac{1}{3} t^3 (\ln(t))^2 - \int_1^t \frac{2}{3} x^2 \ln(x) dx \\ &\stackrel{PI}{=} \frac{1}{3} t^3 (\ln(t))^2 - \left(\frac{2}{9} x^3 \ln(x) \Big|_1^t - \int_1^t \frac{2}{9} x^3 \cdot \frac{1}{x} dx \right) \\ &= \frac{1}{3} t^3 (\ln(t))^2 - \frac{2}{9} t^3 \ln(t) + \int_1^t \frac{2}{9} x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} t^3 (\ln(t))^2 - \frac{2}{9} t^3 \ln(t) + \frac{2}{27} x^3 \Big|_1^t \\ &= \frac{1}{3} t^3 (\ln(t))^2 - \frac{2}{9} t^3 \ln(t) + \frac{2}{27} t^3 - \frac{2}{27}. \end{aligned}$$

ii.) 1. Möglichkeit: Partialbruchzerlegung

Wir bemerken, dass $x^2 + 3x + 2 = (x + 2)(x + 1)$ und suchen nun $a, b \in \mathbb{R}$ mit

$$\frac{2x + 3}{x^2 + 3x + 2} = \frac{a}{x + 2} + \frac{b}{x + 1} = \frac{a(x + 1) + b(x + 2)}{x^2 + 3x + 2} = \frac{x(a + b) + (a + 2b)}{x^2 + 3x + 2}.$$

Wir vergleichen die Koeffizienten von den Zählern vom ersten und dem letzten Bruch und kommen auf das Gleichungssystem $\begin{cases} 2 = a + b \\ 3 = a + 2b \end{cases}$.

Das hat die Lösung $a = 1 = b$ und wir schliessen daraus, dass

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} dx &= \int_1^3 \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x+1} dx = \left(\ln(x+2) + \ln(x+1) \right) \Big|_1^3 \\ &= \ln((x+2)(x+1)) \Big|_1^3 = \ln(20) - \ln(6) = \ln\left(\frac{20}{6}\right) = \ln\left(\frac{10}{3}\right). \end{aligned}$$

2. Möglichkeit: Substitution

Sei $u(x) := x^2 + 3x + 2$. Dann gilt $u'(x) = 2x + 3$, was genau dem Zähler entspricht. Wir rechnen also

$$\int_1^3 \frac{2x+3}{x^2+3x+2} dx = \int_1^3 \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \int_{u(1)}^{u(3)} \frac{1}{u} du = \ln(u) \Big|_{1^2+3 \cdot 1+2}^{3^2+3 \cdot 3+2} = \ln(20) - \ln(6) = \ln\left(\frac{10}{3}\right).$$

- iii.) Wir benutzen zwei mal partielle Integration (PI) um wieder zum ursprünglichen Integral zu kommen.

$$\begin{aligned} &\int_0^t \sin(3x) \cos(5x) dx \\ &\stackrel{PI}{=} -\frac{1}{3} \cos(3x) \cos(5x) \Big|_0^t - \int_0^t \left(-\frac{1}{3} \cos(3x) \right) (-5 \sin(5x)) dx \\ &= -\frac{1}{3} \cos(3t) \cos(5t) + \frac{1}{3} - \int_0^t \frac{5}{3} \cos(3x) \sin(5x) dx \\ &\stackrel{PI}{=} -\frac{1}{3} \cos(3t) \cos(5t) + \frac{1}{3} - \frac{5}{3} \left(\frac{1}{3} \sin(3x) \sin(5x) \Big|_0^t - \int_0^t \frac{1}{3} \sin(3x) \cdot 5 \cos(5x) dx \right) \\ &= -\frac{1}{3} \cos(3t) \cos(5t) + \frac{1}{3} - \frac{5}{9} \sin(3t) \sin(5t) + \frac{25}{9} \int_0^t \sin(3x) \cos(5x) dx \end{aligned}$$

Nun subtrahieren wir den letzten Term und bekommen

$$\left(1 - \frac{25}{9}\right) \int_0^t \sin(3x) \cos(5x) dx = -\frac{1}{3} \cos(3t) \cos(5t) + \frac{1}{3} - \frac{5}{9} \sin(3t) \sin(5t).$$

Teilen wir durch $-\frac{16}{9}$, liefert uns das das gewünschte Resultat

$$\int_0^t \sin(3x) \cos(5x) dx = \frac{3}{16} \cos(3t) \cos(5t) - \frac{3}{16} + \frac{5}{16} \sin(3t) \sin(5t).$$

- iv.) Wir benutzen die Substitutionsmethode mit $u(x) := \ln(x^8 + 6)$. Dann gilt $u'(x) = \frac{8x^7}{x^8+6}$ und wir erkennen, dass

$$\begin{aligned} \int_{-2}^3 \frac{56x^7 \cos(\ln(x^8+6))}{x^8+6} dx &= \int_{-2}^3 7u'(x) \cos(u(x)) dx = 7 \int_{u(-2)}^{u(3)} \cos(u) du \\ &= 7 \sin(u) \Big|_{\ln(262)}^{\ln(6567)} = 7 \sin(\ln 6567) - 7 \sin(\ln 262) \end{aligned}$$

- v.) Wir benutzen den Additionssatz und $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ für

$$1 + \cos(x) = 1 + \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = 1 + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = 2 \cos^2\left(\frac{x}{2}\right),$$

und deshalb ist

$$\left(\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right)' = \frac{1/2}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} = \frac{1}{1 + \cos(x)}.$$

Wir berechnen nun das Integral

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{\cos(x)}{1 + \cos(x)} dx &= \int_0^3 \frac{1 + \cos(x) - 1}{1 + \cos(x)} dx = \int_0^3 1 - \frac{1}{1 + \cos(x)} dx \\ &= \left(x - \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right) \Big|_0^3 = 3 - \tan\left(\frac{3}{2}\right). \end{aligned}$$

vi.) Die Funktion ist als Produkt einer ungeraden Funktion mit einer geraden Funktion ungerade, nämlich sei $f(x) := \cos(3x)\sqrt{x^4 + 3x^2 + 4}$. Dann gilt für $x \in [-1, 1]$

$$f(-x) = \cos(-3x)\sqrt{(-x)^4 + 3(-x)^2 + 4} = -\cos(3x)\sqrt{x^4 + 3x^2 + 4} = -f(x).$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \cos(3x)\sqrt{x^4 + 3x^2 + 4} dx &= \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_0^1 f(-x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\ &= -\int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = 0. \end{aligned}$$

vii.) Wir benutzen die dritte binomische Formel.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}} dx &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x+2}} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}} dx \\ &= \int_0^1 \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}}{x+1 - (x+2)} dx \\ &= \int_0^1 -(\sqrt{x+1} - \sqrt{x+2}) dx \\ &= \left(-\frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x+2}}\right) \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{3}} + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

viii.) Wir integrieren partiell.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln(1+x^2) \cdot 1 dx &= \ln(1+x^2)x \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} \cdot x dx \\ &= \ln(2) - \int_0^1 \frac{2(x^2+1) - 2}{1+x^2} dx \\ &= \ln(2) - \int_0^1 2 - \frac{2}{1+x^2} dx \\ &= \ln(2) - (2x - 2 \arctan(x)) \Big|_0^1 \\ &= \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

ix.) Da der Grad des Zählers grösser ist als der Grad des Nenners müssen wir zuerst eine Polynomdivision durchführen, wir erhalten

$$\frac{x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^2 + x - 2} = x^2 + 3 + \frac{-3x + 7}{x^2 + x - 2}$$

Weil

$$\begin{array}{r} (x^4 + x^3 + x^2 + 1) \div (x^2 + x - 2) = x^2 + 3 + \frac{-3x + 7}{x^2 + x - 2} \\ \underline{-x^4 - x^3 + 2x^2} \\ 3x^2 \\ \underline{-3x^2 - 3x + 6} \\ -3x + 7 \end{array}$$

Für den zweiten Term verwenden wir Partialbruch Zerlegung, wir verwenden den Ansatz

$$\frac{-3x + 7}{x^2 + x - 2} = \frac{-3x + 7}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{x - 1}$$

Wir erhalten also nach Multiplikation mit $(x + 2)(x - 1)$ die Aussage

$$A(x - 1) + B(x + 2) = -3x + 7$$

Setzen wir $x = 1$ erhalten wir $B = \frac{4}{3}$ und für $x = -2$ erhalten wir $A = -\frac{13}{3}$

Somit haben wir gezeigt, dass

$$\frac{x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^2 + x - 2} = x^2 + 3 - \frac{13}{3} \frac{1}{x + 2} + \frac{4}{3} \frac{1}{x - 1}$$

Nun liefert die Integrations über die Grenzen schliesslich

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{x^4 + x^3 + x^2 + 1}{x^2 + x - 2} dx &= \frac{x^3}{3} + 3x - \frac{13}{3} \ln(x + 2) + \frac{4}{3} \ln(x - 1) \Bigg|_{x=2}^{x=4} \\ &= \frac{74}{3} + \ln\left(\frac{16\sqrt[3]{2}}{27}\right) \end{aligned}$$