

A



MS CXCR3+ B cells: CSF vs PB
Other genes
Zinc/MT (ns)
Zinc/MT (padj < 0.05)
−log10(padj)
log2FC (CSF vs PB)

B



*
MS Zinc/MT genes: CSF vs PB
log2FC (CSF vs PB)


SLC39A10
MT1X
SLC30A1
SLC39A4
MT1E
SLC39A14
MT1F
SLC39A1
SLC39A6
SLC30A9
SLC39A9
SLC39A11
SLC39A7
MT2A


C


HC CXCR3+ B cells: CSF vs PB
Other genes
Zinc/MT (ns)
−log10(padj)
log2FC (CSF vs PB)

D


HC Zinc/MT genes: CSF vs PB
log2FC (CSF vs PB)
MT1X
SLC39A10
MT2A
SLC30A1
SLC39A4
SLC39A14
MT1F
SLC39A9
MT1E
SLC30A9
SLC39A1
SLC39A11
SLC39A6
SLC39A7


HC CXCR3+ – PB vs CSF (unsigned (plain mean))
Paired Wilcoxon signed-rank p = 9.38e-01 (n=7 subject pairs)
Patient-level mean zinc/MT signature (unsigned (plain mean))
PB
(n=7)
CSF
(n=7)


MS CXCR3+ – PB vs CSF (unsigned (plain mean))
Paired Wilcoxon signed-rank p = 7.02e-01 (n=18 subject pairs)
Patient-level mean zinc/MT signature (unsigned (plain mean))
PB
(n=18)
CSF
(n=18)