

Labo 4 - ARN

Bleuer Rémy, Duruz Florian

08.05.2026

Labo 5 - Partie 1 - ARN

Authors: Bleuer Rémy, Duruz Florian

Date: 08.05.2026

Intro

L'objectif de ce TP est d'utiliser le transfer learning pour classer trois espèces d'oiseaux : Mésange noire, Mésange charbonnière et Moineau. Le modèle de base utilisé est MobileNetV2, pré-entraîné sur ImageNet (1000 classes). Les couches de classification sont remplacées et entraînées sur un petit dataset collecté via Bing (50 images par classe).

Different results

The basic configuration is used and every time i modified a parameter a took a new screenshot of the graph and the confusion matrix.

1 hidden layer, 256 neurons

1 hidden layer, 128 neurons, freeze

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout, 0.0001 learning rate

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout, 0.00001 learning rate

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout, 0.0001 learning rate, 15 epochs

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout, 0.0001 learning rate, 10 epochs, 16 batch size

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout, 0.0001 learning rate, 15 epochs, 16 batch size, early stopping

2 hidden layers, 128 neurons each, freeze, 0.3 dropout, 0.0001 learning rate, 15 epochs, 16 batch size, early stopping, data augmentation

Conclusion

La configuration finale combine : 2 couches denses (128 neurones), dropout 0.3, learning rate 1e-4, batch size 16, 15 epochs maximum avec early stopping (patience=2), et data augmentation (flip horizontal + rotation). Cette configuration atteint une val accuracy stable entre 90 et 100% sur la validation croisée 5-fold, avec un bon équilibre entre biais et variance. Le facteur le plus impactant s'est avéré être la data augmentation, particulièrement importante étant donné la petite taille du dataset (50 images par classe).