

Complex Analysis

Renan Wenzel

5 de janeiro de 2023

Conteúdo

1	Aula 01 - 03/01/2023	3
1.1	Motivações	3
1.2	Definições Básicas	3
1.2.1	Unicidade	3
1.2.2	Subcorpo	3
1.2.3	Estrutura Algébrica Independe de F	4
1.2.4	Existência	4
1.3	Representação Polar de \mathbb{C}	4
1.4	A Esfera de Riemann	5
1.5	Topologia de \mathbb{C}	5
2	Aula 02 - 05/01/2023	7
2.1	Motivações	7
2.2	Fim de Conexos	7
2.3	Sequências e Completude	8
2.4	Compactos	9
2.5	Continuidade	9
2.6	Convergência Uniforme	10

1 Aula 01 - 03/01/2023

1.1 Motivações

- Definir o corpos dos complexos
- Definir a topologia no corpo dos complexos
- Esfera de Riemann

1.2 Definições Básicas

Definição. Um corpo F é um conjunto não vazio em que definem-se duas operações $+$: $F \times F \rightarrow F$, \cdot : $F \times F \rightarrow F$ satisfazendo:

i) $w + z = z + w$

ii) $w + (z + u) = (w + z) + u$

iii) Existe 0 em F tal que $w + 0 = w$

iv) Para cada $w \in F$, existe $-w \in F$ tal que $w + (-w) = 0$

v) $w \cdot z = z \cdot w$

vi) $w \cdot (z \cdot u) = (w \cdot z) \cdot u$

vii) Existe $e \in F$ tal que $w \cdot e = w$

viii) Para cada $w \in F - \{0\}$, existe $w^{-1} \in F$ tal que $w \cdot w^{-1} = e$

ix) $(w + z) \cdot u = w \cdot u + z \cdot u$,

em que w, z, u pertencem a F .

Considere F um corpo contendo \mathbb{R} e tal que

$$x^2 + 1 = 0$$

tenha solução. Seja i esta solução. Segue que $-i$ é solução dela também, $-1 \cdot z = z$ e $0 \cdot z = 0$ para z em F . Definimos

$$\mathbb{C} := \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$$

de maneira que os elementos de \mathbb{C} são unicamente determinados, \mathbb{C} é subcorpo de F e a estrutura algébrica de \mathbb{C} não depende de F . Além disso, este corpo existe.

Com efeito,

1.2.1 Unicidade

Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que

$$a + bi = c + di.$$

Assim, $a - c = i(d - b) \Rightarrow (a - c)^2 = (d - b)^2$, donde segue a unicidade $a = c$ e $d = b$

1.2.2 Subcorpo

Exercício.

1.2.3 Estrutura Algébrica Independe de F

Seja F outro corpo contendo \mathbb{R} em que $x^2 + 1 = 0$ possui solução. Considere $\mathbb{C}' = \mathbb{R} + j\mathbb{R}$, em que j é a solução da equação em F'. Definimos $T : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}'$ por

$$T(a + bi) = a + bj$$

e, neste caso, $T(z + w) = T(z) + T(w)$, $T(zw) = T(z)T(w)$ para todos $z, w \in \mathbb{C}$. (Exercício.)

1.2.4 Existência

Seja $F = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ munido das operações $+: F \times F \rightarrow F$, $\cdot: F \times F \rightarrow F$ dadas por

$$\begin{aligned} +((a, b), (c, d)) &= (a + c, b + d) \\ \cdot((a, b), (c, d)) &= (ac - bd, ad + bc). \end{aligned}$$

Note que $(0, 1)^2 = (-1, 0)$. Assim, $(F, +, \cdot)$ é um corpo contendo \mathbb{R} . (Exercício.)

Algumas propriedades(Exercícios):

- a) $Re(z) \leq |z|$ e $Im(z) \leq |z|$
- b) $\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w}$ e $\overline{z \cdot w} = \overline{z} \cdot \overline{w}$
- c) $\overline{\frac{1}{z}} = \frac{1}{\overline{z}}$
- d) $|z| = |\overline{z}|$ e $|z|^2 = z \cdot \overline{z}$
- e) $z + \overline{z} = 2Re(z)$, $z - \overline{z} = 2iIm(z)$ e $\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{|z|^2}$

1.3 Representação Polar de \mathbb{C}

Dado $z \in \mathbb{C}$, temos

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta), \quad \theta = \arg z.$$

Neste caso, temos, para z não-nulo,

$$z^{-1} = |z|^{-1}(\cos -\theta + i \sin -\theta) = |z|^{-1}(\cos \theta - i \sin \theta)$$

Para $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, temos

$$z_1 \cdot z_2 = |z_1||z_2|(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2))$$

com $\theta_1 = \arg z_1, \theta_2 = \arg z_2$. Mais geralmente,

$$\prod_{k=1}^n z_k = \prod_{k=1}^n |z_k|(\cos(\sum_{k=1}^n \theta_k) + i \sin(\sum_{k=1}^n \theta_k)),$$

com $\theta_k = \arg z_k$. Em particular,

$$z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)), \quad n \in \mathbb{N}.$$

Buscando w tal que $w^n = z$ para dado z não-nulo,

$$w = |z|^{\frac{1}{n}}(\cos(\frac{\theta + 2k\pi}{n}) + i \sin(\frac{\theta + 2k\pi}{n})), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

1.4 A Esfera de Riemann

Considere $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ a esfera

$$\mathbb{S}^2 := \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}.$$

Chame $N = \{0, 0, 1\}$ de polo norte. Fazemos uma associação entre $\mathbb{S}^2 - \{N\}$ e o plano $z=0$ de \mathbb{R}^3 , chamada de projeção estereográfica. Nessa associação, o ponto $z (= x + iy) \in \mathbb{C}$ é associado a $(x, y, 0)$, e definimos uma reta por N e z como $r: N + t(x, y, -1), t \in \mathbb{R}$. Assim,

$$r \cap \mathbb{S}^2 \Rightarrow S_z = \left(\frac{2x}{|z|^2 + 1}, \frac{2y}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right) \in \mathbb{S}^2$$

Reciprocamente, o ponto (x, y, z) de \mathbb{S}^2 pode ser associado ao considerar a reta $r: N + t(x, y, s-1)$, em que s é um número real. Com isso, a intersecção $r \cap \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\} \Rightarrow t = \frac{1}{1-s}$ mostra que $z = \left(\frac{x}{1-s}, \frac{y}{1-s}, 0 \right)$ corresponde ao ponto z de \mathbb{C} .

Associando N ao infinito, obtemos o plano estendido $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, chamado de Esfera de Riemann. Se $\phi: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{S}^2$ é dada por $\phi(\infty) = N$ e, para $z \neq \infty$,

$$\phi(z) = \left(\frac{z + \bar{z}}{|z|^2 + 1}, \frac{z - \bar{z}}{|z|^2 + 1}, \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1} \right),$$

então dados $z, w \in \mathbb{C}_\infty$, definimos a métrica

$$d(z, w) = \begin{cases} \|\phi(z) - \phi(w)\|, & z, w \neq \infty \\ 0, & z = w = \infty \\ \infty, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Exemplo 1.1. Se $z, w \neq \infty$, então

$$d(z, w) = d(\phi(z), \phi(w)) = \frac{2|z - w|}{[(1 + |z|^2)(1 + |w|^2)]^{\frac{1}{2}}}$$

e, se $z \neq \infty$,

$$d(z, \infty) = \|\phi(z) - N\| = \frac{2}{(1 + |z|^2)^{\frac{1}{2}}}$$

1.5 Topologia de \mathbb{C}

Definição. Sejam X um conjunto e $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Dizemos que d é uma métrica se

- i) $d(x, y) \geq 0, d(x, y) = 0 \iff x = y$
- ii) $d(x, y) = d(y, x)$
- iii) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$,

em que x, y, z pertencem a X . Neste caso, chamamos a terna (X, d) de espaço métrico.

Considere (X, d) um espaço métrico. Dado x em X e $r > 0$,

$$B(x, r) := \{y \in X : d(x, y) < r\}$$

é a bola aberta, seu fecho é

$$B_c(x, r) := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$$

e a bola fechada é a união deles, ou seja,

$$\overline{B(x, r)} := \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$$

Exemplo 1.2. Considere X não-nulo e $d(x, y) = \delta_{x,y}$. (X, d) é métrico e

$$B\left(x, \frac{1}{2}\right) = \{x\} = \overline{B\left(x, \frac{1}{2}\right)} = B\left(x, \frac{1}{333}\right), x \in X$$

$$B(x, 2) = X = B(x, 1001), x \in X$$

Utilizando bolas, definimos que um conjunto $A \subset X$ é aberto se para todo x em A , existe $r > 0$ tal que $B(x, r)$ está contido em A . Por outro lado, um conjunto é fechado se seu complementar é aberto. A união infinita de abertos é aberta e, pelas Leis de DeMorgan, a intersecção infinita de fechados é fechada. Além disso, intersecções finitas de abertos é aberta e união finita de fechados é fechado.

Definimos, também, o interior de A como $A^\circ := \cup_B \{B \subset A : B \text{ aberto}\}$, o fecho de A como $\overline{A} = \cap_F \{A \subseteq F : F \text{ fechado}\}$ e o bordo de A como $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A}^c$. Diremos que A é denso quando $\overline{A} = X$.

Proposição. Seja (X, d) um espaço métrico e A um subconjunto. Então,

- i) A é aberto se, e só se, $A = A^\circ$
- ii) A é fechado se, e só se, $A = \overline{A}$
- iii) Se x pertence a A° , então existe $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \subseteq A$.
- iv) Se x pertence a \overline{A} , então para todo $\epsilon > 0$ tal que $B(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$.

Um espaço métrico (X, d) é conexo se os únicos subconjuntos abertos e fechados de X são X e vazio. Caso contrário, X é dito ser desconexo, ou seja, existem abertos disjuntos não-vazios cuja união dá o espaço todo. Um exercício é mostrar que um conjunto é conexo se, e só se, ele é um intervalo.

Dados z, w em \mathbb{C} , o segmento $[z, w]$ é o conjunto

$$[z, w] := \{tw + (1-t)z : t \in [0, 1]\}$$

Além disso, dados z_1, \dots, z_n , a poligonal com esses vértices é

$$[z_1, \dots, z_n] = \bigcup_{k=1}^{n-1} [z_k, z_{k+1}]$$

Proposição. Seja G um subconjunto de \mathbb{C} aberto. Então, G é conexo se, e só se para todo z, w em G , existe uma poligonal $[z, z_1, \dots, z_n, w] \subseteq G$.

Prova. \Leftarrow) Assumindo que G satisfaz a propriedade da poligonal, suponha também que G não é conexo. Assim, podemos escrever $G = B \cup C$ com $B \cap C = \emptyset$ e B, C não-vazios. Pela propriedade de G , existe $[b, z_1, \dots, z_n, c] \subseteq G$. Neste caso, existe k tal que $z_k \in B$ e $z_{k+1} \in C$. Agora, considere os conjuntos

$$B' = \{t \in [0, 1] : tz_k + (1-t)z_{k+1} \in B\}$$

$$C' = \{t \in [0, 1] : tz_k + (1-t)z_{k+1} \in C\}$$

e note que $B' \neq \emptyset$ pois $z_k \in B$ e $1 \in B'$. Analogamente, C' é não-vazio. No entanto, isso é um absurdo, pois $[0, 1]$ seria conexo e $B' \cup C'$ seria uma cisão não trivial

\Rightarrow) Suponha, agora, que G é conexo e seja z um elemento dele. Defina

$$C = \{w \in G : \text{Existe } [z, z_1, \dots, z_n, w] \subseteq G\}$$

Observe que C é não-vazio, z pertence a G e $[z]$ é subconjunto de G . Mostremos que C é aberto e fechado (pois implicará em $C = G$). Com efeito, se $w \in C \subseteq G$, existe $r > 0$ tal que $B(w, r)$ está contido em G , pois G é aberto. Assim, para todo $s \in B(w, r)$, temos $[s, w] \subseteq B(w, r)$ e, com isso, existe uma poligonal ligando s a z com $s \in C$, mostrando que C é aberto.

Mostrar que o complementar de C é aberto é análogo. Com efeito, se $C^c = \emptyset$, o resultado está provado. Por outro lado, se $C^c \neq \emptyset$, seja $w \in C^c = G - C$. Logo, existe $r > 0$ tal que $B(w, r) \subseteq G$. Afirmamos que $B(w, r) \subseteq G - C$. Caso contrário, existe s em $B(w, r)$ contido, também, em C . Neste caso, existe uma poligonal ligando s a z e s a w , uma contradição, pois isso conectaria w a z , mesmo com w no complementar de z . Portanto, o complementar é aberto e C é aberto e fechado. ■

2 Aula 02 - 05/01/2023

2.1 Motivações

- Sequências e suas convergências;
- Teorema de Cantor para espaços completos;
- Compacidade e Heine-Borel;
- Continuidade e convergência de funções.

2.2 Fim de Conexos

Teorema. *Seja $G \subseteq \mathbb{C}$ um aberto e conexo, então existe uma poligonal ligando qualquer z, w em G cujos segmentos sejam paralelos ao eixo real ou imaginário.*

Definição. *Um subconjunto de um espaço métrico (M, d) é uma componente conexa se é um conexo maximal*

Exemplo 2.1. *Coloque $A = \{1, 2, 3\} \cdot \{1\}$ é componente conexa de A , mas $\{1, 2\}$ não é.*

Teorema. *Seja (M, d) um espaço métrico. Então,*

- 1) *Para x em M , existe C_x uma componente conexa de M com x em C_x ;*
- 2) *As componentes são disjuntas.*

Prova. 1)

Seja x em M e tomemos

$$C_x = \bigcup_{D \subseteq M} \{D : D \text{ conexos com } x \in D\}$$

Mostremos que C_x é conexo, pois a maximalidade segue da definição dada a ele. Note que $C_x \neq \emptyset$, visto que qualquer conjunto unitário é conexo. Seja $A \subseteq C_x$ aberto, fechado e não-nulo. Existe $D_x \in C_x$ tal que $D_x \cap A \neq \emptyset$, o que implica que $D_x \subseteq A$.

Finalmente, considere $D \in C_x$, de modo que $D_x \cup D$ é conexo e $(D_x \cup D) \cap A \neq \emptyset$ o que garante que $D \subseteq A$. Assim, $A = C_x$. ■.

Exercícios. 1) *Prove a segunda afirmação do teorema;*

- 2) *Se D é conexo e $D \subseteq A \subseteq \overline{D}$, então A é conexo.*

Teorema. *Seja G um subconjunto aberto de \mathbb{C} . As componentes conexas são abertas e há no máximo uma quantidade enumerável delas.*

Prova. *Seja D uma componente conexa de G . Tome $x \in D$, tal que existe $r > 0$ com $B(x, r) \subseteq G$, já que G é aberto. Suponha que $B(x, r) \not\subseteq D$. Neste caso, $B(x, r) \cup D$ seria um conexo contendo D propriamente. Logo, $B(x, r) \subseteq D$ e D é aberto.*

Para a segunda afirmação, considere

$$\Omega = \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}(\overline{\Omega} = \mathbb{C})$$

Para cada componente conexa C de G , como G é aberto, existe $z \in \Omega \cap C$, o que é suficiente para garantir a enumerabilidade das componentes de G . ■.

2.3 Sequências e Completude

Definição. Seja (M, d) um espaço métrico. Uma sequência $\{x_n\}$ de M é convergente se existe x em M tal que para todo $\epsilon > 0$, existe n_0 natural tal que

$$d(x_n, x) < \epsilon, \quad n \geq n_0.$$

Escrevemos, neste caso, $x_n \rightarrow x$. Dizemos que uma sequência é de Cauchy se para todo $\epsilon > 0$, existe n_0 natural satisfazendo

$$d(x_n, x_m) < \epsilon, \quad n, m \geq n_0.$$

Exercícios. i) Se $\{x_n\}$ é convergente, então $\{x_n\}$ é de Cauchy, mas a recíproca é só válida quando a sequência possui uma subsequência convergente.

ii) Se $\{x_n\}$ é de Cauchy, então x_n é limitada.

iii) $F \subseteq M$ é fechado se e só se toda x_n de F com $x_n \rightarrow x$ é tal que x pertence a F .

Dizemos que um espaço métrico é completo se toda sequência de Cauchy for convergente.

Exercícios. i) Mostre que \mathbb{R}, \mathbb{C} são espaços métricos completos;

ii) Se (M, d) é um espaço métrico e $S \subseteq M$, mostre que se (S, d) for completo, ele é fechado em M . Mostre e recíproca no caso em que (M, d) é completo.

O resultado a seguir é conhecido como Teorema de Cantor.

Teorema. Um espaço métrico é completo se e só se toda cadeia descendente de fechado $\{F_n\}$ satisfazendo

$$\text{diam} F_n \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

é tal que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$ é unitário. Aqui, $\text{diam} A := \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$.

Prova. Suponha que M é um espaço métrico completo. Se $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$, então ele é unitário. De fato, se $x, y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n$,

$$d(x, y) \leq \text{diam} F_n (\text{diam} F_{n+1} \leq \text{diam} F_n),$$

mas $\text{diam} F_n \rightarrow 0$ e $d(x, y) = 0$, de modo que $x = y$.

Agora, seja $x_n \in F_n, n \in \mathbb{N}$ e observe que

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq \text{diam} F_n,$$

pois $F_{n+1} \subseteq F_n$. Isto garante que $\{x_n\}$ é de Cauchy e, como M é completo, existe x com $x_n \rightarrow x$. Neste caso, $x \in F_n$ para todo n e $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{x\}$.

Reciprocamente, seja $\{a_n\}$ de Cauchy em M . Construimos

$$F_n = \overline{\{a_k : k \geq n\}}$$

que são fechados satisfazendo $F_{n+1} \subseteq F_n$. Assim, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n = \{x\}$ para algum x de M . Como

$$d(x, a_n) \leq \text{diam} F_n \rightarrow 0,$$

temos, portanto, $a_n \rightarrow x$. ■

Um exercício que fica é mostrar que se $\{a_n\}$ é de Cauchy, então $\text{diam} F_n \rightarrow 0$

2.4 Compactos

Definição. Seja (M, d) um espaço métrico. Um subconjunto $S \subseteq M$ é compacto se para toda coleção \mathcal{A} de abertos de M cobrindo S existe $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ tal que

$$S \subseteq \bigcup_{k=1}^n A_k$$

Dado um espaço métrico (M, d) , M é dito sequencialmente completo se todas as seqüências de M possuem subseqüência convergente. Também diremos que ele é totalmente limitado se para todo $\epsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}, x_1, \dots, x_n \in M$ com

$$M = \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \epsilon).$$

Um conjunto A é dito limitado se seu diâmetro é finito.

Exercícios. i) Se A é totalmente limitado, então A é limitado, mas a recíproca não é necessariamente verdade.

ii) Se A é compacto, então A é limitado, mas a recíproca não é necessariamente verdade.

Proposição. Seja (M, d) um espaço métrico e K um subconjunto de M . Então, K é compacto se e só se toda família de fechados com PIF tem interseção não-vazia.

A PIF é a Propriedade da Interseção Finita, que afirma que dados conjuntos $F_1, \dots, F_n \Rightarrow \bigcap_{k=1}^n F_k \neq \emptyset$

Teorema. Seja (M, d) um espaço métrico. As seguintes afirmações são equivalentes:

- i) M é compacto;
- ii) Para todo conjunto infinito S de M , existe x em S tal que para todo $\epsilon > 0, B(x, \epsilon) \cap S - \{x\} \neq \emptyset$;
- iii) M é sequencialmente compacto;
- iv) M é completo e totalmente limitado.

Teorema. Um conjunto K de \mathbb{R}^n é compacto se e só se ele é fechado e limitado.

Segue um esboço da prova.

Prova. Se K é compacto, ele é completo (logo, fechado) e totalmente limitado (logo, limitado). Por outro lado, se K é fechado e limitado, então K é completo porque \mathbb{R}^n é completo. Além disso, pela propriedade Arquimediana da reta, para todo $\epsilon > 0$, existem $x_1, \dots, x_n \in K$ com

$$K \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \epsilon)$$

2.5 Continuidade

Definição. Sejam $(X, d), (Y, d')$ espaços métricos. $f : X \rightarrow Y$ é contínua em x de X se para todo $\epsilon > 0$, existir $\delta > 0$ tal que

$$d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \epsilon$$

f é dita contínua se isso ocorre para todos os pontos de M .

Exercícios. Mostre que equivalem à definição de contínua:

- i) $f^{-1}(B(x, \epsilon))$ contém uma bola aberta centrada em x , para todo $\epsilon > 0$;
- ii) $x_n \rightarrow x$ implica $f(x_n) \rightarrow f(x)$

iii) $F^{-1}(A)$ é aberta em X para todo aberto A com $x \in A$

Proposição. Sejam $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ funções contínuas. Então,

- 1) $\alpha f + \beta g$ é contínua, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$;
- 2) fg é contínua;
- 3) Se $x \neq 0$, então f/g é contínua em x ;
- 4) Se $h : Y \rightarrow X$ é contínua, então $f \circ h : Y \rightarrow \mathbb{C}$ é contínua.

Definição. Uma função $f : (X, d) \rightarrow (Y, d')$ é uniformemente contínua se para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$d(x, y) < \delta \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \epsilon.$$

Uma função $f : (X, d) \rightarrow (Y, d')$ é Lipschitz se existe $c > 0$ tal que

$$d'(f(x), f(y)) \leq cd(x, y)$$

Teorema. Seja $f : (X, d) \rightarrow (Y, d')$ uma função. Então,

- i) Se X é compacto, então $f(X)$ é compacto;
- ii) Se X é conexo, então $f(X)$ é conexo. Adicionalmente, se $Y = \mathbb{R}$, então $f(X)$ é um intervalo.

Corolário. Se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, então para todo $K \subseteq X$ compacto, existem $x_m, x_M \in K$ tais que

$$f(x_m) = \inf_{x \in K} \{f(x)\}, \quad f(x_M) = \sup_{x \in K} \{f(x)\}$$

Corolário. Nas mesmas condições, mas f uma função complexa, temos

$$|f(x_m)| = \inf_{x \in K} \{|f(x)|\}, \quad |f(x_M)| = \sup_{x \in K} \{|f(x)|\}$$

Teorema. Seja $f : X \rightarrow Y$ contínua. Se X é compacto, então f é uniformemente contínua.

2.6 Convergência Uniforme

Definição. Uma sequência de funções $\{f_n\}$ de X em Y converge pontualmente para $f : X \rightarrow Y$ se

$$f_n(x) \rightarrow f(x), \quad n \rightarrow \infty, \forall x \in X$$

$\{f_n\}$ converge uniformemente para f se para todo $\epsilon > 0$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$\sup_{x \in X} \{d'(f_n(x), f(x))\} < \epsilon, n \geq n_0$$

Teorema. Se $\{f_n\}$ é uma sequência de funções contínuas e $f_n \rightarrow f$ uniformemente, então f é contínua.

Teorema. Seja $u_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ uma sequência de funções satisfazendo

$$|u_n(x)| \leq c_n, n \in \mathbb{N}.$$

Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n < \infty$, então $\sum_{k=1}^n u_k \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n$ uniformemente.