



Micropogonias furnieri (Desmarest , 1823)

Nome Popular: CORVINA ou CASCUDO

Classificação taxonômica:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Actinopterygii

Ordem: Perciformes

Família: Sciaenidae

Gênero: *Micropogonias*

Espécie: *M. furnieri*

Descrição: Possui um corpo ligeiramente comprimido e alongado, com um focinho que se projeta claramente além da boca, moderadamente grande e inferior. A boca apresenta dentes viliformes dispostos em faixas, sendo a fileira externa da mandíbula superior composta por dentes ligeiramente maiores que os demais. O queixo possui 5 poros e entre 3 e 5 barbilhões relativamente pequenos ao longo da lateral da mandíbula inferior, mas não na borda. Há 10 poros no focinho, sendo 5 na parte frontal e 5 na lateral. O olho é relativamente grande. O pré-opérculo apresenta serrilhas robustas ao longo de sua borda. A nadadeira dorsal é incisa, com 10 espinhos à frente da incisão e um único espinho e entre 26 e 30 raios moles após a incisão, tipicamente não mais que 27. A nadadeira anal é sustentada por 2 espinhos, sendo o segundo robusto e com metade do comprimento do primeiro raio da nadadeira anal, e entre 7 e 9 raios moles. A barbatana caudal tem uma borda côncava nos seus lobos superior e inferior, separados por uma ponta angular. Esta espécie tem uma coloração prateada no corpo, com dorso castanho e estrias verticais escuras que se estendem até um pouco abaixo da linha lateral . O comprimento total máximo publicado para o corvina-de-boca-branca é de 60 cm (24 pol.), embora 45 cm (18 pol.) seja mais típico.

Distribuição Geográfica: Ocorre comumente no sul do continente americano, na Argentina, no Brasil e no Uruguai. No Chile, seu hábitat se limita ao lago Budi, um lago salgado do sul do Chile.

Ecologia: É encontrada em profundidades de até 80 m (260 pés) sobre substratos lodosos e arenosos em águas costeiras. Os juvenis, em seu primeiro ano de vida, são encontrados ao redor da foz de rios e em estuários, enquanto os peixes mais velhos vivem em áreas costeiras mais profundas. Esses peixes são eurialinos e capazes de tolerar, até certo ponto, perturbações em seu habitat. A dieta de *Micropogonia furnieri* varia com a idade, sendo que os peixes recém-eclodidos alimentam-se principalmente de copépodes. À medida que crescem, mudam sua presa para crustáceos migratórios, bem como moluscos bentônicos e sésseis. Quando sua presa preferida não está disponível, alimentam-se de uma variedade de presas, incluindo peixes e poliquetas. Reúnem-se em pequenos cardumes fora da época de reprodução, mas formam grandes agregações no verão para se reproduzir, período em que esses peixes emitem a maior parte de seus coaxares. Esse som pode atrair predadores como o golfinho-nariz-de-garrafa (*Tursiops*

truncatus). Os ovos contêm um óleo que os torna flutuantes, permitindo que permaneçam próximos à superfície. A maturidade sexual é atingida entre os 4 meses e os 2 anos de idade.

Estado de conservação: O estado de conservação global da *Micropogonias furnieri* (corvina) na Lista Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) é avaliado como Pouco Preocupante (LC - Least Concern), 2019.



Exemplar taxidermizado da coleção MHN-ISERJ P00001



Distribuição geográfica de *Micropogonias furnieri* (Fonte: Fishbase.org)