

AERIS | KLIENTEN-NOTFALLPASS & VITAL-AUSWEIS

Kompakter Notfall-Ausweis für unterwegs (Arztfahrten / Ausflüge / Mobilität gem. SGB IX)

Zweck des Notfallpasses: Dieser Pass ist bei jedem Außer-Haus-Einsatz (Mobilisation, Klinik- oder Arztfahrten, Freizeit) in der Notfalltasche am Rollstuhl mitzuführen. Er enthält alle lebensrettenden Beatmungsparameter, Kanürendaten, Notfallkontakte und den rechtlichen DNR-Status.

■ EMERGENCY PASS — VITAL- & BEATMUNGSDATEN	AERIS 24/7
Klient / Name:	[Vorname Nachname], Gebdatum: [DD.MM.YYYY]
Adresse / Pflegeort:	[Musterstraße 1, 35232 Dautphetal]
Hauptdiagnose / AKI:	[ALS / COPD / CLES / Z.n. Reanimation]
Reanimations-Status:	☐ DNR - ABSOLUTES REANIMATIONSVERBOT (§ 1827 BGB) ☐ CPR erwünscht
Trachealkanüle:	Hersteller: [Löwenstein / Biesalski], Typ: [Gecufft / Ungecufft], Größe: [CH 8.0], Cuffdruck: 20–25 mmHg
Ersatzkanüle vor Ort:	Gleiche Größe: [CH 8.0] Notfall-Kanüle: [CH 7.0 (1 Größe kleiner)]
Beatmungsgerät:	Modell: [Löwenstein / ResMed], Modus: [PCV / PSV], PEEP: [5 mbar], Vt: [450 ml], FiO2: [21-30%]
Notfall-Equipment:	Notfalltasche inkl. Beatmungsbeutel + O2, Accuvac Absaugpumpe (max -0,2 bar), Trousseau-Spreizer
Notfall-Telefonkette:	1. Notruf: 112 2. AERIS Hotline: 0170 / [René Krieg] 3. Notfall-Pneumologe: [Telefonnummer] 4. 24/7 SAPV-Team: [Palliative Hotline]

SOP-Kurzanweisung für Rettungsdienst & Ersthelfer bei Atemwegskrise

1. **Kanülenverstopfung / Sättigungsabfall:** Umgehend endotracheal absaugen (max. -0,2 bar, Katheter CH 12–14). Wenn blockiert: Cuff entblocken, Kanüle wechseln.
2. **Kanülendislokation:** Stoma mit Trousseau-Spreizer sichern, Ersatzkanüle (CH 8.0 oder Notfallgröße CH 7.0) einführen, Cuff mit 20–25 mmHg füllen.
3. **Beatmungsausfall:** Respirator abkoppeln, manuelle Beutlung mit Notfall-Beatmungsbeutel und 100 % O2 (15 l/min) starten.

Ausgestellt: Dautphetal, 16.09.2026

René Krieg (AERIS · Pflegefachmann AKI)

Gesehen & Bestätigt:

Behandelnder Pneumologe / Hausarzt