

	HOSPITAL DE ACIDENTADOS – CLÍNICA SANTA ISABEL	Procedimento Operacional Padrão
---	---	--

TAREFA	Procedimento Operacional Padrão Para Endoscopia Digestiva Alta	POP Nº.: 08
Local de Execução	Endoscopia Digestiva e Colonoscopia	Data da Emissão: 04/13
Executante	Equipe de Enfermagem	Edição: 1º Revisão: 18 meses

Definição:

É um procedimento que permite visualizar o esôfago, estômago e duodeno até a 2ª porção, considerado a primeira parte do intestino. É realizada se introduzindo um tubo flexível, através da boca, sob sedação. Esse tubo contém uma lente, luzes e um canal onde o médico poderá trabalhar para coletar material ou realizar algum tratamento.

Preparo do exame:

- **PARA PROCEDIMENTOS MARCADOS PELA MANHÃ:**
- É necessário jejum absoluto (não beber nem água), por 12 horas antes do procedimento.
- **PARA PROCEDIMENTOS MARCADOS A TARDE:**
- Jejum absoluto (não beber nem água) por 12 horas antes do procedimento, podendo ingerir um leve café da manhã.

Materiais:

- Materiais de punção periférica,
- Sedativo;
- Xylocaína spray,
- Toalha;
- Bocal;
- Endoscópio,
- Vidro de biópsia, se necessário.

Descrição do Procedimento:



**HOSPITAL DE ACIDENTADOS –
CLÍNICA SANTA ISABEL**

**Procedimento
Operacional
Padrão**

1. Reunir todo o material necessário;
2. Higienização das mãos;
3. Explicar procedimento ao paciente;
4. Calçar as luvas;
5. Pedir ao paciente que deite na maca em posição dorsal;
6. Colocar bocal;
7. Colocar xylocaína spray por via oral;
8. Injetar sedativo no acesso do paciente;
9. Lateralizar o paciente;
10. Ao término do procedimento, retornar paciente em posição dorsal;
11. Colocá-lo na sala de recuperação;
12. Observar e aferir sinais vitais;
13. Liberar paciente após acordado ao acompanhante.

Observações:

- Tempo do procedimento: O exame levará cerca de 15 minutos.
- É obrigatório estar com acompanhante para ser liberado após o procedimento.
- Em decorrência dos efeitos da medicação sedativa, orientar o paciente quanto a: não conduzir veículos, ou ser conduzido em motocicleta, não exercer atividades de risco, não fazer uso de bebidas alcoólicas no mesmo dia ou após 24 horas do término do procedimento.
- Orientar paciente a não alimentar-se ou ingerir líquidos até que seu reflexo de deglutição esteja normal.
- Orientar à possível presença de gases ou pequena distensão abdominal, pelo ar que foi introduzido através do endoscópio.
- Podem ocorrer complicações, tais como: reações a medicações, perfurações (rasgos) e sangramentos, necessitando de tratamento ou de cirurgia. Essas complicações estão mais relacionadas ao procedimento terapêutico.

Elaborado por:

**Aprovado e revisado pela
CCIH:**

Aprovado pela Direção:



***HOSPITAL DE ACIDENTADOS –
CLÍNICA SANTA ISABEL***

**Procedimento
Operacional
Padrão**

Data:

Data:

Data: