


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: UTI, Emergência e Internação		Identificação: POP 093
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical Intermitente Limpo - CVIL		Versão: 01
		Folha Nº: 1/4

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de cateterismo vesical de alívio. Reduzir os episódios de infecção do trato urinário, associado ao cateter, esvaziamento da bexiga e colher amostra de urina para exames.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Enfermeiro / Téc. Enfermagem
Providenciar o material necessário. <ul style="list-style-type: none"> • 01 Bandeja de cateterismo estéril (bandeja, cúpula redonda, pinça pean, campo fenestrado) • Gaze estéril • 01 Seringa de 20ml • Sonda uretral de calibre adequado • Saco coletor graduado • Lubrificante (xylocaína gel 2%) • Antisséptico (Clorexidina Degermante e Aquosa) • Luva estéril • Capote estéril 	Técnico Enfermagem / Enfermeiro

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
Mayara Soares Peixoto _____ Data: 12/05/17	Gabriela A. P. Fonseca _____ Data: 15/05/17	_____ Valney Luiz da Rocha Data: 20/05/17

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 093
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical Intermitente Limpo - CVIL	Versão: 01
	Folha Nº:2/4

<ul style="list-style-type: none"> • Luvas de procedimento • Máscara facial • Saco para lixo contaminado • Biombo 	
Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento.	Enfermeiro
Preparar o ambiente (fechar janelas, porta e proteger com biombo, individualizando o leito).	Técnico Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico Enfermagem / Enfermeiro
Paramentar-se na técnica asséptica	Enfermeiro
Posicionar a paciente (mulher) em posição ginecológica; (homem) em posição horizontal.	Técnico de Enfermagem
Calçar as luvas de procedimento, realizar higiene íntima do paciente conforme técnica.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar as luvas de procedimento, higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Abrir a bandeja de cateterismo e todo material necessário na técnica asséptica.	Técnico Enfermagem / Enfermeiro
Na mulher: Com a mão não dominante, afastar pequenos e grandes lábios, com o objetivo de expor totalmente o meato uretral.	Enfermeiro
Com o auxílio de uma pinça com a gaze realizar antissepsia com clorexidina aquosa.	Enfermeiro
Aplicar a gaze com movimento uniforme no sentido ântero-posterior no meato uretral.	Enfermeiro
Afastar os grandes lábios com a mão esquerda, usando o dedo polegar e indicador, aplicar a gaze com movimento único e firme nos pequenos lábios	Enfermeiro

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 093
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical Intermitente Limpo - CVIL	Versão: 01
	Folha Nº:3/4

de cima para baixo, no sentido ântero-posterior (clitóris anus) em seguida desprezar as gazes.	
Realizar o mesmo procedimento com o outro lado.	Enfermeiro
Aplicar a gaze com movimento único e firme nos grandes lábios, de cima para baixo, no sentido ântero-posterior (clitóris anus) em seguida desprezar as gazes.	Enfermeiro
Manter uma mão segurando os grandes lábios.	Enfermeiro
Colocar o campo fenestrado.	Enfermeiro
Pegar a sonda com a outra mão deixando a ponta da sonda protegida no campo.	Enfermeiro
Lubrificar a ponta da sonda com xylocaína gel.	Enfermeiro
Introduzir a sonda na uretra até haver retorno de diurese.	Enfermeiro
Deixar a sonda drenando no saco coletor até o cessar da diurese e medir o débito.	Enfermeiro
Retirar a sonda após o término, puxando-a de forma contínua e lenta.	Enfermeiro
Recolher o material, organizar o ambiente.	Enfermeiro
Retirar as luvas.	Enfermeiro
Higienizar as mãos conforme protocolo institucional.	Enfermeiro
Deixar o paciente confortável.	Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: hora, tipo e calibre da sonda, volume e aspecto da urina drenada, assinar e carimbar.	Enfermeiro
No homem: Realizar a antisepsia do pênis com clorexidina aquosa, iniciando do meato uretral com movimentos circulares, repetir o processo 3 vezes.	Enfermeiro
Higienizar a parte externa do pênis, segurando e expondo a glândula fazendo a limpeza em movimentos único e firme de cima para baixo.	Enfermeiro
Após realizar a higienização da região pubiana, procedendo da mesma maneira.	Enfermeiro
Manter a mão não dominante segurando o pênis.	Enfermeiro
Colocar o campo fenestrado.	Enfermeiro
Pegar a sonda com a outra mão deixando a ponta da sonda protegida no campo.	Enfermeiro

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 093
Processo: Protocolo de Cateterismo Vesical Intermitente Limpo - CVIL	Versão: 01
	Folha Nº:4/4

Injetar 15ml de xylocaína gel com auxílio de uma seringa de 20ml no meato uretral.	Enfermeiro
Introduzir a sonda na uretra até haver retorno da diurese.	Enfermeiro
Deixar a sonda drenando no saco coletor até o cessar da diurese e medir o débito.	Enfermeiro
Retirar a sonda após o término, puxando-a de forma contínua e lenta.	Enfermeiro
Recolher o material, organizar o ambiente.	Enfermeiro
Retirar as luvas.	Enfermeiro
Higienizar as mãos conforme protocolo institucional	Enfermeiro
Deixar o paciente confortável.	Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: hora, tipo e calibre da sonda, volume e aspecto da urina drenada, assinar e carimbar.	Enfermeiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta
Anotações de enfermagem	Prescrição	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Não aplicável.

7. ANEXOS

Não aplicável.