


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 066	
Processo: Aspiração de Secreção	Versão: 01	
	Folha Nº: 1/4	

1. OBJETIVO

Padronizar a aspiração de secreção.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Reunir o material necessário em uma bandeja e encaminhá-lo à unidade do cliente: <ul style="list-style-type: none"> Aspirador que pode ser fixado na saída de vácuo ou portátil; Frasco coletor e extensão; Cateter de aspiração com ou sem dispositivo para controlar a sucção (geralmente nº 8 a 12 para adultos); Frasco com água destilada; 1 luva estéril; Forro impermeável ou uma toalha; Máscara e óculos protetores; Saco para lixo; 	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data:	Data:	Data:

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 066
Processo: Aspiração de Secreção	Versão: 01
	Folha Nº:2/4

<ul style="list-style-type: none"> • Kit de nebulização (se necessário), conforme prescrição médica; • Gaze; • Ambu (se necessário) • Luva de procedimento; • Avental de manga longa. 	
Orientar o cliente e familiares sobre o procedimento.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Propiciar tranquilidade e promover a cooperação do cliente se possível.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Ajustar a cama e posicionar o cliente em posição semifowler.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Colocar a toalha ou forro sobre o tórax do cliente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
1. Testar e ajustar o aspirador para pressão apropriada; (vácuo) <ul style="list-style-type: none"> a) 80 a 120 mmHg, para adultos. b) 80 a 110 mmHg, para crianças. c) até 95 mmHg, para lactantes 	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Colocar máscara, óculos protetores e avental.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Abrir a embalagem do cateter de aspiração sem contaminar, conectá-lo na extensão.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Abrir o frasco de água destilada.	Técnico de Enfermagem /

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 066
Processo: Aspiração de Secreção	Versão: 01
	Folha Nº:3/4

	Enfermeiro
Manter todo o cateter na embalagem estéril.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Calçar primeiro a luva de procedimento na mão não dominante e depois a luva estéril na mão dominante.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Expor o cateter e segurá-lo com a mão dominante.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Umedecer o cateter com a água destilada, mergulhando no frasco e verificar o funcionamento da pressão do vácuo adequada.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Calcular a distância do lóbulo da orelha até a narina, inserir delicadamente o cateter com a sucção desligada, deslizar o cateter sem forçar através da base de uma narina, em direção à traqueia, para aspirar à nasofaringe. Ou inserir o cateter pela lateral da parte interna da mucosa oral, em direção à traqueia para aspirar à orofaringe.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Aplicar sucção, ocluindo o orifício de aspiração com o polegar (mão não dominante) e, com suavidade, girar o cateter à medida que está sendo retirado. Não permitir que a aspiração continue por mais de 10 a 15 segundos de cada vez e, se possível, coincidir o momento da pressão negativa com o tempo expiratório do cliente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Irrigar o cateter com a água destilada e repetir o procedimento com o intervalo de, no mínimo, 20 a 30 segundos se uma aspiração adicional for necessária e de acordo com a tolerância do cliente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
As narinas devem ser alternadas quando uma aspiração repetida for requerida.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Desligar o aspirador e desconectar o cateter da extensão.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 066
Processo: Aspiração de Secreção	Versão: 01
	Folha Nº:4/4

Proteger a extremidade da extensão.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Oferecer ou realizar higiene oral após a aspiração.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar as luvas envolvendo o cateter em seu interior e desprezá-las.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar os materiais utilizados, deixando o cliente confortável e o ambiente em ordem.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: horário, o procedimento realizado, a quantidade e aspecto da secreção, tolerância do cliente e as possíveis intercorrências, assinar e carimbar.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Não aplicável.

7. ANEXOS

Não aplicável.