


<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p>		
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 075	
Processo: Administração de Medicamentos Via Intramuscular	Versão: 01	
	Folha Nº: 1/4	

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de Administração de Medicamentos Via Intramuscular.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Fazer o rótulo, conferindo os "9 Certos da Medicação".	Técnico de Enfermagem
Preparar a medicação prescrita, leva-lá (protegida com a própria embalagem) e o algodão com álcool em uma bandeja até o leito do cliente.	Técnico de Enfermagem
Identificar o cliente pelo nome, certificando-se de que se trata do cliente correto.	Técnico de Enfermagem
Explicar ao cliente sobre o procedimento e a medicação que será feita.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Calçar as luvas.	Técnico de Enfermagem
Colocar o cliente na posição adequada para aplicação.	Técnico de

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data: _____	Data: _____	Data: _____

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 075
Processo: Administração de Medicamentos Via Intramuscular	Versão: 01
	Folha Nº:2/4

	Enfermagem
Proceder a antissepsia da área escolhida.	Técnico de Enfermagem
Fazer a prega muscular aprisionando o músculo entre o polegar e o indicador, com a mão não dominante.	Técnico de Enfermagem
Introduzir a agulha, perpendicularmente ao músculo.	Técnico de Enfermagem
Soltar a prega muscular e aspirar, para ver se não retoma sangue (se retomar sangue na seringa, não injete o medicamento, retire a agulha e comprima o local, troque o material e escolha outro local para realizar todo o procedimento novamente).	Técnico de Enfermagem
Se não retomou sangue terminar a aplicação lentamente. Ao término, retirar a agulha pressionando a região com algodão.	Técnico de Enfermagem
Retirar as luvas.	Técnico de Enfermagem
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem
Descartar a agulha e a seringa no local apropriado.	Técnico de Enfermagem
Deixar o cliente confortável e o ambiente em ordem.	Técnico de Enfermagem
Checar o medicamento e anotar qualquer intercorrência na prescrição, assinar e carimbar.	Técnico de Enfermagem

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 075
Processo: Administração de Medicamentos Via Intramuscular	Versão: 01
	Folha Nº:3/4

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Locais de aplicação:

- Para aplicação de medicação por via intramuscular, são indicadas as seguintes regiões:
- Região do deltoide - músculo deltoide.
- Região ventroglútea (VG) ou Hochestter - músculo glúteo médio.
- Região da face anterolateral da coxa (FALC) - músculo vastolateral (terço médio da coxa).
- Região dorsoglútea (DG) – músculo grande glúteo (quadrame superior externo).

Deve-se levar em consideração:

- Vejam quais são os “9 Certos da Medicação”:
 - 1) Paciente certo
 - 2) Medicamento certo
 - 3) Dose certa
 - 4) Via certa
 - 5) Hora certa
 - 6) Tempo certo
 - 7) Validade certa
 - 8) Abordagem certa
 - 9) Registro certo
- A distância em relação a vasos e nervos importantes.
- Musculatura suficiente grande para absorver o medicamento.
- Espessura do tecido adiposo.
- Idade do cliente.
- Avaliar sinais de reação alérgica e efeitos colaterais à medicação administrada.
- Atividade do cliente.
- O volume máximo para injeção IM é de 4ml. O volume acima de 4ml fracionar e aplicar em locais diferentes.
- Dimensões das agulhas de acordo com o grupo etário, condições físicas e tipo de Solução (injeção IM).

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 075
Processo: Administração de Medicamentos Via Intramuscular	Versão: 01
	Folha Nº:4/4

Espessura da Tela SC	Solução Oleosa	Solução Aquosa
Adulto Magro	25 X 8 ou 9	25X6 ou 7
Adulto Normal	25 X 8 ou 9	30 X 6 ou 7
Adulto Obeso	40 X 8 ou 9	40 X 6 ou 7
Criança Magra	20X8	20 X 6 ou 7
Criança Normal	25X8	25X6 ou 7
Criança Obesa	30X8	30X6ou7

Angulação da agulha:

- A inserção da agulha deve ser perpendicular à pele, formando ângulo de 90°.

7. ANEXOS

Não aplicável.

*Utilizar esta forma quando os registros
não puderem ser controlados no rodapé
do próprio registro*