


| | | |
|---|-------------------------------|---|
| <p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</p> | |  |
| Setor: Emergência e Internação | Identificação: POP 077 | |
| Processo: Administração Subcutânea | Versão: 01 | |
| | Folha Nº:1/3 | |

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de administração subcutânea.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

| Ação/Descrição | Agente Executor |
|--|------------------------|
| Verificar prescrição médica. | Técnico de Enfermagem |
| Fazer o rótulo, conferindo os "9 Certos da Medicação". | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Preparar o material e levá-lo para junto do cliente. | Técnico de Enfermagem |
| Colocar a etiqueta de identificação na seringa e proteger a seringa com a sua própria embalagem. | Técnico de Enfermagem |
| Orientar o cliente quanto ao procedimento. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Calçar as luvas de procedimento. | Técnico de Enfermagem |
| Colocar o cliente em posição adequada para aplicação. | Técnico de |

| | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprovado para uso por: |
| _____ | _____ | _____ |
| Data: _____ | Data: _____ | Data: _____ |

| | |
|---|-------------------------------|
| Setor: Emergência e Internação | Identificação: POP 077 |
| Processo: Administração Subcutânea | Versão: 01 |
| | Folha Nº:2/3 |

| | |
|--|-----------------------|
| | Enfermagem |
| Proceder antissepsia da área escolhida. | Técnico de Enfermagem |
| Fazer a prega cutânea, distendendo a pele do local de aplicação com os dedos polegar e indicador da mão não dominante. | Técnico de Enfermagem |
| Introduzir a agulha, utilizando ângulo de 90°. | Técnico de Enfermagem |
| Soltar a prega cutânea e realizar aspiração, puxando o êmbolo para verificar se algum vaso foi atingido. | Técnico de Enfermagem |
| Administrar a medicação lentamente. | Técnico de Enfermagem |
| Ao término da administração da medicação, retirar a agulha, tracionando a seringa com movimento único e firme e colocar algodão sobre o local da punção. | Técnico de Enfermagem |
| Retirar o material, deixando o ambiente em ordem. | Técnico de Enfermagem |
| Higienizar as mãos. | Técnico de Enfermagem |
| Checar na prescrição médica o medicamento administrado e observações importantes, carimbar e assinar. | Técnico de Enfermagem |

5.CONTROLE DE REGISTROS

| Identificação | Armazenamento | Proteção/Acesso | Recuperação | Retenção | Disposição dos registros |
|---------------|---------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Prescrição | Posto de Enfermagem | Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área | Número de Prontuário / Nome | Até alta do cliente | Serviço de Admissão e Alta |

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Não massagear o local da aplicação, após administração do medicamento.
- Caso a agulha possua um tamanho maior, ex: 25x7 ou 30x7, introduzir em um ângulo de 45°.
- Caso tenha atingido um vaso sanguíneo, retire agulha, realize a troca da agulha e

| | |
|---|-------------------------------|
| Setor: Emergência e Internação | Identificação: POP 077 |
| Processo: Administração Subcutânea | Versão: 01 |
| | Folha Nº:3/3 |

reinicie o procedimento em outro local.

- Não ultrapassar o volume de 1ml na aplicação.
- No caso de anticoagulantes, não realizar a aspiração após a aplicação, pois poderá causar hematoma.
- Realizar rodízio de local de punção.
- Observar sinais e sintomas de reação alérgica.
- Vejam quais são os “9 Certos da Medicação”:
 - 1) Paciente certo
 - 2) Medicamento certo
 - 3) Dose certa
 - 4) Via certa
 - 5) Hora certa
 - 6) Tempo certo
 - 7) Validade certa
 - 8) Abordagem certa
 - 9) Registro certo

7. ANEXOS

Não aplicável.