SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP Setor: Internação / UTI Processo: Terapia de Nutrição Enteral HOSPITAL DE® ACIDENTADOS CILINICAMATA MASEL HOSPITAL DE® ACIDENTADOS CILINICAMATA MASEL Versão: POP 87 Folha Nº:1/4

1. OBJETIVO

Orientar os profissionais quanto a Terapia de Nutrição Enteral, a fim de assegurar que tais produtos, quando administrados, sejam seguros e eficazes.

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

TNE: Terapia nutricional entérica

SNE: Sonda Nasoentérica

NE: Nutrição enteral

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RCD Nº 63, DE 6 DE JULHO DE 2000

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Orientar o paciente, a família ou o responsável legal quanto à utilização e controle da TNE.	Enfermeiros
Preparar o paciente, o material e o local para o acesso enteral.	Enfermeiros
Prescrever os cuidados de enfermagem na TNE, em nível hospitalar.	Enfermeiros
Proceder ou assegurar a colocação da sonda oro/nasogástrica ou	Enfermeiros /
transpilórica e confirmar seu posicionamento através de radiografia.	Médico
Assegurar a manutenção da via de administração.	Enfermeiros
Receber a NE e assegurar a sua conservação até a completa administração.	Enfermeiros
Proceder à inspeção visual da NE antes de sua administração.	Enfermeiros
Avaliar e assegurar a administração da NE observando as informações contidas no rótulo, confrontando-as com a prescrição médica.	Enfermeiros
Avaliar e assegurar a administração da NE, observando os princípios de	Enfermeiros

Elaborado por:	Revisado por: Aprovado para uso por:	
Gabriela Aleksandra Pires da Fonseca	Mayara Soares Peixoto	Valney Luiz da Rocha
Data: 26/04/2017	Data: 27/04/2017	Data: 28/04/2017

Setor: Internação	Identificação: POP 87	
Processo: Terapia de Nutrição Enteral	Versão: 01	
	Folha Nº:2/4	

assepsia.	
Detectar, registrar e comunicar ao médico responsável pelo paciente, as	Enfermeiros
intercorrências de qualquer ordem técnica e ou administrativa.	Lillelillellos
Garantir o registro claro e preciso de informações relacionadas à	
administração e à evolução do paciente quanto ao: peso, sinais vitais,	Enfermeiros
tolerância digestiva e outros que se fizerem necessários.	
Garantir a troca do curativo e ou fixação da sonda enteral, observando a	Enfermeiros /
presença de lesões, mudando o sítio de fixação se possível. Sempre fixar a	Técnicos de
SNE evitando a saída acidental.	Enfermagem
Elaborar e padronizar os procedimentos de enfermagem relacionadas à	Enfermeiros
TNE.	Lillelillellos
O enfermeiro deve participar do processo de seleção, padronização,	
licitação e aquisição de equipamentos e materiais utilizados na	Enfermeiros
administração e controle da TNE.	
Zelar pelo perfeito funcionamento das bombas de infusão.	Enfermeiros /
	Técnicos de
	Enfermagem
Assegurar que qualquer outra droga e ou nutriente prescritos, sejam	
administrados na mesma via de administração da NE, conforme	Enfermeiros
procedimentos preestabelecidos.	
Manter cabeceira elevada de 30 a 45°.	Enfermeiros /
	Técnicos de
	Enfermagem
Etiquetar a dieta com o horário e data de abertura/início da dieta e o nome	Enfermeiros /
do responsável pela administração.	Técnicos de
A dieta enteral tem validade de 24 horas após sua abertura.	Enfermagem
Higienizar as mãos e o campo de conexão da dieta antes de sua	Enfermeiros /
administração.	Técnicos de
	Enfermagem
Administra a hidratação com agua filtrada (conforme a prescrição da	Enfermeiros /
nutrição)	Técnicos de
	Enfermagem

Setor: Internação	Identificação: POP 87	
December Townsia de Notais Se Fotonel	Versão: 01	
Processo: Terapia de Nutrição Enteral	Folha Nº:3/4	

Troca do equipo de dieta enteral (BIC) e o equipo macrogotas (hidratação)	Enfermeiros /
deve ser realizado a cada 24h	Técnicos de
	Enfermagem
Se a nutrição enteral programada não for administrada, descrever o motivo	Enfermeiros /
em relato de enfermagem e a hora da intercorrência.	Técnicos de
	Enfermagem
Lavar sempre a SNE antes e após a administração de qualquer medicação	
e módulo de proteínas, utilizar no mínimo 20ml de agua filtrada. Lavar	Enfermeiros /
também entre uma medicação e outra. Administrar os medicamentos logo	Técnicos de
após sua preparação e de forma separada. Nunca misturar duas ou mais	Enfermagem
fórmulas medicamentosas.	

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Nutrição Enteral (NE): alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, industrializado ou não, utilizada exclusiva ou parcialmente para substituir ou complementar a alimentação oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas.
- Nutrição Enteral em Sistema Fechado: NE industrializada, estéril, acondicionada em recipiente hermeticamente fechado e apropriado para conexão ao equipo de administração.
- Prescrição dietética da NE: determinação de nutrientes ou da composição de nutrientes da NE, mais adequada às necessidades específicas do paciente, de acordo com a prescrição médica.

Setor: Internação	Identificação: POP 87	
December Townsia de Notais Se Fotonel	Versão: 01	
Processo: Terapia de Nutrição Enteral	Folha Nº:4/4	

- Prescrição médica da Terapia de Nutrição Enteral-TNE: determinação das diretrizes, prescrição e conduta necessárias para a prática da TNE, baseadas no estado clínico nutricional do paciente.
- Terapia de Nutrição Enteral (TNE): conjunto de procedimentos terapêuticos para manutenção ou recuperação do estado nutricional do paciente por meio de NE.
- A passagem de outra sonda implica em trauma e desconforto para o paciente, e aumenta os custos (os convênios pagam apenas 1 sonda enteral por internação).
- A lavagem deve ser feita sob alta pressão, com o auxílio de um seringa de 20 mL.
- Os frascos de água são utilizados para hidratar o paciente e não devem substituir a lavagem manual com seringa, sob pressão.

7. ANEXOS

Não aplicável.