SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP	HOSPITAL DE ACIDENTADOS CLINICA SANTA ISABEL	
Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 091	
Dracesco Dretecolo neve Colete de Correção Transcol	Versão: 01	
Processo: Protocolo para Coleta de Secreção Traqueal	Folha Nº:1/3	

1. OBJETIVO

Padronizar a coleta de secreção traqueal e garantir a qualidade da amostra coletada.

2. TERMOS E ABREVIAÇÕES

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

Ação/Descrição	Agente Executor
Preparar material necessário:	
Kit para aspiração estéril;	Enfermeiro /
Utilizar sonda compatível com o número da cânula endotraqueal, em caso	Fisioterapeuta
de pacientes traqueostomizados;	i isioterapeuta
 Frasco para coleta da secreção (bronquinho). 	
EPI's:	
Gorro;	
Máscara;	Enfermeiro /
Óculos;	Fisioterapeuta
Capote;	
Luva estéril.	
Higienizar as mãos conforme POP n° 51.	Enfermeiro /
Inglefilzar as mads comornie FOF II 31.	Fisioterapeuta
Explicar o procedimento ao paciente / acompanhante.	Enfermeiro /
шхрітся о ріосечіністію ао расієніє / асопіраннанте.	Fisioterapeuta

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
Mayara Soares Peixoto Data: 22/05/17	Renata da C. Machado Data: 26/05/17	Valney Luiz da Rocha Data: 01/06/17

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 091	
Dunancia i Dunta cala mana Calata da Canna a Transcal	Versão: 01	
Processo: Protocolo para Coleta de Secreção Traqueal	Folha Nº:2/3	

Paramentar-se com os EPI's.	Enfermeiro /	
Paramentar-se com os EPI's.	Fisioterapeuta	
Abrir a embalagem do bronquinho, abrir a embalagem da sonda de		
aspiração estéril expondo primeiro a extremidade para conexão ao	Enfermeiro /	
bronquinho. Não retirar a sonda de dentro da embalagem até o momento	Fisioterapeuta	
da aspiração. Conectar o bronquinho ao látex, abrir o sistema de vácuo	riolotorapeata	
para iniciar a aspiração.		
Realizar aspiração traqueal, com técnica asséptica.	Enfermeiro /	
Se for necessário utilizar SF0,9%, usar no máximo 3ml.	Fisioterapeuta	
Coletar no mínimo 1ml de secreção.	Enfermeiro /	
Coletai no minimo mii de secreção.	Fisioterapeuta	
Desconectar a sonda do bronquinho.	Enfermeiro /	
Descentedar a sorida de bronquirino.	Fisioterapeuta	
Fechar o bronquinho.	Enfermeiro /	
r condi o pronquimo.	Fisioterapeuta	
Realizar descarte do EPI.	Enfermeiro /	
rteamzan desearte de Er i.	Fisioterapeuta	
Higienizar as mãos, conforme POP n° 51.	Enfermeiro /	
riigiciiizai as maos, comomic ror m o r.	Fisioterapeuta	
Rotular adequadamente o frasco com nome completo do paciente, data de	Enfermeiro /	
nascimento e volume de SF0,9% se houver utilizado.	Fisioterapeuta	
Solicitar que o laboratório busque o material.	Enfermeiro	
Realizar o registro do procedimento no prontuário.	Enfermeiro /	
i todiizai o registro do procedimento no prontuano.	Fisioterapeuta	
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

Setor: UTI, Emergência e Internação	Identificação: POP 091	
Processo: Protocolo para Coleta de Secreção Traqueal	Versão: 01	
	Folha Nº:3/3	

Anotações de		Prancheta do Cliente /	Número de	Até alta do	Serviço de
enfermagem /	Prescrição	Colaboradores da Área	Prontuário /	cliente	Admissão e
fisioterapia		Coluboradores da 7 li ca	Nome	Shorte	Alta

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Não aplicável.

7. ANEXOS

Não aplicável.

