

HOSPITAL DE ACIDENTADOS – CLÍNICA SANTA ISABEL

Procedimento
Operacional
Padrão

| TAREFA | Procedimento Operacional Padrão Para Colonoscopia | POP Nº.: 09 |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Local de Execução | Endoscopia digestiva e Colonoscopia | Data da Emissão: 04/13 |
| Executante | Equipe de Enfermagem | Edição: 1º Revisão: 18 meses |

Definição:

É o procedimento que visualiza seu cólon (intestino grosso), utilizando um tubo flexível introduzido através do ânus, com a finalidade de estudar o interior de todo o intestino grosso e a porção terminal do intestino fino. Se houver necessidade, durante o procedimento, pode ser coletado material do intestino para exame (biópsia) e análise laboratorial detalhada.

Preparo do exame:

- Para permitir uma visão clara, o cólon (intestino grosso) deve estar completamente limpo e sem resíduos. O paciente deverá fazer, na véspera, uma dieta líquida, sem resíduos, e tomar o laxante de acordo com as orientações da enfermeira.
- Após a ingestão do laxante é importante tomar bastante líquido, que pode ser água, chá, água-de-coco, gelatinas, *Gatorade*, refrigerantes e caldos de carne, frango e legumes coados. "Não pode ser liquidificado". É importante ingerir líquidos, no mínimo 2 litros/dia.
- Seu acompanhante o conduzirá até sua casa. No dia do procedimento você deverá se apresentar ao hospital no horário agendado, em jejum absoluto.
- É necessário jejum absoluto (não beber nem água), por 12 horas antes do procedimento.

Materiais:

- 1. Materiais de punção periférica,
- 2. Anestésicos:
- 3. Xylocaína gel,



HOSPITAL DE ACIDENTADOS – CLÍNICA SANTA ISABEL

Procedimento
Operacional
Padrão

- 4. Endoscópio,
- 5. Cateter nasal de oxigênio;
- 6. Oxímetro de pulso;
- 7. Vidro de biópsia, se necessário.

Descrição do Procedimento:

- Reunir todo o material necessário;
- Higienização das mãos;
- Explicar procedimento ao paciente;
- Calçar as luvas;
- Pedir ao paciente que deite na maca em posição dorsal;
- Colocar oxigênio por cateter nasal;
- Colocar oxímetro de pulso;
- Anestesista inicia o procedimento de sedação;
- Lateralizar o paciente;
- Colocar xylocaína gel no endoscópio;
- Ao término do procedimento, retornar paciente em posição dorsal;
- Colocá-lo na sala de recuperação;
- Observar e aferir sinais vitais;
- Liberar paciente após acordado ao acompanhante.

Observações:

- Tempo do procedimento: O exame levará cerca de 20 a 40 minutos.
- É obrigatório estar com acompanhante para ser liberado após o procedimento.
- Em decorrência dos efeitos da medicação sedativa, orientar o paciente quanto a: não conduzir veículos, ou ser conduzido em motocicleta, não exercer atividades de risco, não fazer uso de bebidas alcoólicas no mesmo dia ou após 24 horas do término do procedimento.
- A colonoscopia pode resultar em complicações, tais como: reações a



HOSPITAL DE ACIDENTADOS – CLÍNICA SANTA ISABEL

Procedimento Operacional Padrão

medicações, perfuração do intestino e sangramento.

• Em razão do preparo a que o intestino foi submetido e a fim de facilitar a digestão, orientar ao paciente fazer uma refeição leve, voltando gradativamente à dieta normal no dia seguinte.

| Elaborado por: | Aprovado e revisado pela | Aprovado pela Direção: |
|----------------|--------------------------|------------------------|
| | CCIH: | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Data: | | Data: |
| | Data: | |
| | | |