


SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		
Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 063	
Processo: Sondagem Nasoentérica ou DUBOFF	Versão: 01	
	Folha Nº: 1/5	

1. OBJETIVO

Padronizar procedimento de sondagem nasoentérica ou DUBOFF.

2. TERMOS E ABREVIações

Não aplicável.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Não aplicável.

4. PROCEDIMENTO

SONDAGEM NASOENTÉRICA OU DUBOFF	
Ação/Descrição	Agente Executor
Verificar prescrição médica.	Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Enfermeiro
Reunir todo o material necessário. <ul style="list-style-type: none"> Sonda nasoentérica ou DUBOFF Toalha de rosto ou papel toalha Esparadrapo, micropore Estetoscópio Luvas de procedimento Seringa de 20 ml Gaze Xilocaína gel Biombo Tesoura Saco de lixo Coletor de sistema aberto e látex (caso a finalidade do procedimento seja para drenagem) 	Enfermeiro

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado para uso por:
_____	_____	_____
Data:	Data:	Data:

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 063
Processo: Sondagem Nasoentérica ou DUBOFF	Versão: 01
	Folha Nº:2/5

• Kit nutrição (se necessário)	
Comunicar e explicar sobre o procedimento ao cliente e acompanhante.	Enfermeiro
Isolar a cama com biombo.	Enfermeiro
Elevar o decúbito, deixar o cliente sentado.	Enfermeiro
Cobrir o tórax com toalha de rosto ou papel toalha	Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Enfermeiro
Cortar o esparadrapo para fixação e uma tira para marcar o cateter.	Enfermeiro
Medir o cateter da ponta do nariz até o lóbulo da orelha, descer até o apêndice xifoide, acrescentar mais ou menos mais 10 centímetros e fazer uma marca com uma tira de esparadrapo.	Enfermeiro
Colocar as luvas de procedimento.	Enfermeiro
Limpar as narinas com gazes, se necessário.	Enfermeiro
Fazer uma espiral nos primeiros 7-10 cm do cateter, enrolando-o em seus dedos.	Enfermeiro
Lubrificar a ponta distal do cateter utilizando gaze com xylocaína gel.	Enfermeiro
Inclinar a cabeça do cliente para trás antes de introduzir o cateter na narina e, delicadamente, introduzir o cateter até a nasofaringe posterior, direcionando-o para baixo e para trás no sentido da orelha.	Enfermeiro
Quando o cateter alcançar a faringe, o cliente pode engasgar: deixe o cliente repousar por alguns momentos.	Enfermeiro
Solicitar ao cliente que incline ligeiramente a cabeça para frente. Pedir-lhe que faça movimentos de deglutição e introduzir o cateter enquanto o cliente deglute.	Enfermeiro
Se ocorrerem refluxos de vômitos intensos, interromper o procedimento e tracionar o cateter até que o mal-estar cesse.	Enfermeiro
Continuar a introduzir o cateter delicadamente toda vez que o cliente deglutir. Ao introduzir o cateter, lembrar das estruturas anatômicas pelas quais o cateter está passando. Se houver sinais de angústia, como arfago, tosse ou cianose, imediatamente remover o cateter.	Enfermeiro
Continuar introduzindo o cateter quando o cliente deglutir, até que a marca	Enfermeiro

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 063
Processo: Sondagem Nasoentérica ou DUBOFF	Versão: 01
	Folha Nº:3/5

do cateter alcance a narina do cliente.	
Aspirar 20 ml de ar na seringa, injetar no cateter e auscultar na região epigástrica para verificar a presença de ar.	Enfermeiro
Fixar o cateter sem comprimir a narina, manter o cateter fechado	Enfermeiro
Posicionar o cliente confortavelmente.	Enfermeiro
Reunir todo o material, deixando o ambiente em ordem.	Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Enfermeiro
Encaminhá-lo ao raio X para garantir correto posicionamento da sonda.	Maqueiro
Aguardar resultado de raio X e duas horas após inserção da sonda para iniciar dieta prescrita por nutricionista.	Técnico de Enfermagem
Realizar relatório de enfermagem na prescrição: hora do procedimento, nº do cateter, o volume e o aspecto da secreção drenada e as intercorrências, colocar assinatura e carimbo do responsável.	Enfermeiro

RETIRADA DE SONDA NASOENTERICA OU DUBOFF	
Ação/Descrição	Agente Executor
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Preparar material. <ul style="list-style-type: none"> • Gaze • Recipiente para lixo • Toalha de rosto ou papel toalha • Luvas de procedimento 	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Explicar o procedimento ao cliente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Colocar a toalha de rosto ou papel toalha sobre o tórax do cliente.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Calçar luvas de procedimento.	Técnico de Enfermagem /

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 063
Processo: Sondagem Nasoentérica ou DUBOFF	Versão: 01
	Folha Nº:4/5

	Enfermeiro
Retirar o esparadrapo ou micropore que fixa o cateter com o auxílio de gaze.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Fechar o cateter.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar o cateter lentamente com o auxílio de gaze.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Proceder à limpeza das narinas com gaze.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Deixar o cliente confortável e a unidade em ordem.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Retirar as luvas de procedimento.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Higienizar as mãos.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro
Realizar anotação de enfermagem na prescrição: hora, procedimentos, motivo, reações do cliente, assinar e carimbar.	Técnico de Enfermagem / Enfermeiro

5. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Prescrição	Posto de Enfermagem	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta

Setor: Emergência e Internação	Identificação: POP 063
Processo: Sondagem Nasoentérica ou DUBOFF	Versão: 01
	Folha Nº:5/5

Relatório de enfermagem	Prescrição	Prancheta do Cliente / Colaboradores da Área	Número de Prontuário / Nome	Até alta do cliente	Serviço de Admissão e Alta
-------------------------	------------	--	-----------------------------	---------------------	----------------------------

6. CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Esse cateter é passado pelo enfermeiro ou médico.
- Após a passagem, é realizado RX para verificar a localização.
- A dieta só poderá ser administrada após a confirmação da localização.

7. ANEXOS

Não aplicável.

cópia controlada