LA REPRODUCTION HUMAINE

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

Ali · 4e

1 La puberté

Les caractères sexuels **primaires** existent dès la naissance (organes reproducteurs).

★ Les caractères sexuels secondaires apparaissent à la puberté.

Repères : premières règles 11-14 ans · premières éjaculations 13-15 ans.

2 Le sperme et sa mobilité

Le sperme contient des **spermatozoïdes** (tête + flagelle) et le **liquide séminal**, qui les protège et les nourrit.

0 % → 60 % mobiles

Dans le testicule, 0 % mobiles (2 % d'efficacité). À la sortie, 60 % mobiles (79 % d'efficacité) : plus ils sont mobiles, plus la fécondation est efficace.

3 Le contrôle hormonal masculin

★ Une hormone est une substance chimique produite par un organe, transportée par le sang, qui agit sur un autre organe, appelé organe cible, en modifiant son fonctionnement.

Chez le garçon : le cerveau commande les testicules, qui sécrètent la **testostérone** (caractères sexuels secondaires masculins).

4 Le cycle utérin (28 jours)

J1 à J5 : règles. J6 à J13 : paroi qui s'épaissit. **J14** : ovulation. J15 à J28 : paroi qui continue de s'épaissir.

★ L'ovulation a lieu 14 jours avant les règles suivantes.

5 Les hormones ovariennes

★ Les ovaires produisent deux hormones sexuelles : les œstrogènes et la progestérone.

Elles développent les caractères sexuels et contrôlent l'utérus pendant tout le cycle.

6 Pourquoi les règles ?

★ Les règles sont déclenchées à la fin du cycle, lorsque le taux des hormones ovariennes chute brutalement.

Le cerveau commande les ovaires, comme il commande les testicules chez le garçon.

7 Contraception hormonale : comment ça agit

★ La contraception hormonale consiste à administrer à une femme des hormones qui bloquent l'ovulation, limitent la progression des spermatozoïdes dans l'utérus et perturbent les cycles utérins, empêchant ainsi l'implantation d'un éventuel embryon.

8 Les méthodes hormonales

Pilule : 1 comprimé/jour · **Patch** : collé 1 semaine · **Implant** et **stérilet (DIU)** : posés par un médecin, pour 2 à 3 ans.

★ Les méthodes de contraception hormonale sont réversibles : à l'arrêt, le cycle redevient normal.

9 La pilule d'urgence

95 % → 85 % → 58 %

Efficacité selon le délai : jour 1, jour 2, jour 3 après le rapport.

★ La pilule d'urgence, qui peut se prendre après un rapport sexuel non protégé, est d'autant plus efficace qu'elle est prise rapidement après le rapport.

10 La PMA

★ La PMA (procréation médicalement assistée) regroupe des techniques médicales qui aident un couple stérile à avoir un enfant.

Insémination (sperme déposé dans l'utérus) · FIVETE (fécondation en laboratoire) · ICSI (variante de la FIVETE).

11 Comportement responsable

★ En France, la loi fixe un âge minimum (15 ans) pour le consentement à un rapport sexuel, et protège les mineurs des agressions sexuelles.

Un rapport non protégé expose à une grossesse non désirée et aux IST : seul le **préservatif** protège des deux à la fois.

À RETENIR

CONNAÎTRE

- Caractères sexuels primaires (naissance) et secondaires (puberté)
- Hormone = substance chimique, transportée par le sang, vers un organe cible
- Œstrogènes et progestérone : hormones des ovaires

COMPRENDRE

- Le cerveau commande testicules et ovaires par hormones
- La chute des hormones ovariennes déclenche les règles
- La contraception hormonale bloque l'ovulation (réversible)

AGIR

- Pilule d'urgence : le plus vite possible, 95 % → 85 % → 58 %
- Préservatif : seul moyen contre grossesse ET IST
- Consentement fixé à 15 ans par la loi française

★ phrase de la leçon, à savoir mot pour mot

SVT · leçon du 02/11/2026 : cahier chapitre 2 (puberté) et manuel chapitre 9, Ressources 1 à 4 (contrôle hormonal, cycle, contraception, PMA, comportement responsable)