GÉOMÉTRIE PLANE

L'ESSENTIEL DE LA LEÇON

Omar · 6e

1 Le segment



[AB]

Il s'arrête en A et en B : ce sont ses extrémités.

★ Les points A et B sont les extrémités du segment [AB].

2 La droite




(AB)

Elle continue des deux côtés, sans fin.

★ Une droite est une ligne droite illimitée, elle peut être prolongée des deux côtés.

3 La demi-droite



[AB]

Elle part de A et passe par B. A est son origine.

★ Le point A est l'origine de la demi-droite [AB).

Piège : [AB) et [BA) ne sont pas la même demi-droite.


4 Points alignés



M, A et B sont sur la même droite.

★ Des points alignés sont des points qui appartiennent à une même droite.

5 Appartenir : ∈ et ∉




M ∈ (AB)
N ∉ (AB)

∈ se lit « appartient à ».

Piège : M ∈ (AB), mais M ∉ [AB] : M n'est pas entre A et B.

6 Droites sécantes




Elles se coupent en un point.

★ Deux droites sécantes sont deux droites qui ont un seul point commun.

Piège : pas de point commun sur le dessin ? Prolonge : elles peuvent être sécantes.

7 Droites perpendiculaires




(d) ⊥ (d')

On code un seul angle droit : ⌙

★ Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui forment quatre angles droits.

8 Droites parallèles




(d) // (d')

Elles n'ont pas de point commun.

★ Deux droites parallèles sont deux droites qui ne sont pas sécantes.


9 Propriété 1



SI $(d_1) \perp (d)$ et $(d_2) \perp (d)$
ALORS $(d_1) // (d_2)$

★ Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.


10 Propriété 2



SI $(d_1) // (d_2)$ et $(d) \perp (d_1)$
ALORS $(d) \perp (d_2)$


★ Si deux droites sont parallèles, et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est aussi perpendiculaire à l'autre.

11 Tracer la perpendiculaire à (d) par A



1. Un côté de l'angle droit de l'équerre le long de (d).
2. Fais glisser l'équerre jusqu'à A.
3. Trace, prolonge, code l'angle droit.

12 Tracer la parallèle à (d) par A



1. L'équerre le long de (d), la règle contre l'équerre.
2. Tiens la règle. Fais glisser l'équerre jusqu'à A. Trace.
3. Prolonge, nomme la droite (d').

Cette méthode utilise la propriété 1.

À RETENIR

ÉCRIRE

- ✓ **[AB]** le segment · **(AB)** la droite
- ✓ **[AB)** la demi-droite, d'origine A
- ✓ ∈ appartient à · ∉ n'appartient pas
- ✓ ⊥ perpendiculaires · // parallèles

UNE SEULE DROITE

- ✓ ★ Par deux points distincts, il passe une seule droite.
- ✓ Distincts : à deux endroits différents.

POUR JUSTIFIER

- ✓ **On sait que** ... (les données)
- ✓ **Or** ... (la propriété qui va avec)
- ✓ **Donc** ... (la conclusion). Le dessin ne suffit pas.

★ phrase de la leçon, à savoir mot pour mot **Piège** : erreur à éviter

Maths · leçon du 20/10/2026 : manuel, chapitre 9 « Étude de configurations planes », p. 146 à 149