

Ryan Fahrenkrug

MECH 105

11/1/2017

## Homework 17

```
clear  
clc  
close all
```

### Part 1

Analytically

```
format long  
syms x  
f=8+4*cos(x);  
a=0;  
b=pi/2;  
an=int(f,a,b);  
an=double(an);  
fprintf('The analytical solution is %3.12f\n',an)
```

The analytical solution is 16.566370614359

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 8 + 4\cos(x) dx = 16.566370614359$$

### Part 2

Trapezoidal Rule

$$I = \left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{f(0) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = 15.707963267949$$

$$\varepsilon_t = \left| \frac{16.566370614359 - 15.707963267949}{16.566370614359} \right| * 100 = 5.1816\%$$

### Part 3

Composite Trapezoidal Rule, n=4

$$I = \left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{f(0) + 2\left[f\left(\frac{\pi}{8}\right) + f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{3\pi}{8}\right)\right] + f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{8} = 16.51483381825$$

$$\varepsilon_t = \left| \frac{16.566370614359 - 16.51483381825}{16.566370614359} \right| * 100 = 0.311093\%$$

### Part 4

### Simpson's 1/3 Rule

$$I = \left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{f(0) + 4f\left(\frac{\pi}{4}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{6} = 16.575490124328$$

$$\varepsilon_t = \left| \frac{16.566370614359 - 16.575490124328}{16.566370614359} \right| * 100 = 0.055048\%$$

### Part 5

### Simpson's 3/8 Rule

$$I = \left(\frac{\pi}{2}\right) \frac{f(0) + 3f\left(\frac{\pi}{6}\right) + 3f\left(\frac{\pi}{3}\right) + f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{8} = 16.570390307617$$

$$\varepsilon_t = \left| \frac{16.566370614359 - 16.570390307617}{16.566370614359} \right| * 100 = 0.02426\%$$