

Het Imkerplan voor het Eerste Jaar

Een Praktische Maand-voor-Maand Gids voor Bijenkastverzorging, Inspecties, Koloniegezondheid en Honingooft

Boek 2 van 3 — Jouw operationele handboek voor het hele eerste jaar van imkeren. Van de installatiedag tot de verzorging tijdens de winterrust begeleidt deze gids je door elke essentiële stap met rustig en praktisch advies dat door mentoren is beproefd.

BOEK 2 VAN 3

VELDGIDS EDITIE



Waarom het Eerste Jaar Ertoe Doet

Het eerste jaar bijenhouderij lijkt op geen enkel jaar dat daarna komt. Je leert niet alleen een ambacht — je bouwt een levende relatie op met een van de meest complexe sociale organismen in de natuur. Jouw bijenfamilie is volledig afhankelijk van de beslissingen die je in deze eerste maanden neemt, en deze beslissingen zullen de gezondheid, kracht en overleving van je bijen in de komende seizoenen bepalen.

De meeste mislukkingen in het eerste jaar zijn te voorkomen. Ze gebeuren niet omdat bijenhouderij onmogelijk moeilijk is, maar omdat nieuwe imkers te veel of te weinig doen. Ze openen de kast te vaak uit angst, of wachten te lang uit onzekerheid. Ze voegen ruimte toe voordat de familie er klaar voor is, of laten de bijen krap zitten totdat de kast gaat zwermen. Ze oogsten honing voordat de familie voldoende voorraden heeft om de winter te overleven. Begrijpen wat het eerste jaar werkelijk vereist, is het belangrijkste inzicht in dit boek.

Benader dit jaar als een seizoen van observatie en het leggen van fundamenteën. Jouw hoofdtaak is observeren, registreren en gepast reageren — niet de maximale hoeveelheid honing oogsten, niet bewijzen dat je een imker bent, en niet bij elk bezoek aan de kast drastische ingrepen uitvoeren. De bijenfamilie weet hoe ze een familie moet zijn. Jouw taak is ervoor te zorgen dat niets wat te voorkomen valt, dit natuurlijke proces in de weg staat.

 De drie pijlers van een succesvol eerste jaar: **observatie, bijhouden van aantekeningen en zelfbeheersing**. Elke goede imker heeft deze gewoonten ontwikkeld in zijn eerste seizoen.



Bouw

Familiesterkte Op

Een sterke, goed gevoede familie met een gezonde koningin is het enige echte doel van het eerste jaar.



Leer Observeren

Train je oog om ramen, gedrag en signalen te lezen — bovenal al het andere.



Vermijd Voorspelbare Fouten

De meeste verliezen in het eerste jaar komen voort uit een klein aantal typische fouten die te voorkomen zijn.

Hoe deze gids te gebruiken

Deze gids is georganiseerd volgens het natuurlijke ritme van het bijenteeltjaar — niet volgens een vaste kalender gekoppeld aan specifieke maanden. Dit onderscheid is uiterst belangrijk. Een imker uit het warme kustgebied in het zuiden werkt volgens een heel ander schema dan iemand uit het bergachtige noorden. Iemand op het zuidelijk halfrond heeft te maken met een kalender die een spiegelbeeld is van de noordelijke seizoenen. Zelfs binnen hetzelfde gebied kunnen hoogte, heersende winden en plaatselijk microklimaat de timing van belangrijke gebeurtenissen met enkele weken verschuiven.

Doorheen het hele boek zult u termen tegenkomen zoals **begin van het seizoen, groeiperiode, hoofddrachtijd, einde van het seizoen** en **rustperiode** in plaats van concrete maandnamen. Dit is een bewuste keuze. Ze beschrijven de toestand van uw bijenvolk en de omringende natuur, niet een datum op de kalender. Uw plaatselijke imkersvereniging, een regionale mentor of een ervaren imker uit uw omgeving zijn de betrouwbaarste gids voor het vertalen van deze seizoensbegrippen naar uw eigen specifieke kalender.

Behandel dit boek als een veldgids, niet als een verzameling onveranderlijke regels. Lees het volledig door voordat de bijen arriveren, zodat u een mentale kaart van het hele jaar heeft. Keer daarna terug naar specifieke hoofdstukken naarmate elk seizoen nadert. Markeer pagina's, maak aantekeningen in de kantlijn en vergelijk met lokale aanbevelingen. Geen enkel boek kan elk klimaat, elk type bijenkast of elke persoonlijkheid van een bijenvolk omvatten. Wat dit boek wel kan, is u een kader, een woordenschat en het vertrouwen bieden dat nodig is om de juiste beslissingen te nemen in uw eigen omstandigheden.



Wezenlijk principe: Pas uw schema altijd aan het plaatselijke klimaat aan. Raadpleeg bij twijfel een lokale imker of neem contact op met de regionale imkersvereniging voordat u een belangrijke beslissing neemt met betrekking tot de bijenkast.

Doel van het Eerste Jaar

Voordat het seizoen echt begint, is het de moeite waard om duidelijk te definiëren hoe succes eruitziet voor een imker in het eerste jaar. Veel beginners komen met het beeld van gouden potten honing op het aanrecht. Dat beeld is niet verkeerd — het kan werkelijkheid worden — maar het is niet het juiste *doel* voor het eerste jaar. Het doel is eenvoudiger, belangrijker en soms moeilijker te accepteren: **de bijenkast levend, sterk en gezond houden gedurende alle seizoenen.**

Het Werkelijke Doel van het Eerste Jaar

Een volk dat zijn eerste volledige seizoenscyclus overleeft met een gezonde koningin, voldoende voedselvoorraden, gecontroleerde parasieteniveaus en een bloeiende bevolking die het tweede jaar ingaat — dat is succes. Al het andere, inclusief honing, is een bonus.

- Overleving van het volk gedurende alle seizoenen
- Gezonde koningin met een goed broedpatroon
- Voldoende voedselvoorraden gedurende de hele tijd
- Gecontroleerde en bewaakte Varroa-mijtniveaus
- Sterke bevolking die het volgende actieve seizoen ingaat


Waarom Honing Bijzaak Is

Honing is de voedselreserve van het volk. Een nieuwe kolonie brengt het eerste seizoen door met het opbouwen van de bevolking, het uitbouwen van raten en het vullen van cellen met voldoende voedsel om het veeleisende komende seizoen te overleven. Honing oogsten voordat het volk een echt overschot heeft, kan het verzwakken of doden.

 Oogst nooit honing als u er niet zeker van bent dat het volk meer heeft dan het nodig heeft. De gezondheid van het volk staat altijd op de eerste plaats.

Jouw Eerste Jaar in een Notendop

Hier is een overzicht van jouw imkerjaar. Elke fase heeft zijn eigen prioriteiten, zijn eigen ritme en zijn eigen reeks taken. De volgende pagina's leiden je door elk van deze fasen in detail. Gebruik dit overzicht als navigatiekaart wanneer je wilt weten op welk punt van de jaarlijkse cyclus je je bevindt.



i Deze cyclus herhaalt zich elk jaar, maar met elk jaar groeien je vertrouwen en vaardigheden. Het eerste jaar leert je het meest — besteed bijzondere aandacht aan elke fase.

Voor de Komst van de Bijen

De week voor de komst van de bijen is een van de productiefste periodes van je imkerjaar. Elk bevestigd onderdeel, elke getest stuk uitrusting en elke beantwoorde vraag beschermt je tegen een moment van paniek of verwarring op de installatiedag. Ervaren imkers nemen de voorbereidingen voor de komst van de bijen even serieus als elke kast-inspectie. Jij zou hetzelfde moeten doen.

Ga de onderstaande controlelijst methodisch door. Ga er niet van uit dat iets klaar is totdat je het persoonlijk hebt gecontroleerd. Test de smoker. Doe het imkerspak en het masker aan om te controleren of er geen openingen zijn. Vul de voeder en zorg dat die niet lekt. Controleer of de waterbron toegankelijk is voor de bijen. Schrijf het telefoonnummer van je lokale mentor op. Deze details zijn geen bureaucratische formaliteiten — ze maken het verschil tussen een rustige en een stressvolle installatie.

✓ Constructie van de Kast

- Bodem van de kast geplaatst en waterpas
- Bakken met raampjes correct geplaatst
- Binnenste en buitenste deksel bevestigd
- Smoker past goed

✓ Voeding Klaar

- Type voeder gekozen en schoon
- Suikerstroop bereid (vraag lokaal naar de verhoudingen)
- Voeder lekt niet
- Bijvulplan bevestigd

✓ Waterbron

- Water beschikbaar binnen vliegafstand
- Bron geregeld voor de komst van de bijen
- Schoon, ondiep, met landingsplaatsen

✓ Beschermende Uitrusting

- Pak of jasje zonder openingen
- Masker bevestigd en vastgezet
- Handschoenen in goede staat
- Laarzen met manchetten of riempjes

✓ Gereedschap en Documentatie

- Smoker met droge brandstof
- Gereinigd bijenwerkmes
- Notitieboekje of dagboeksjabloon klaar
- Opgeladen telefoon voor foto's

✓ Lokale Ondersteuning

- Contact van mentor of vereniging opgeschreven
- Nummer van lokale inspecteur opgeschreven
- Dichtstbijzijnde imkerswinkel geïdentificeerd

Definitieve Controle van de Bijenkastplaatsing

Zelfs als uw bijenkast al enkele weken op zijn plek staat, voer dan de dag vóór de aankomst van de bijen een definitieve fysieke controle uit. Kleine details die onbelangrijk leken bij het plaatsen, worden echte problemen zodra er een bijenvolk in de kast leeft. Een licht scheve bijenkast bevordert waterophoping. Een slecht geplaatst deksel creëert tocht en maakt toegang voor ongedierte gemakkelijker. Een onstabiele basis kan de kast omverwerpen tijdens een storm.

De onderstaande controle duurt minder dan vijftien minuten, maar behandelt elk punt dat het vaakst problemen veroorzaakt in het eerste jaar. Voer hem systematisch uit, van beneden naar boven. Als iets reparatie vereist, doe dat nu — niet wanneer er tienduizend bijen binnen zitten.

1 Stabiliteit van de Basis

De basis moet stevig en zijdelings waterpas zijn, en licht naar voren hellen (voorkant ongeveer 3–5 mm lager dan de achterkant) om afvoer van water bij de vliegspleet te bevorderen. Duw stevig op de basis — hij mag niet wiebelen of bewegen.

2 Richting en Oriëntatie van de Vliegspleet

Zorg ervoor dat de vliegspleet uitkomt in een open ruimte waar de bijen vrij kunnen vliegen. In de meeste klimaten helpt een oriëntatie afgewend van de koudste heersende wind, met gebruik van de ochtendzon, het volk sneller op te warmen. Vermijd een vliegspleet die direct gericht is op sterke heersende winden.

3 Waterafvoer en Ondergrond

Controleer of er geen water kan ophopen onder of rondom de bijenkast. Vochtige grond onder de bijenkast bevordert schimmel, vochtindringing en activiteit van ongedierte. Als de grond zacht of vochtig is, overweeg dan een tegel of laag grind onder de poten van de basis te plaatsen.

4 Verdeling en Aantal Ramen

Tel de ramen. Zorg ervoor dat ze vrij hangen, correct georiënteerd zijn (ramen parallel in Langstroth-kasten, loodrecht in toplattenkasten enz.) en gelijkmatig verdeeld zijn. Een raam dat vastloopt of scheef hangt, wordt door de bijen zeer snel met propolis verzegeld.

5 Correcte Plaatsing en Bevestiging van het Deksel

Plaats het binnen- en buitendeksel. Ze moeten vlak liggen, zonder kieren aan de zijkanen. Een deksel dat door de wind kan worden opgelicht, vereist een steen, riem of baksteen bovenop — vooral in gebieden met sterke seizoenswinden.

✓ Wanneer u elk van de bovenstaande punten met "ja" kunt beantwoorden, is uw bijenkast fysiek gereed. Dat is het enige type voorbereiding dat op de installatiedag van belang is.

Overzicht van de Installatiedag

De installatiedag is spannend en voor beginners soms stressvol. Dit is het belangrijkste om te weten voordat het zover is: **de bijen willen zich vestigen**. Bij aankomst zijn ze niet agressief naar u toe — ze zijn gedesoriënteerd, hongerig en op zoek naar een thuis. Uw rustige en doelbewuste bewegingen zijn de grootste factor die bepaalt hoe deze dag verloopt.

Of u nu een **pakket** (draadkist met bijen en een afgesloten koningin) of een **afdeling (nuc)** (kleine, functionele kolonie op ramen met een gevestigde koningin) installeert, het principe is hetzelfde: beweeg langzaam, rook spaarzaam, maak de overgang zo zachtjes mogelijk en laat de bijen tot rust komen zonder verdere verstoring zodra ze in de kast zijn.

Installatie van een Pakket

1. Besprenkel of berook de bijen licht voordat u opent
2. Verwijder de koninginnenkooi; controleer of ze leeft
3. Hang de koninginnenkooi tussen twee middelste ramen
4. Giet of schud de bijen voorzichtig in het geopende kastlichaam
5. Sluit de ramen voorzichtig over de bijentros
6. Voeg een voeder toe en sluit de kast
7. Stel de vliegopening in op de kleinste opening
8. Stap achteruit en observeer van een afstand

Installatie van een Afdeling (Nuc)

1. Breng de nucdoos dicht bij de plaatsing van de bijenkast
2. Steek de roker aan en berook de vliegopening van de nuc licht
3. Open de kast en verwijder evenveel ramen als de nuc er bevat
4. Breng de ramen uit de nuc in dezelfde volgorde over naar het kastlichaam
5. Vul de resterende ruimte op met kunstraat of voorbereide ramen
6. Sluit de kast en pas de vliegopening aan
7. Voeg een voeder toe als de lokale omstandigheden bijvoeding vereisen

📌 **Praktijknoot:** Controleer de kast op de installatiedag niet, behalve wat strikt noodzakelijk is voor de installatie zelf. Geef de bijen minimaal 5–7 dagen om te wennen vóór de eerste volledige inspectie. Weersta de verleiding om eerder een kijkje te nemen.

De Eerste 48 Uur

De eerste 48 uur na de installatie is een tijd van puur observeren — van buitenaf. Open de kast niet. Verwijder de vlieggaatverkleiner niet. Controleer het koninginnenkooitje niet. Uw taak in deze periode is simpelweg waarnemen wat er bij de vlieggaat gebeurt op een veilige afstand (twee tot drie meter is voldoende) en uw observaties noteren in een notitieboekje.

Het vlieggaat is een opmerkelijke informatiebron, zelfs zonder het deksel op te tillen. Een gezonde kolonie die zich nestelt, zal u al op de eerste dag verschillende geruststellende signalen geven. Begrijpen wat in deze fase normaal is, helpt u later te herkennen wanneer er iets mis zou kunnen gaan.



Vliegactiviteit

Binnen enkele uren na de installatie beginnen werksters korte oriëntatievluchten te maken — cirkelvormige, zwevende bewegingen voor het vlieggaat, waarbij ze de locatie van de kast onthouden. Dit is normaal en gezond. Het betekent dat de bijen zich oriënteren in hun nieuwe thuis.



Activiteit bij de Voederbak

Als u een voederbak heeft geïnstalleerd, controleer dan van buitenaf of deze lijkt te worden bezocht. In de eerste 48 uur zou het niet nodig moeten zijn om de kast te openen om het voederniveau te controleren, tenzij het ontwerp van de voederbak dit vereist.



Verkeer bij het Vlieggaat

Een rustige en regelmatige beweging van bijen die de vlieggaatverkleiner in- en uitgaan is een goed teken. Bijen die binnen de eerste 24–48 uur stuifmeel aan hun achterpoten meegebracht terugkeren, zijn een uitstekend signaal — dit duidt doorgaans op de aanwezigheid van een leggende koningin of vers gelegde eitjes (bijen verzamelen stuifmeel wanneer het broed gevoed moet worden).



Signalen om te Noteren

Een grote groep bijen die bij warm weer buiten het vlieggaat hangt ("baard") is gewoonlijk normaal. Als u echter gevechten bij het vlieggaat opmerkt, een snelle toename van het aantal dode bijen of een afwezigheid van activiteit, noteer dit dan in uw dagboek en raadpleeg uw mentor.

De Eerste Week

Ergens tussen de vijfde en zevende dag na de installatie kunt u een eerste korte inspectie uitvoeren — met één concreet doel: bevestigen dat de koningin uit de kooi is vrijgelaten (als u een pakket bijen heeft geïnstalleerd) en dat er zichtbare eitjes of jonge larven zijn, wat bewijst dat ze legt. U voert nog geen volledige inspectie uit. U voert een gerichte verkenning uit om te bevestigen dat de kolonie zich normaal vestigt.

Weersta de verleiding om eerder te inspecteren en weersta de verleiding om bij dit eerste bezoek raam voor raam door te gaan. De kolonie oriënteert zich nog, de bouw van raten is net begonnen en elke verstoring veroorzaakt vertraging. Beweeg langzaam, gebruik zeer weinig rook en beperk de eerste inspectie tot maximaal vijf tot tien minuten.

Hoe Normaal Eruitziet op Dag 5–7

- De koninginnenkooi is leeg of bijna leeg (ze is eruit)
- Kleine groepjes eitjes zichtbaar op de middelste ramen (kleine witte rijstkorrels die rechtop in de cellen staan)
- Bijen breiden kunstraat uit of bouwen nieuwe raten
- Wat nectar of suikerstroop opgeslagen in de buitenste cellen
- Een rustige, zoemende kolonie zonder agressief samendrommen

Wat te Doen als U Geen Eitjes Vindt

Geen paniek. Als de kolonie rustig is, de ratenbouw doorgaat en de ingang normaal verkeer vertoont, bevindt de koningin zich mogelijk simpelweg in het deel van het raam dat u niet zorgvuldig heeft geïnspecteerd. Sluit de kast voorzichtig en wacht nog 4–5 dagen voor een volgende verkenning. Een nieuwe koningin kan 7–10 dagen nodig hebben om na haar vrijlating regelmatig te beginnen met leggen.


Wat als Vestigingsgedrag Wordt Beschouwd

Bijen die dicht op de ramen samendrommen, zeer beperkte vlucht bij koud weer en langzame bewegingen zijn in de eerste week volkomen normaal. De kolonie verbruikt energie voor temperatuurregeling, wasproductie en de voorbereiding van het broednest. Dit is geen probleem — het is gezond koloniegedrag.

 Als u na 10–14 dagen nog steeds geen eitjes, jonge larven of broed kunt vinden, neem dan contact op met uw mentor of leverancier voordat u maatregelen neemt. Een nieuwe kolonie zonder koningin vereist onmiddellijke aandacht.

Uw Eerste Inspectieritueel

Een regelmatig inspectieritueel is een van de waardevolste gewoonten die u in uw eerste jaar kunt ontwikkelen. Wanneer u elke keer in dezelfde volgorde te werk gaat, wordt u sneller, rustiger en nauwkeuriger — en bijen reageren beter op een imker die zich voorspelbaar en met een duidelijke intentie beweegt. Hier is een stap-voor-stap procedure die u elke keer kunt gebruiken wanneer u de kast opent.



De belangrijkste gewoonte in dit ritueel is de laatste stap: **schrijf uw aantekeningen op voordat u de kast sluit**. Het geheugen is onbetrouwbaar, zeker na een interessante of stressvolle inspectie. Zelfs drie zinnen in een notitieboekje — "Koningin gezien, goed broedpatroon, ruimte vult zich" — zullen over vier weken van onschatbare waarde zijn wanneer u probeert te begrijpen wat er is veranderd.

Inspecties Plannen

Voer inspecties uit bij warm, rustig en zonnig weer, wanneer veel werksters ver van de kast zijn. Het midden van de ochtend tot het begin van de middag is doorgaans het ideale tijdstip. Vermijd inspecties voor onweersbuien, bij regen, harde wind of bij zeer lage temperaturen.

Rook: Minder is Meer

Rook wekt bij bijen een voederreactie op die verdedigingsgedrag onderdrukt. Te veel rook stimuleert en stresseert de kolonie echter ook. Gebruik koele, witte rook in kleine hoeveelheden — twee of drie walmers bij de vliegopening, één of twee onder het dak. Blaas nooit langdurig rook rechtstreeks op de bijen.

Ga Voorzichtig om met Ramen

Trek ramen altijd recht omhoog en houd ze verticaal om te voorkomen dat bijen tegen de kastwanden worden geplet. Beweeg langzaam en doelbewust. Zet ramen tegen de buitenwand van de kast — leg ze nooit plat op de grond, waar u er per ongeluk op zou kunnen knielen.

Wat mee te nemen naar elke inspectie

Vergeten uitrusting tijdens een inspectie is frustrerend, en terugkeren om het te halen betekent de kast open laten of een belangrijke controle in haast uitvoeren. Maak er een gewoonte van om alles van tevoren klaar te leggen voordat je naar de bijenstal gaat. Een eenvoudige tas of doos met uitrusting die bij de kast is opgeslagen maakt het snel en automatisch.



Beschermende uitrusting

- Overall of jasje zonder scheuren
- Masker — goed bevestigd, zonder gaten
- Handschoenen — schoon en zacht
- Schoenen die de enkels bedekken



Smoker

- Smoker met voldoende brandstof voor de hele inspectie
- Aansteker of lucifers
- Reserve droge brandstof in een zakje
- Standaard of onderlegger voor de smoker



Bijenbeitel

- Schone beitel (zonder propolis)
- Optioneel: ramentang voor zware raten



Documentatie

- Inspectieboekje of notitieboek
- Pen die schrijft in buitenomstandigheden
- Telefoon of fotocamera



Voeding

- Voedingssiroop, indien voeding bezig is
- Houder voor bijvullen
- Reserveonderdelen voor de voerbak, indien nodig



Hulpmaterialen

- Contact van een lokale mentor
- Beknopte gids of dit boek
- Goedgekeurde middelen, indien monitoring plaatsvindt



Praktijktip: Houd een vaste inspectietas bij, klaar voor gebruik en opgeslagen bij de bijenbenodigdheden. Vul hem direct na elk gebruik aan, zodat hij altijd gereed is.

Waar je bij elke inspectie op moet letten

Elke inspectie heeft één centrale vraag: *Is deze bijenfamilie gezond, groeit ze en is ze goed voorzien?* Deze vraag valt uiteen in een lijst van concrete observaties. Na verloop van tijd wordt het doorlopen van deze lijst automatisch — je kijkt naar een raat en leest al deze signalen tegelijk af. Doe het in het eerste jaar bewust, stap voor stap, totdat de gewoonte stevig verankerd is.

Gezondheidssignalen van de kolonie

→ Tekenen van aanwezigheid koningin

Eitjes, jonge larven en gedekt broed in een gezond patroon. Je hoeft de koningin zelf niet te zien — haar eitjes zijn het bewijs dat ze aan het werk is.

→ Kwaliteit van het broed

Larven moeten parelwit zijn en opgerold in een C-vorm in de cellen liggen. De dopjes moeten lichtbruin, licht gewelfd en gelijkmatig over het gehele broedoppervlak zijn.

→ Voedselvoorraden

Stuifmeel (gekleurd, gevuld in cellen naast het broed), nectar (glanzend, waterig) en gedekt honing (wit of lichtbruin was dat volledig rijpe honing afsluit).

→ Beschikbare ruimte

Zijn de ramen vol met bijen, broed en voorraden? Is er nog lege raat beschikbaar voor de koningin om eitjes in te leggen? Ruimtebeheer is een sleutelvaardigheid in het eerste jaar.

Waarschuwingssignalen

→ Temperament van de kolonie

Noteer of de bijen rustig en zacht gonzend zijn, of juist zeer agressief. Een plotselinge toename van agressiviteit verdient nader onderzoek.

→ Plagen en parasieten

Let op Varroa-mijten op volwassen bijen of in broedcellen, sporen van wasmotten op de ramen of de bijenkastkever die voor het licht wegvlucht.

→ Ongewone geuren

Een gezonde kast ruikt naar warm was en zoet. Elke zure, rottende of scherpe geur uit de binnenkant van de kast is een ernstig waarschuwingssignaal dat onderzoek vereist.

→ Ongewoon uiterlijk

Ingevallen of doorboorde dopjes, verkleurde of gekromde larven of een vettig uiterlijk van het broed zijn waarschuwingssignalen. Fotografeer alles wat er ongewoon uitziet en zoek lokale hulp.

Hoe je eitjes en larven leest

Leren om eitjes correct te observeren en te interpreteren is een van de meest baanbrekende vaardigheden in het eerste jaar van het imkeren. Het lijkt eenvoudig, maar eitjes vinden bij de eerste paar inspecties kan verrassend moeilijk zijn. Ze zijn minuscuul — ongeveer zo groot als een rijstkorrel — bleekwit, licht doorschijnend en staan vlak na het leggen rechtop op de bodem van de cel. Je hebt goede verlichting en de juiste hoek nodig: houd het raam zo dat zonlicht of een zaklamp van bovenaf in de cellen schijnt over je schouder.

Waarom is het vinden van eitjes belangrijker dan het zien van de koningin zelf? Omdat een eitje je vertelt dat de koningin aanwezig was en eitjes legde **in de afgelopen drie dagen**. Een jonge larve vertelt je dat ze aanwezig was in de afgelopen zes dagen. Een koningin die je één keer glimp opvangt maar daarna niet meer kunt vinden, vertelt je heel weinig over wat er sindsdien is gebeurd. Eitjes zijn vers, gedateerd bewijs dat je koningin actief aan het werk is.

Dag 0–3: Eitje

Klein wit korreltje dat rechtop in de cel staat. Één eitje per cel. De aanwezigheid van eitjes bevestigt een leggende koningin in de afgelopen 3 dagen.

Dag 6–9: Oudere larve

Groter C-vorm die meer ruimte in de cel vult. Wit en compact van uiterlijk. Bijen beginnen deze cellen met was af te dekken.

1

2

3

4

Dag 3–6: Jonge larve

Witachtige, glanzende C-vormige rups drijvend in koninginnengelei. Bevestigt activiteit van de koningin in de afgelopen 6 dagen. Jonge larven moeten er gezond uitzien en vochtig zijn.

Dag 9–21: Gesloten broed

Beige of bruine welving boven de cel. Werksterbroed komt uit rond dag 21. Darrenbroed heeft ongeveer 24 dagen nodig en heeft een meer uitgesproken koepelvorm.

i Inspectietip: Als je moeite hebt met het zien van eitjes, probeer dan een klein penlampje schuin in de cellen te richten, of heroriënteer het raam zodat de zon direct in de cellen schijnt van achter je schouder. Gepolariseerde zonnebrillen kunnen het waarnemen van eitjes juist bemoeilijken — doe ze af wanneer je naar eitjes zoekt.

Afgesloten Broed en Broedpatroon

Zodra je betrouwbaar eieren kunt vinden, is de volgende vaardigheid die je moet ontwikkelen het lezen van het broedpatroon — de verdeling en het uiterlijk van afgesloten werksterbroed op het oppervlak van een raam. Een gezond broedpatroon is een van de duidelijkste indicatoren van een goed bepaarde, productieve koningin en een goed ontwikkelende kolonie. Leren onderscheiden tussen een gezond en een zorgwekkend patroon is een vaardigheid die je elk seizoen van pas zal komen.

Gezond Broedpatroon

Een compact, gelijkmatig oppervlak van afgesloten broed dat het grootste deel van het onderste en middelste gedeelte van het raam bedekt, met relatief weinig lege cellen. De doppen zouden moeten zijn:

- Lichtbruin tot warm bruine kleur
- Licht gewelfd (niet ingevallen of geperforeerd)
- Gelijkmatige textuur over het gehele broedgebied
- Bedekkend een ongeveer ovale of ronde oppervlakte

Lege cellen die zichtbaar zijn in het broedgebied zijn doorgaans cellen waar de koningin nog niet bij is geweest, of cellen waaruit bijen net zijn uitgekomen en nog niet opnieuw met eieren zijn bezet. Een klein aantal lege cellen in een verder compact patroon is normaal.

Onregelmatig of Verspreid Patroon

Wanneer een groot deel van de cellen in het broedgebied leeg, ingevallen of onregelmatig afgesloten is, wordt dit een "gespikkeld" of onregelmatig patroon genoemd. Dit kan duiden op:

- Een oude of slecht bepaarde koningin
- Een ziekte die het ontwikkelende broed aantast
- Schade veroorzaakt door de Varroamijt in afgesloten cellen
- Hygiënisch gedrag van werksters die zieke larven verwijderen



Een sterk onregelmatig broedpatroon in een kolonie die eerder een compact patroon had, is een duidelijk signaal om advies te zoeken bij een lokale deskundige. Gok niet — raadpleeg een mentor of lokale inspecteur.

Voedselvoorraden Lezen

Het begrijpen van de voedselvoorraden in een kolonie is een essentiële vaardigheid voor imkers in het eerste jaar — en in elk volgend jaar. Bijen hebben twee soorten voedsel nodig: **koolhydraten** (honing en nectar) als energiebron en **eiwitten** (stuifmeel) voor de ontwikkeling van het broed en de klieren. Beide zijn zichtbaar en af te lezen tijdens inspecties, als u weet waar u op moet letten.



Verse Nectar

Een dunne, waterige, glanzende vloeistof in open cellen. Een licht bloemige geur. Dit is ruwe nectar die door verzamelbijen is binnengebracht — het is nog niet ingedikt tot honing. Als de cellen voor meer dan de helft gevuld zijn met waterige nectar, verzamelt en verwerkt de kolonie actief voedsel.



Verzegelde Honing

Een wit of lichtbruin waskapje dat volledig gedroogde honing afdekt. Verzegelde honing vormt een stabiele langdurige voedselvoorraad. Wanneer bijen een honingcel verzegelen, betekent dit dat het vochtgehalte is teruggebracht tot een veilig niveau voor langdurige opslag. Dit is de enige honing die geschikt is voor oogst.



Stuifmeel

Helder, in cellen gestampt in een regenboog van kleuren — geel, oranje, rood, paars, wit — afhankelijk van de bloeiende planten. Stuifmeel wordt direct naast het broednest opgeslagen, waar voedsterbijen er gemakkelijk bij kunnen. Goede stuifmeelvoorraden zijn een teken van actieve verzameling.



Lage Voorraden

Wanneer de buitenste ramen licht zijn, honingcellen grotendeels leeg zijn en er aan de randen een inkrimping van het broednest zichtbaar is, kan de kolonie een voedseltekort hebben. In het vroege voorjaar of tijdens drachtloze periodes kan dit verrassend snel gebeuren. Controleer de voorraden bij elke inspectie.



Opmerking van de Bijenstal: Een raam volgeladen met verzegelde honing is zichtbaar zwaarder. Naarmate u regelmatig met ramen omgaat, wordt het gevoel voor hun gewicht een van de snelste diagnostische hulpmiddelen — zonder dat u hoeft te tellen.

Gedrag van Bijen Lezen

Naast wat zichtbaar is op de raten, geeft het gedrag van bijen in de buurt van de kast een doorlopende stroom aan informatie tussen inspecties. Ervaren imkers kunnen waardevolle informatie verzamelen door slechts vijf minuten bij de vliegopening te observeren. Als imker in het eerste jaar is het aanleren van de gewoonte om regelmatig de vliegopening te observeren een van de meest waardevolle vaardigheden die je kunt ontwikkelen.



Rustige en Doelgerichte Activiteit

Vliegende bijen vertrekken en keren regelmatig terug, op terugkerende bijen is stuifmeel aan de poten zichtbaar, bij de vliegopening heerst een rustige beweging zonder gevechten. Dit patroon wil je bij elk bezoek waarnemen. Het betekent dat de kolonie gezond is, actief verzamelt en dat de koningin waarschijnlijk eieren legt.



Defensief Gedrag

Bijen die tegen je sluier botsen, agressieve aanvallen van veraf, luid waarschuwend gezoem bij benadering. Defensief gedrag heeft zijn oorzaken: warm en vochtig weer, gebrek aan dracht, recente verstoring, problemen met de koningin of een van nature agressievere kolonie. Noteer de context en de patronen die je in de loop van de tijd waarneemt.



Oriëntatievluchten

Jonge bijen die hun eerste oriëntatievluchten maken, cirkelen in rondjes voor de kast, gericht naar de vliegopening, gedurende 5–30 minuten. Het lijkt op een kleine zwerm voor de kast, maar is volkomen normaal. Het geeft aan dat de kolonie nieuwe bijen opkweekt — een zeer positief teken.




Roverij

Bijen die vechten bij de vliegopening, bijen die proberen binnen te komen via ongebruikelijke hoeken, dode bijen op de vliegplank, chaotisch zigzagvliegpatroon. Roverij treedt op wanneer een zwakke kolonie wordt aangevallen door sterkere kolonies of horzels. Verklein de vliegopening onmiddellijk en stel de oorzaak vast.

Hoe vaak inspecties uitvoeren

Een van de meest voorkomende fouten in het eerste jaar van het imkeren is het te vaak uitvoeren van inspecties uit enthousiasme of angst. Elke inspectie betekent verstoring — bijen verbruiken energie om de orde te herstellen, beschadigde nectar te verzegelen en de temperatuur van het broednest te handhaven. Te frequente inspecties kunnen de ontwikkeling van de kolonie daadwerkelijk vertragen. De tweede veelgemaakte fout is het te zelden uitvoeren van inspecties en het missen van een groeiend probleem voordat het een crisis wordt.



Algemene vuistregel: Elke 10–14 dagen tijdens de actieve groeiperiode vormt een redelijke basis voor de meeste imkers in het eerste jaar. Pas de frequentie aan op basis van het seizoen, waargenomen symptomen en het advies van een lokale mentor. Als iets u specifiek zorgen baart, zijn korte en goed gerichte controles volledig gerechtvaardigd.

Wanneer vaker inspecties uitvoeren

Als u bij de vorige inspectie koninginnencellen heeft opgemerkt, zwermzin vermoedt of ongewone symptomen heeft gezien (onregelmatig broed, vreemde geur, plotselinge agressiviteit), controleer de kolonie dan opnieuw na 5–7 dagen. Zulke situaties vereisen nauwlettender toezicht, niet afwachten.

Wanneer minder vaak inspecties uitvoeren

Tijdens de hoofdvrucht, wanneer de kolonie sterk en gezond is en de omstandigheden stabiel zijn, verstoren frequente inspecties een efficiënt functionerende kast. Doe een stap terug en laat ze werken — een korte observatie van de vliegopening om de paar dagen is meer dan voldoende.

Sjabloon Inspectiedagboek

Jouw aantekeningen van inspecties zijn het krachtigste gereedschap van een imker. Ze zetten kortetermijngeheugen om in langetermijndata. In de loop van het seizoen laat het dagboek patronen zien — wanneer de kolonie zich gewoonlijk ontwikkelt, wanneer voorraden afnemen, wanneer de druk van plagen toeneemt — die zonder schriftelijke aantekeningen onzichtbaar zouden blijven. Gebruik dit sjabloon bij elke inspectie. Je kunt het kopiëren naar een notitieboek, afdrukken of aanpassen naar een digitaal formaat. Het formaat is minder belangrijk dan de gewoonte het consequent te gebruiken.

Veld	Wat te noteren
Datum en tijd	Exacte datum, tijdstip van de dag, duur van de inspectie
Weer	Temperatuurbereik, zonnig/bewolkt/winderig/regenachtig, vochtigheid indien opmerkelijk
Tekenen van de koningin	Koningin gezien? (J/N), Eitjes gezien? (J/N), Jonge larven aanwezig? (J/N)
Broedpatroon	Compact/onregelmatig/gemengd, aantal raten met broed, eventuele afwijkingen
Populatie	Geschat aantal raten bedekt met bijen (bijv. "5 bedekte raten"), trend ten opzichte van de laatste inspectie
Voedselvoorraden	Raten met honing, aanwezigheid van stuifmeel, voorraden voldoende / laag / overvloedig
Beschikbare ruimte	Raten met lege raten, zorgen over blokkering van broed, behoefte aan extra kast?
Temperament	Rustig / licht defensief / zeer defensief, stekepisodes
Tekenen van plagen / ziekten	Zichtbare Varroa-mijten, wasmotten, kevertjes, ongewone geur, broedproblemen
Uitgevoerde acties	Verplaatste raten, bijgevoerde voederbakken, toegevoegde uitrusting, toegepaste behandeling
Volgende acties	Wat te controleren of te doen bij de volgende inspectie
Notities	Eventuele aanvullende opmerkingen, zorgen, vragen voor de mentor

- ✓ Fotografische documentatie is een waardevolle aanvulling op schriftelijke aantekeningen. Fotografeer bij twijfel ongewone broedcellen, verdachte larven of alles wat je niet kunt identificeren, en deel de foto met je mentor of de plaatselijke bijenhoudersvakbond.

Periode van Vroege Groei

De periode van vroege groei is een van de meest fascinerende fasen van het bijenjaar. Na de eerste acclimatisatieperiode treedt een gezonde bijenfamilie een versnelde cyclus in van bevolkingsgroei, ratenopbouw en het verzamelen van voedsel. Dit is het moment waarop u ziet hoe de bijenkast verandert van een kleine zwerm in een goed georganiseerde gemeenschap vol leven met een duidelijk gevoel van doelgerichtheid.

In deze fase verandert uw rol van installatiemanager naar aandachtig waarnemer. De familie heeft geen voortdurende ingrepen nodig — ze heeft geschikte omstandigheden, voldoende voedsel en ruimte om te groeien. Uw taak is om deze omstandigheden te garanderen en tijdig te herkennen wanneer ze ontbreken. Elke inspectie in deze periode moet gericht zijn op het beantwoorden van drie vragen: Legt de koningin goed eieren? Hebben de bijen genoeg voedsel? Hebben ze genoeg ruimte?

De bevolkingsgroei in de vroege periode kan aanvankelijk traag lijken, dan plotseling snel. Dit gebeurt omdat werksters ongeveer 21 dagen nodig hebben om uit eieren te komen. In de eerste drie weken verouderen en sterven de oorspronkelijke installatiebijen, terwijl de eerste nieuwe bijen uit de eieren van uw koningin nog niet zijn uitgekomen. Dit is de daling. Na de 21e dag keert de bevolkingscurve om — nieuwe bijen beginnen sneller te komen dan oude sterven, en de familie groeit zichtbaar van de ene inspectie naar de volgende.

O1

Raatbouw Begint

Bijen scheiden was af en beginnen kunstmatige raten te herbouwen of nieuwe te bouwen. Nieuwe raat is stralend wit; gebruikte raat wordt donkerder met de leeftijd. Rechte, goed gebouwde raat is de basis van goed kasbeheer.

O2

Het Broednest Breidt Zich Uit

Naarmate de koningin regelmatig eieren legt en nieuwe raten beschikbaar zijn, breidt het broednestgebied zich naar buiten uit vanuit het midden. Volg deze uitbreiding bij elke inspectie — het vertelt u iets over de productiviteit van de koningin en het groeitempo van de familie.

O3

Bevolkingsgroei Versnelt

Na de eerste 21 dagen beginnen nieuwe bijen in steeds grotere aantallen uit te komen. De populatie zal zichtbaar sneller groeien, de bijenkast zal er actiever uitzien en u zult intensievere activiteit van vliegbijen bij de vliegopening waarnemen.

O4

Voedselvoorraden Stapelen Zich Op

Met een toenemend aantal vliegbijen stapelen pollen- en nectarvoorraden zich sneller op. Observeer hoe de buitenste raten beginnen te vullen met verzegelde honing — dit is een teken dat de familie met succes haar voedselvoorraden opbouwt.

Voeding in de Vroege Groeifase

De vraag of je een nieuwe kolonie moet voeren is een van de meest gestelde vragen door beginners — en het eerlijke antwoord is: het hangt af van de omstandigheden. Beslissingen over voeding in de bijenteelt zijn vrijwel nooit universeel. Ze hangen af van de lokale beschikbaarheid van nectar, het seizoen waarin de kolonie werd geïnstalleerd, de sterkte van de kolonie op het moment van installatie en het advies en de gebruiken van de lokale bijenteeltgemeenschap.

De algemene vuistregel luidt: **voer wanneer de natuurlijke voedselbronnen onvoldoende zijn om de groei van de kolonie te ondersteunen.** Vroeg in het voorjaar, wanneer er weinig planten bloeien, wanneer het weer het foerageren heeft verhinderd of wanneer de kolonie net is geïnstalleerd en nauwelijks voorraden heeft opgebouwd, kan bijvoeding het verschil maken tussen een kolonie die gedijt en een kolonie die verhongert. Voeding tijdens een sterke drachtperiode kan echter het tegenovergestelde effect hebben — bijen kunnen cellen die bedoeld zijn voor broed vullen met siroop in plaats van dat de koningin daar eitjes legt, waardoor de groei vertraagt en er problemen kunnen ontstaan.

Wanneer Voeding Kan Helpen

- Nieuw geïnstalleerd pakket of zwerm met beperkte voorraden
- Vroeg in het jaar met weinig bloeiende drachtplanten
- Langdurige kou of regen die de vluchten van de bijen beperkt
- Zichtbaar lage voorraden op de buitenste ramen bij inspectie
- Te weinig bijen voor effectief foerageren

Wanneer Voeding Niet Nodig Is

- Actieve drachtperiode met overvloed aan bloeiende planten
- Sterke zwerm met meerdere ramen verzegelde honing
- Buitenste ramen vertonen consequent goede voorraden
- Bijen keren regelmatig terug met grote stuifmeellading

 Raadpleeg altijd een lokale imker of mentor over de actuele nectarbeschikbaarheid in uw regio voordat u beslist om te starten of stoppen met voeden. Lokale kennis is hier van cruciaal belang.

Overvoeding en ondervoeding vermijden

Zowel overvoeding als ondervoeding vormen echte risico's voor nieuwe kolonies, en imkers in hun eerste jaar belanden vaak in een van deze twee valkuilen. Inzicht in de gevolgen van elk uiterste helpt om de juiste balans te vinden — wat in de praktijk betekent: nauwlettend bijhouden wat de kolonie werkelijk doet met het aangeboden voedsel.

Risico's van overvoeding

- **Blokkering van het broednest:** Wanneer suikerstroop wordt opgeslagen in cellen die de koningin nodig heeft om eieren te leggen, raakt het broednest 'geblokkeerd' en heeft de koningin geen ruimte om te leggen. Dit kan zwermen uitlokken of een aanzienlijke vermindering van de eileg van de koningin veroorzaken.
- **Overmatige vochtigheid in de kast:** Grote hoeveelheden verdunde stroop verhogen de luchtvochtigheid in de kast, omdat de bijen werken om het te verdampen. Bij slecht weer vergroot dit het risico op gisting en ziekten.
- **Risico op roverij:** Volle en open voerbakken met rijke stroop trekken rovende bijen en wespen uit omliggende kolonies aan, wat gevaarlijke roverij-incidenten kan uitlokken.

Risico's van ondervoeding

- **Verhongering:** Nieuwe kolonies kunnen verrassend snel verhongeren — binnen enkele dagen — als de voorraden uitgeput raken tijdens periodes zonder dracht en er geen aanvullende voeding wordt gegeven. Verhongering is een van de meest voorkomende en best te voorkomen oorzaken van kolonieverlies in het eerste jaar.
- **Langzame raatbouw:** Bijen hebben koolhydraten nodig voor de wasproductie. Zonder voldoende voedsel stopt de raatbouw, heeft de koningin geen ruimte om eieren te leggen en vertraagt de bevolkingsgroei aanzienlijk.
- **Beperkte broedgroei:** Een uitgehongerde kolonie beperkt de broedopkweek om middelen te sparen. Als dit gebeurt tijdens een kritieke periode van vroege groei, verdiept het bevolkingstekort zich en duurt het herstel veel langer.



Controleer het voerbak bij elke inspectie. Een leeg voerbak gedurende twee weken helpt de kolonie op geen enkele manier. Vul preventief bij en let erop of de bijen het voedsel daadwerkelijk verbruiken.

Bouw van Raten en Beheer van Raampjes

De raten die bijen in het eerste seizoen bouwen, zijn letterlijk de infrastructuur van hun thuis. Recht gebouwde, gelijkmatig geplaatste raten maken elke toekomstige inspectie eenvoudiger — sneller, gemakkelijker en veiliger voor de bijen. Scheve, gekantelde of dwars gebouwde raten veroorzaken problemen die zich in de loop van de tijd opstapelen — raampjes die niet kunnen worden verwijderd zonder de raten te beschadigen, moerdoppen die niet gecontroleerd kunnen worden, en broedgebieden die moeilijk te beheren zijn.

Het beste moment om problemen met raten te corrigeren is *onmiddellijk* — wanneer de raat vers en zacht is. Oude raten zijn moeilijker te hervormen, breken anders en hebben meer propolisversterkingen. Daarom is het zo belangrijk om nieuwe volken elke 10–14 dagen te inspecteren tijdens de raatbouwfase: u ontdekt onjuist gebouwde raten voordat ze een structureel probleem worden.

01

Controleer Regelmatig de Richting van de Raten

Elk nieuw raampje moet een raat hebben die recht langs de middelste rib van de kunstraat is gebouwd. Als u een raat ziet die tussen raampjes is gebouwd ("dwarse raat") of die naar opzij afwijkt, grijp dan in vóór de volgende inspectie. Corrigeer of verwijder het fout gebouwde gedeelte voorzichtig zolang het was nog vers is.

03

Let op Verbindingsraten

Kleine wasbruggetjes die tussen raampjes of tussen de bovenlat en de kast worden gebouwd, zijn normaal. Verwijder ze met een bijenbeiteltje tijdens inspecties, zodat de raampjes niet aan elkaar vastkleven. Laat verbindingsraten niet staan — bij elk bezoek neemt hun aantal toe.

02

Voeg Raampjes toe vanaf de Rand

Wanneer een nieuw volk de raampjes vult, houd dan ongebouwde raampjes naast de reeds gebouwde — bijen breiden zich uit vanuit het midden naar buiten. Het plaatsen van lege raampjes te ver van het bestaande werk vertraagt de raatbouw en kan scheve bouw bevorderen.

04

Kunstraat versus Raampjes Zonder Kunstraat

Als u kunstraat op een raampje met draad gebruikt, zorg er dan voor dat het correct is gemonteerd en ondersteund. Als u startstrips of raampjes zonder kunstraat gebruikt, houd de kast dan perfect waterpas van zijde tot zijde om natuurlijke rechte raatbouw te bevorderen — bijen gebruiken de zwaartekracht als leidraad.

Wanneer Ruimte Toevoegen

Ruimtebeheer is een van de belangrijkste en meest complexe vaardigheden in het eerste jaar van het imkeren. Als u te vroeg een tweede bak toevoegt, verdeelt u het vermogen van de kolonie om warmte vast te houden, vertraagt u de broedontwikkeling en biedt u ongedierte zoals wasmotten een lege, onbewakte ruimte om te koloniseren. Als u te lang wacht, zullen de bijen zich overbevolkt voelen, begint u zwermcellen te bouwen en kunnen ze uitvliegen voordat u de waarschuwingssignalen opmerkt.

De regel die de meeste ervaren imkers hanteren: **wanneer 7 van de 8 of 8 van de 10 ramen bedekt zijn met bijen, is het tijd om een nieuwe bak toe te voegen**. Niet wanneer de bak vol honing is — maar wanneer hij vol bijen is. De populatie is het signaal om ruimte toe te voegen, niet de honingvoorraden zelf. Een kolonie met slechts 4–5 ramen bijen heeft geen tweede bak nodig, ongeacht hoe vol de cellen met honing zijn.



Signalen dat de Kolonie Klaar Is voor Meer Ruimte

- 7–8+ ramen stevig bedekt met bijen
- Broed in de meeste middelste ramen, voorraden die de buitenste ramen vullen
- Bijen verzameld bij de ingang op warme avonden ("baard")
- De koningin heeft geen vrije cellen meer om eitjes in te leggen
- Nectar opgeslagen in cellen bestemd voor broed (honingblokkade)



Signalen om te Wachten met Ruimte Toevoegen

- Minder dan 5–6 ramen bedekt met bijen
- Buitenste ramen van de bak nog leeg of zonder gebouwde raat
- Weer koud genoeg dat de bijen bij elkaar moeten blijven
- Kolonie recentelijk geïnstalleerd en nog in de stabilisatiefase
- Teken van ziekte of stress (los deze eerst op)



Als u niet zeker weet of u een honingzolder of een tweede broedkast moet toevoegen, raadpleeg dan een lokale mentor. De juiste keuze hangt af van het type kast, lokale drachtbronnen en het seizoen — factoren die een lokale imker beter kan beoordelen dan welke algemene gids dan ook.

Honingvloed

Honingvloed is de periode waarin voldoende bloemen bloeien en nectar produceren in hoeveelheden die bijen in staat stellen meer te verzamelen dan ze dagelijks verbruiken. Tijdens een sterke honingvloed treedt een gezonde kolonie in een bijna koortsachtig activiteitsritme — verzamelsters keren beladen met nectar terug, werksters werken aan het verdampen en indikken ervan, en opslagcellen vullen zich snel. De kast klinkt krachtiger, ruikt zoeter en het verkeer bij de vliegspleet is zichtbaar groter dan in andere periodes.

Het begrijpen van de honingvloed in uw specifieke gebied is essentieel, omdat deze enorm verschilt. In sommige gebieden is er één hoofdvloed van een dominante teelt of boomsoort. In andere komen gedurende het hele actieve seizoen meerdere kleinere vloedperioden voor, gescheiden door periodes zonder vloed. De drachtloze periode — de tijd waarin de beschikbaarheid van nectar minimaal of nul is — is voor jonge kolonies vaak gevaarlijker dan het winterseizoen, omdat deze zonder waarschuwing kan komen en de voorraden snel kan uitputten.

Tijdens de Honingvloed

- Intensief verkeer van verzamelsters gedurende de hele dag
- Bijen keren terug met lading stuifmeel en nectar
- Honingcellen vullen zich geleidelijk en worden afgesloten
- Het gewicht van de kast neemt elke dag zichtbaar toe
- Het temperament van de kolonie is vaak rustiger (bijen gefocust op de vloed)
- Zwerminstinct kan tijdens sterke vloedperioden tijdelijk worden onderdrukt

Tijdens de Drachtloze Periode

- Verminderd verkeer van verzamelsters
- Bijen verbruiken voorraden sneller dan ze aanvullen
- Meer roofpogingen tussen kolonies
- De kolonie kan agressiever worden
- Bijvoeren kan nodig zijn om deze periode te overbruggen
- Verklein de vliegspleet om dieven te ontmoedigen tijdens de drachtloze periode

 **Essentiële tip:** Informeer bij ervaren imkers naar de belangrijkste drachtperiodes en drachtloze periodes in uw gebied. Deze kalenderkennis is een van de waardevolste dingen die een lokale mentor u in het eerste jaar kan meegeven.

Taken tijdens de hoofddracht

Wanneer de hoofddracht aanbreekt — de periode waarin de bijenfamilie haar maximale sterkte bereikt en de omstandigheden voor nectarverzameling optimaal zijn — is jouw voornaamste taak *een stap terug te doen*. De familie weet wat ze moet doen. Jouw rol is ervoor te zorgen dat niets haar mechanisch of logistiek belemmert in haar werk, en geen problemen te creëren door overdreven in te grijpen in een kast die op zijn best functioneert.

1

Houd de beschikbare ruimte in de gaten

Dit is de belangrijkste taak tijdens de dracht. Als nectar sneller binnenkomt dan er opslagruimte is, vult de familie het broednest en kan ze gaan zwermen. Controleer de ruimte in de honingkamers elke 2–3 weken. Voeg een nieuwe honingkamer toe wanneer de bestaande voor ongeveer 70–80% gevuld is — wacht niet tot hij volledig is verzegeld.

2

Beperk onnodige verstoringen

Frequente controles tijdens de dracht vertragen de familie en veroorzaken onnodige stress. Als je geen concrete reden tot bezorgdheid hebt, controleer dan snel en sluit de kast. Beoordeel de ruimte in de honingkamers en zoek naar duidelijke tekenen van zwermvoorbereiding, laat de bijen daarna gewoon werken.

3

Zorg voor toegang tot water

Een sterke vliegbijenpopulatie verbruikt aanzienlijke hoeveelheden water, vooral op warme dagen. Zorg ervoor dat de waterbron betrouwbaar, goed bereikbaar en continu aangevuld is. Bijen die de vijver of het zwembad van de buurman ontdekken, worden een probleem dat slechts moeilijk naar elders te leiden is.

4

Houd de sterkte van de familie in de gaten

Een controle tijdens de dracht moet bevestigen: de koningin legt eieren, de populatie is groot, er zijn geen duidelijke tekenen van ziekten of plagen. Een gedetailleerde inspectie raam voor raam kan wachten — tijdens de intensiefste drachtperiode zijn snelle controles voldoende.

Honigraten voor Beginners

Een honingraat is simpelweg een extra kast — meestal ondieper dan het broednest — die boven het broedlichaam wordt geplaatst en de bijenfamilie een aparte ruimte biedt voor het opslaan van overvloedige honing. Wanneer de familie sterk genoeg is en de omstandigheden gunstig zijn, stelt deze extra ruimte de bijen in staat deze te vullen zonder het broedlichaam eronder vol te proppen. Het sleutelwoord hier is *overschot*. Een honingraat mag pas op de kast worden geplaatst wanneer de familie daadwerkelijk meer voedsel binnenhaalt dan ze nodig heeft en het lichaam dicht bezet is met bijen.

Als imker in het eerste jaar moet u honingraten met voorzichtigheid en geduld benaderen. Niet elke familie in het eerste jaar vult een honingraat met oogstklare honing — en dat is volkomen normaal. Sommige families — vooral die laat in het seizoen bezet zijn of die te kampen hebben gehad met ziektes, slecht weer of andere problemen — zouden alles wat ze geproduceerd hebben moeten bewaren. De beslissing om een honingraat toe te voegen moet gebaseerd zijn op de werkelijke toestand van de familie, niet op optimisme of een datum in de kalender.

Wanneer een Honingraat Toevoegen

Het lichaam is vol — dat wil zeggen dat 7–8 of meer ramen bezet zijn met bijen, het broed compact is, de koningin actief eieren legt, de buitenste ramen zich met honing vullen en overvol zijn, en u zich midden in of dicht bij de hoofddracht in uw regio bevindt. Al deze voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn voordat u een honingraat toevoegt.

Koninginnenrooster: Wel of Niet Gebruiken

Een koninginnenrooster is een net of scheidingswand met openingen die tussen het lichaam en de honingraat wordt geplaatst, zodat de koningin geen eieren kan leggen in de honingramen. Veel imkers gebruiken ze; anderen niet. Vraag uw lokale mentor wat de gangbare praktijk in uw regio is. Een rooster is niet strikt noodzakelijk, maar mits correct gebruikt vereenvoudigt het de honingoogst aanzienlijk.

Beheer van de Honingraat

Controleer de ruimte in de honingraat elke 2–3 weken tijdens de dracht. Wanneer de honingraat voor 70–80 % gevuld is met verzegelde honing, kunt u de oogst plannen. Als deze vol raakt vóór het einde van de dracht, voeg dan een tweede honingraat toe onder de eerste (tussen het lichaam en de bestaande honingraat), zodat de bijen ruimte hebben om rijpende honing te verplaatsen.

Basisprincipes van Zwermen

Zwermen is de natuurlijke voortplantingsmethode van een bijenkolonie — het is de manier waarop de soort zich verspreidt. Wanneer de omstandigheden gunstig zijn (doorgaans een sterke, overbevolkte kolonie in een periode van intensieve groei in het late voorjaar of het begin van de zomer), verlaat de oude koningin de kast samen met ongeveer de helft van de werksters. Ze vormen tijdelijk een tros in de buurt, terwijl verkennersbijen op zoek gaan naar een nieuw onderkomen. Ondertussen kweekt de oorspronkelijke kast een nieuwe koningin uit de achtergelaten noodcellen.

Voor de imker betekent een zwerm een aanzienlijk verlies van populatie. Het vertrek van de helft van de kolonie betekent de helft van de verzamelsters, de helft van de honingproductie en het risico van een periode zonder koningin in de oorspronkelijke kast, terwijl de nieuwe koningin uitloopt en bruidsvluchten maakt. Zwermen is geen ramp — de kast herstelt zich doorgaans — maar het kan worden voorkomen door zorgvuldige observatie en tijdig ingrijpen.

Het begrijpen van zwermen is niet bedoeld om u zorgen te maken, maar omdat de vroege waarschuwingssignalen zichtbaar en waarneembaar zijn bij regelmatige inspecties. Een imker die de symptomen twee tot drie weken voor het uitzwermen herkent, heeft de tijd om in te grijpen. Een imker die er pas achter komt op het moment dat een tros bijen zich heeft neergezet in de tuin van de buurman — die heeft die tijd niet meer.

i Essentiële verandering van inzicht: Zwermen is geen falen. Het is een natuurlijk proces dat u kunt leren voorspellen en beheersen. Het doel is vroegtijdige detectie en een gepaste reactie — niet het volledig uitsluiten van de mogelijkheid tot zwermen.

Waarom Kolonies Zwermen

Aan de zwermimpuls dragen bij: overbezetting van de broedruimte, sterke bevolkingsgroei, beperkte ruimte voor nieuwe raten, seizoensgebonden groeistimuli en de aanwezigheid van werksters op voortplantingsleeftijd.

Wanneer Zwermen Gewoonlijk Plaatsvindt

Meestal tijdens de periode van intensieve bevolkingsgroei, van het begin tot het midden van het seizoen. Een kolonie die gedurende meerdere weken heeft geprofiteerd van goede omstandigheden voor broedvorming en groeiende voedselvoorraden, is het meest geneigd tot zwermen.

Wat Er Gebeurt Na het Zwermen

De oorspronkelijke kast kweekt een nieuwe koningin uit de bestaande koninginnencellen. Er treedt een onderbreking in de eiafzetting op van 2 tot 4 weken. De kolonie herstelt geleidelijk haar populatie. De honingproductie kan voor de rest van het seizoen verminderd zijn.

Waarschuwingssignalen van Zwermen

Vroege waarschuwingssignalen van een naderende zwerm verschijnen tijdens inspecties, doorgaans twee tot vier weken vóór het daadwerkelijke vertrek van de zwerm. Het leren herkennen ervan biedt waardevolle tijd om in te grijpen. Controleer deze indicatoren bij elke voorjaarsinspectie en het begin van de zomer als een bewust punt op uw controlelijst.

1

Overbevolking op Alle Ramen

Elk raam is dicht bezet met bijen, inclusief de buitenste ramen. Bijen verzamelen zich op warme avonden voor de kast, zelfs bij mild weer. De kast is letterlijk overvol.

2

Aanwezigheid van Koninginnencellen

Zwermcellen bevinden zich doorgaans aan de onderste randen van de ramen, hoewel ze overal kunnen voorkomen. Zelfs één of twee gedopte zwermcellen zijn een ernstige waarschuwing. Meerdere gedopte cellen betekenen dat zwermen binnen enkele dagen ophanden kan zijn.

3

Opvulling van het Broednest

Wanneer bijen nectar en honing beginnen te propen in cellen in het midden van het broednest — de koningin als het ware "omsingelen" met honing — heeft ze minder ruimte om eieren te leggen en kan ze haar eilegactiviteit beginnen te verminderen als voorbereiding op het vertrek.

4

Grote Populatie Darren

Een aanzienlijke darrenpopulatie is een seizoenssignaal dat de kolonie zich voorbereidt op voortplantingsactiviteit. Darren worden grootgebracht om te paren met nieuwe koninginnen — hun massale aanwezigheid gaat in gezonde en overbevolkte kolonies vaak vooraf aan zwermen.

5

Slanker Achterlijf van de Koningin

Als het u lukt de koningin te identificeren en zij er slanker uitziet dan gewoonlijk (de bijen hebben haar voeding beperkt om haar voor te bereiden op de vlucht), is dit een verdere indicatie van een naderende zwerm. Het is een geavanceerde waarneming, maar de moeite waard om te onthouden.

⚠ Als u gedopte koninginnencellen vindt maar de oorspronkelijke koningin niet kunt vinden, is de zwerm mogelijk al vertrokken. Controleer de omgeving van de vliegopening zorgvuldig — een grote zwerm in een nabijgelegen boom bevestigt dit. Neem contact op met uw mentor voor advies over de volgende stappen.

Moederijcellen – Uitgelegd

Niet alle moederijcellen zijn hetzelfde, en het begrijpen van het verschil tussen zwerm-, vervangings- en noodmoederijcellen stelt je in staat correct te interpreteren wat de bijen aangeven. Het reflexmatig vernietigen van alle moederijcellen als reactie op een dreiging is een van de meest voorkomende en schadelijkste fouten die beginnende imkers in hun eerste jaar maken. Sommige moederijcellen moeten met rust worden gelaten. Andere vereisen ingrijpen. Weten welke welke zijn, is essentieel.

Zwermmoederijcellen

Gebouwd aan de **onderste randen van de ramen** of in de onderste delen van het raatoppervlak. Gewoonlijk in groepen van meerdere cellen gebouwd. Ze geven aan dat de kolonie van plan is te zwermen. Ze verschijnen doorgaans in een sterke, overbevolkte kolonie met een gezonde, leggende koningin. Vereisen beheersmaatregelen — voeg ruimte toe, splits de kolonie of raadpleeg je mentor.

Vervangingsmoederijcellen

Gebouwd **in het midden van het raatoppervlak**, meestal slechts één of twee cellen. Ze geven aan dat de kolonie zelfstandig een oude, verzwakte of slecht functionerende koningin vervangt. Werksters beoordelen het fermoonniveau van de koningin en beginnen een opvolgster op te kweken. De algemene regel is — de kolonie weet het beter. Vernietig deze cellen in de meeste gevallen niet, tenzij je een specifieke reden hebt om aan te nemen dat de nieuwe koningin inferieur zal zijn.

Noodmoederijcellen

Gebouwd wanneer de kolonie plotseling haar koningin verliest — door accidenteel platdrukken tijdens een inspectie, een aanval van een roofdier, ziekte of een andere plotselinge dood. Noodmoederijcellen kunnen overal op het raat verschijnen, vaak op bestaande jonge larven. Ze worden gewoonlijk in grotere aantallen gebouwd dan vervangingsmoederijcellen. Als je noodmoederijcellen vindt, betekent dit dat de kast weesloos is. **Vernietig deze cellen niet.** Ze vormen de levensader van de kolonie. Neem contact op met je mentor voordat je verdere stappen onderneemt.

- ⊗ Vernietig nooit alle gevonden moederijcellen zonder te begrijpen waarom ze zijn gebouwd. Een kolonie zonder koningin en zonder levensvatbare moederijcellen zal sterven. Laat altijd de best uitziende cel intact, tenzij je een concreet plan hebt om een koningin in te voeren.

Wat te doen als u de koningin niet kunt vinden?

Het niet vinden van de koningin tijdens een inspectie is niet automatisch een crisissituatie. Koninginnen zijn moeilijk te zien — ze bewegen snel tussen de ramen, verschuilen zich achter groepen werksters en in een kast met tien dichtbezette ramen vereist het vinden van één enkele bij tussen de veertigduizend geduld en een geoefend oog. Veel ervaren imkers vinden de koningin niet bij elke inspectie. In plaats daarvan zoeken ze naar *bewijs van haar aanwezigheid*.



De betrouwbaarste indicator van de aanwezigheid van een koningin zijn altijd verse eieren. Als u eieren in de cellen kunt bevestigen, weet u dat de koningin de afgelopen drie dagen heeft gelegd. Dat is alles wat u nodig heeft. Of u de koningin zelf ziet of niet, is in het eerste jaar van de imkerij grotendeels onbelangrijk voor het beheer van de kolonie.

i Als u geen eieren, jonge larven of broed kunt vinden: Sluit de kast, wacht 5–7 dagen en voer opnieuw een grondige inspectie uit. Gun uzelf twee pogingen voordat u concludeert dat de kast moerloos is. Als u na twee grondige inspecties geen eieren of verse tekenen van leggen vindt, neem dan onmiddellijk contact op met uw mentor. Een kolonie zonder koningin vereist snel ingrijpen.

Problemen met de Koningin

Problemen met de koningin behoren tot de meest stressvolle ervaringen voor imkers in het eerste jaar — deels omdat ze interpretatie vereisen, en interpretatie vereist ervaring. De onderstaande symptomen kunnen wijzen op een probleem met de koningin, maar bijna elk symptoom heeft meer dan één mogelijke oorzaak. Beschouw dit als een naslaggids, niet als een diagnostisch hulpmiddel, en raadpleeg altijd een mentor voordat u ingrijpt.

Waargenomen symptoom	Mogelijke oorzaak	Volgende stap voor beginners
Afwezigheid van eieren, larven en broed	Afwezigheid van koningin of recent geïnstalleerde kolonie die zich nog aan het vestigen is	Wacht 5–7 dagen en voer een nieuwe inspectie uit. Als ze nog steeds afwezig zijn, neem contact op met uw mentor.
Onregelmatig, verspreid broedpatroon	Verzwakte koningin, ziekte, schade door Varroa-mijt, hygiënisch gedrag	Volg twee inspecties op. Neem contact op met uw mentor en stuur foto's.
Meerdere eieren in één cel	Leggende werkster (reactie van een moerloos volk waarbij werksters onbevuchte eieren leggen)	Vraag onmiddellijk om hulp van een ervaren mentor. De situatie is moeilijk te corrigeren.
Uitsluitend darrenbroed (grote, gewelfde doppen)	Leggende koningin die alleen darren produceert, of leggende werkster	Neem contact op met uw mentor — vereist ervaren besluitvorming.
Zeer luidruchtige, onrustige kolonie zonder duidelijke reden	Afwezigheid van koningin, recent verlies van koningin, roverij in gang	Voer een zorgvuldige inspectie uit. Controleer op aanwezigheid van moerdoppen en eieren.
Koningin zichtbaar, maar het broednest krimpt geleidelijk	Verouderende of verzwakte koningin, ziektedruk, gebrek aan dracht	Volg op en documenteer. Raadpleeg uw mentor voordat u ingrijpt.

⊗ Introduceer nooit een nieuwe koningin, vernietig niet alle moerdoppen en probeer de kolonie niet te splitsen op basis van één enkele inspectie. Elke ingreep met betrekking tot de koningin moet worden bevestigd door herhaalde controle en overleg met een mentor voordat u handelt.

Problemen met het Temperament van de Kolonie

De meeste kolonies honingbijen zijn zeer rustig en gemakkelijk te hanteren. Toch zal elke ervaren imker een kolonie tegenkomen die moeilijk wordt — agressief, defensief of onvoorspelbaar reactief. Het begrijpen van de redenen waarom temperamentsproblemen ontstaan, helpt onderscheid te maken tussen een kolonie die correcties in het beheer vereist en een kolonie waarbij de koningin of de gezondheidstoestand de bron van het probleem is.

Temperament is niet constant. Een kolonie die maandenlang rustig gedroeg tijdens inspecties, kan defensief worden als reactie op externe prikkels of interne veranderingen. Omgekeerd kalmeert een defensieve kolonie vaak na het vervangen van de koningin of na verbetering van de seizoensomstandigheden. Registreer het temperament bij elke inspectie om veranderingen en het moment waarop ze ontstaan bij te houden.



Weer en Seizoen

Bijen zijn veel defensiever voor onweersbuien, bij hoge luchtvochtigheid en in periodes van drachttekort, wanneer er weinig voedsel is. Beoordeel het temperament van een kolonie niet op basis van één slechte inspectiedag. Noteer de weersomstandigheden en herhaal de inspectie onder betere omstandigheden voordat je concludeert dat er een probleem is.



Kwaliteit van de Koningin

Het temperament van een kolonie wordt grotendeels bepaald door de genetica van de koningin. Een kolonie die in de loop van het seizoen steeds defensiever wordt — vooral na het vervangen van de koningin of nadat het nageslacht van de nieuwe koningin de samenstelling van de werksters volledig heeft overgenomen — kan een koningin hebben met meer defensieve genen dan wenselijk is voor de betreffende locatie.



Gedrag van de Imker

Plotselinge, gehaaste, onvoldoende berookte of te frequente inspecties verhogen de stress van de kolonie en haar defensieve reactie. Zorg er altijd voor dat de smoker goed werkt voordat je de kast opent. Beweeg rustig en doelgericht. Een beheerste imker inspecteert een rustiger kolonie.



Locatiefactoren

Kasten geplaatst nabij drukke gebieden (drukke paden, speelplaatsen voor kinderen, lawaaierige machines) kunnen defensief gedrag ontwikkelen door voortdurende verstoring. Als een voorheen rustige kolonie aanhoudend defensief is geworden zonder andere verklaring, overweeg dan of de locatie van de kast zelf bijdraagt aan dit probleem.

Honingdiefstal (Roven)

Roven treedt op wanneer bijen van één familie proberen honing of nectar te stelen die is opgeslagen in een andere familie, of uit een open container. Dit gebeurt het vaakst tijdens perioden van drachtschaarste, wanneer voedsel schaars is en beschikbaar is in zwakke families, open kasten tijdens inspecties, onafgedekte voerbakken of in de buurt van gemorste honing. Voor een nieuwe familie kan roven door sterkere buurkolonies verwoestend zijn — een zwakke kast kan binnen enkele uren volledig worden leeggeroofd.


Roven Herkennen	Onmiddellijke Reactie	Preventie
• Chaotische, zigzaggende vlucht voor de kast (geen rustige boog van normale vlucht) • Gevechten bij de vliegopening — bijen vechten met elkaar, dode bijen op de bodem van de kast • Bijen die proberen binnen te dringen via ongebruikelijke plaatsen — hoeken, scheuren in de wand • Verhoogde activiteit in de namiddaguren tijdens drachtschaarste (vliegbijen zijn normaal thuis) • Kast plotseling actiever dan normaal zonder verklaring in de vorm van nectartoevoer	• Verklein de vliegopening direct tot de kleinst mogelijke opening • Dek de kast een uur af met een natte doek of handdoek als het roven ernstig is • Verwijder alle externe voedselbronn of onafgedekte suikeroplossingen • Open de kast niet totdat het roven volledig is gestopt (24–48 uur) • Sluit controleopeningen in de uitrusting — gebruik beschermende netten indien beschikbaar	• Houd de vliegopening vernauwd tijdens perioden van drachtschaarste en bij nieuwe/zwakke families • Laat voerbakken nooit open staan of honing onafgedekt buiten de kast • Voer inspecties snel uit en laat ramen niet buiten blootgesteld liggen • Sluit de kast volledig voor het donker • Vermijd indien mogelijk inspecties tijdens perioden van drachtschaarste

 Roven is een echte noodsituatie voor een zwakke familie. Aarzel niet met reageren. Een familie die haar voorraden verliest aan dieven, overleeft het mogelijk niet — vooral als de winterrust nadert.

Plagen en Ziekten — Overzicht

Leren over plagen en ziekten hoeft voor een beginnende imker in het eerste jaar niet overweldigend te zijn. Je hoeft geen entomoloog of dierenarts te worden. Wat je nodig hebt, is kennis van de *meest voorkomende bedreigingen* in jouw regio, het herkennen van vroege waarschuwingssignalen, het begrijpen van het verschil tussen een probleem dat je zelf kunt oplossen en een probleem dat deskundige hulp vereist, en snel handelen wanneer iets verontrustend lijkt.

Bedreigingen variëren sterk per regio. Niet elk land of klimaat heeft elke plaag. De plaatselijke imkersvereniging en je mentor zijn de betrouwbaarste bronnen van informatie over wat er werkelijk voorkomt en gereguleerd is in jouw gebied. Dit gedeelte biedt je een algemeen kader; lokale contacten vullen de specifieke details aan.



- i** Het doel in deze fase is **vroege herkenning en melding**, niet zelfbehandeling. Als je een ernstig ziekte- of plaagprobleem vermoedt, neem dan contact op met de plaatselijke imkersvereniging, je mentor of een inspecteur voordat je actie onderneemt.

Varroa-mijten: De Dreiging in het Eerste Jaar

Varroa destructor is een parasitaire mijt die zich voedt met ontwikkelende bijenlarven en volwassen bijen. Het verzwakt individuele bijen fysiek, onderdrukt hun immuunsysteem en draagt een aantal virussen over die de gezondheid van een kolonie kunnen decimeren. In de meeste delen van de wereld waar Europese honingbijen (*Apis mellifera*) worden gehouden, is Varroa al endemisch — dat wil zeggen dat het aanwezig is in de meeste kolonies en actieve monitoring en controle vereist.


Varroa is zo gevaarlijk niet omdat individuele mijten onmiddellijk dodelijk zijn. Een kolonie met slechts een paar Varroa-mijten zal er normaal uitzien. Het gevaar schuilt in het vermogen van de mijtenpopulatie om exponentieel te groeien. Onder gunstige omstandigheden kan het mijtenniveau zich elke paar weken verdubbelen. Tegen de tijd dat een imker voor het eerst symptomen opmerkt — bijen met misvormde vleugels, een afnemende populatie, abnormaal broed — kan het mijtenniveau al catastrofaal hoog zijn.

De belangrijkste boodschap over Varroa voor imkers in het eerste jaar is: **monitor vroeg, monitor regelmatig en handel op basis van gegevens, niet op basis van aannames.** Je kunt niet bepalen of een kolonie een Varroa-probleem heeft door simpelweg van buiten naar de kast te kijken. Je kunt mijten op volwassen bijen niet betrouwbaar tellen tijdens een gewone inspectie. Varroa-monitoring vereist een specifieke en doelgerichte bemonsteringsmethode.

- ⊗ **Belangrijke waarschuwing voor het eerste jaar:** Ga er niet van uit dat jouw nieuwe kolonie vrij is van mijten alleen maar omdat ze er gezond uitziet. Alle pakketten en zwermen kunnen met een bepaald niveau van Varroa meekomen. Begin met monitoren binnen de eerste paar weken. Neem contact op met de plaatselijke imkersvereniging om te weten te komen welke monitoring- en behandelingsmethoden zijn goedgekeurd in jouw regio.

Varroa-monitoring – basisconcepten

Varroa-monitoring bestaat uit het nemen van een monster van volwassen bijen en het tellen van de mijten in dat monster. Het resultaat — doorgaans uitgedrukt als mijten per 100 bijen — geeft aan of het infestatiepeil van de kolonie onder, op of boven de behandelingsdrempel ligt. Verschillende regio's hanteren verschillende drempelwaarden, verschillende goedgekeurde bemonsteringsmethoden en verschillende aanbevolen behandelingstijdvensters. Controleer altijd de actuele normen bij uw plaatselijke imkervereniging of de bevoegde regelgevende instantie.



Alcoholwassmethode

Een zeer nauwkeurige methode waarbij een bijenmonstert wordt ondergedompeld in alcohol om mijten te scheiden en te tellen. De bijen overleven deze test niet. Er worden ongeveer 300 bijen (ongeveer een halve cup) uit het broednest gebruikt. Volg de aanwijzingen van uw plaatselijke vereniging voor het exacte protocol en de berekeningen.

Poedersuikermethode

Een zachtere methode waarbij de bijen worden bedekt met poedersuiker om de mijten te scheiden, waarna deze worden geteld. De bijen overleven en kunnen worden teruggeplaatst in de kast. Iets minder nauwkeurig dan de alcoholwas, maar aanvaardbaar voor routinematige monitoring en gemakkelijker voor beginners.

Natuurlijke val (plakbodem)

Een plakplaat onder de gaasbodem telt mijten die gedurende 24–72 uur van nature vallen. Nuttig voor het volgen van trends in de tijd. Minder nauwkeurig voor het bepalen van het werkelijke infestatiepeil dan wasmethoden, maar vereist geen bemonstering van bijen.



De frequentie van monitoring is belangrijk. Monitor minstens één keer per maand tijdens het actieve seizoen en vaker als het mijtenpeil hoog is. Één laag resultaat aan het begin van het seizoen betekent niet dat de kast de rest van het jaar veilig is.

Basisprincipes van besluitvorming over varroabehandeling

De beslissing of u varroaziekte behandelt — en hoe — behoort tot de belangrijkste beslissingen die u als imker zult nemen. Behandelingsbeslissingen moeten altijd gebaseerd zijn op werkelijke telgegevens van mijten, niet op intuïtie of een kalenderdatum. Rekening moet worden gehouden met lokale wettelijke vereisten, lijsten van goedgekeurde middelen, etikettinstructies, het huidige seizoen en de aanwezigheid van honingsupers op de kast.

Deze gids zal geen specifieke behandelmethoden, doseringen of productnamen aanbevelen. Behandelprotocollen verschillen per land, regio en seizoen. Sommige behandelmethoden zijn niet legaal of goedgekeurd in alle rechtsgebieden. Sommige zijn niet veilig in aanwezigheid van honingsupers. De juiste behandeling voor uw kast is degene die is goedgekeurd in uw regio, correct toegepast, op het juiste moment, met gedocumenteerde mijtentelling die het gebruik ervan rechtvaardigt.

Stap 1: Bewaak het mijtenniveau

Gebruik een goedgekeurde methode (alcoholwassing, besuikeren of plakplaat). Bereken het aantal mijten per 100 bijen. Noteer het resultaat samen met de datum en methode in uw inspectiedagboek.

Stap 2: Vergelijk met de lokale drempelwaarde

Vraag uw lokale imkervereniging of adviesdiensten wat de huidige interventiedrempel in uw regio en in het huidige seizoen is. Drempelwaarden verschillen — wat in de ene regio behandeling vereist, hoeft dat in een andere regio niet.

Stap 3: Kies een goedgekeurde behandeling

Gebruik uitsluitend behandelmethoden die wettelijk zijn goedgekeurd in uw land of regio en geregistreerd zijn voor gebruik in bijenkasten. Lees de etikettinstructies en volg deze op. Overschrijd nooit de aanbevolen dosering.

Stap 4: Documenteer alles

Noteer het gebruikte middel, de datum van toepassing, de dosering, het mijtenaantal vóór de behandeling en het resultaat van de controletelling uitgevoerd 4–6 weken na de behandeling. Goede registraties beschermen u en helpen u betere beslissingen te nemen in de volgende seizoenen.

- ❌ Pas nooit behandelingen toe die op internet zijn gevonden en niet zijn goedgekeurd in uw rechtsgebied. Dien nooit behandelingsmiddelen toe als er honingsupers op de kast zitten, tenzij het etiket dit uitdrukkelijk toestaat. Raadpleeg bij twijfel de lokale bijenteeltautoriteit.

Waarschuwingssignalen van broedziekten

Broedziekten kunnen variëren van licht verontrustend tot meldingsplichtig, afhankelijk van het type ziekte en de voorschriften in uw land. Als imker in het eerste jaar is uw belangrijkste rol niet het zelfstandig diagnosticeren van broedziekten — maar het herkennen van waarschuwingssignalen, het documenteren ervan met foto's en het onmiddellijk contacteren van de plaatselijke bijenteeltinspecteur, mentor of vereniging. Sommige ziekten, zoals het Amerikaans vuilbroed, zijn meldingsplichtig in de meeste landen en vereisen officiële interventieprotocollen.

Waarschuwingssignaal	Mogelijke ziekte	Actie
Ingezonken, verkleurde of geperforeerde deksels	Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed	Fotografeer en neem onmiddellijk contact op met de plaatselijke inspecteur. Manipuleer de kast verder niet.
Sterke, rottende, onaangename geur uit de kast	Amerikaans vuilbroed (kenmerkende geur van rottend touw)	Verplaats geen materiaal. Neem dezelfde dag nog contact op met de officiële inspecteur.
Draadvorming bij het doorprikken van een deksel met een lucifer	Amerikaans vuilbroed (rubberachtige, elastische draad bij het uittrekken van de lucifer)	Klassieke test voor Amerikaans vuilbroed. Als de draadvorming wordt bevestigd, behandel dit als een meldingsplichtige ziekte — neem contact op met de bevoegde autoriteiten.
Gekromde, geelachtige of gesmolten larven	Europees vuilbroed, zakbroedvirus	Fotografeer en raadpleeg een mentor of inspecteur. Kan verband houden met stress of ziekte.
Harde, witte, krijtachtige larvenresten in cellen	Kalkbroed (<i>Ascosphaera apis</i>)	Verdwijnt vaak spontaan bij sterke volken. Blijf monitoren, verbeter de ventilatie, raadpleeg een mentor.
Onregelmatig broed met gemummificeerde resten	Zakbroedvirus, varroagerelateerde ziekten, kalkbroed	Neem indien mogelijk een monster in een afgesloten zakje. Neem contact op met de plaatselijke inspecteur of mentor.



Verplaats nooit ramen of materiaal van een vermoedelijk zieke kast naar een andere kast of locatie voordat u een officiële inspecteur heeft geraadpleegd. Sommige broedziekten verspreiden zich via besmet materiaal en zijn wettelijk gereguleerd.

Wasmot en Kleine Kastkever

De wasmot en de kleine kastkever (SHB) zijn twee secundaire plaagdieren die zwakke of onbeschermde bijenvolken uitbuiten. Beide zijn opportunisten — een sterk, goed bezet volk kan zich effectief verweren tegen beide. De beste bescherming is de sterkte van het volk. De druk van plaagdieren is evenzeer een symptoom als een oorzaak van problemen.

Wasmot

De grote wasmot (*Galleria mellonella*) en de kleine wasmot leggen eieren in spleten van de kast. Larven boren tunnels door de raten en laten zijden draden en uitwerpselen achter. Ze kunnen opgeslagen materiaal en zwakke volken snel vernietigen. Een sterk volk met voldoende bezetting, dat alle ramen kan bedekken, verwijdert de motlarven voordat ze zich vestigen. Sla losse ramen op zodat motten er geen toegang toe hebben — dicht gestapeld, in afgesloten verpakking of kort ingevroren om de eieren te vernietigen.

Symptomen: Zijden draden op ramen, doorgeknaagde raten, zichtbare larven op ramen, onaangename geur, bijen die de raten verlaten.

Kleine Kastkever

De kleine kastkever is een ernstige plaag in warmere en vochtiger gebieden, maar komt niet overal voor. Volwassen kevers leggen eieren in spleten of rechtstreeks in de kast; larven boren tunnels door de raten en vernietigen honing, stuifmeel en broed. Dit veroorzaakt fermentatie en een karakteristiek slijm dat de honingvoorraden snel bederft. Een sterk volk houdt de kevers in de hoeken van de kast, waar wachtersbijen ze kunnen controleren. De kever wordt een ernstig probleem in zwakke volken.

Symptomen: Kleine donkergekleurde kevertjes (5–7 mm) die wegvlugten voor het licht bij het openen van de kast, slijmerige honing, gegiste of zuur ruikende ramen, zichtbare larven in de raten.

📄 Vraag bij de plaatselijke bijenteeltvereniging of de kleine kastkever aanwezig is in uw regio en welke bestrijdingsmethoden beschikbaar zijn.

Mieren, wespen, hoornaars en muizen

Naast mijten en ernstige ziekten krijgen imkers in het eerste jaar te maken met een aantal lastige plaagdieren waartegen eenvoudige preventieve maatregelen helpen. Geen van deze plaagdieren is zo gevaarlijk als Varroa of broedziekten voor een sterk volk, maar ze kunnen kwetsbare volken verzwakken en aanzienlijke schade veroorzaken als ze onbeheerd worden gelaten.



Mieren

Mieren zijn op zoek naar honingvoorraden en eiwitten. Voorkom toegang tot de kast door een plakkerige barrière op de poten van de standaard aan te brengen of door bakjes met water te gebruiken. Maai het gras onder de kast. Mieren dringen zelden door in een sterk volk, maar vormen een overlast voor zwakkere kasten en opgeslagen materiaal.



Wespen en hoornaars

Wespen stelen nectar en jagen op individuele werksters, vooral tijdens perioden zonder dracht. Verklein de vliegspleet tot een breedte die de bijen effectief kunnen verdedigen. Sterke volken zijn in staat een smalle vliegspleet te verdedigen. Verwijder wespennesten in de omgeving van de bijenstand als ze een ernstige bedreiging vormen.



Muizen

In gebieden met koude winters zoeken muizen beschutting in bijenkasten. Ze kunnen raten beschadigen, de kast verontreinigen met urine en uitwerpselen en bijen ertoe aanzetten bepaalde delen van de kast te verlaten. Muizenbescherming — een metalen strip bij de vliegspleet met openingen die groot genoeg zijn voor bijen maar te klein voor muizen — voorkomt binnendringing. Monteer deze voordat het volk zich terugtrekt in de wintertros.



Vogels en grotere predatoren

Spechten kunnen kasten beschadigen tijdens het zoeken naar larven in de koudere maanden. In sommige gebieden worden kasten lastiggevalen door beren, stinkdieren of andere zoogdieren. Als grote predatoren een lokale bedreiging vormen, kunnen verhoogde standaards, elektrische afrastering of bevestigingsriem en een geschikte oplossing zijn — vraag lokale imkers welke beschermende maatregelen in uw regio gebruikelijk zijn.

Beoordeling van de Bijenvolk Sterkte in het Midden van het Seizoen

Ongeveer halverwege het actieve seizoen is het tijd om een grondige beoordeling van het bijenvolk uit te voeren. Dit is geen routinematige inspectie — het is een doordachte synthese van de toestand van de kolonie, waarbij de algehele gezondheid, de ontwikkelingstrend en de gereedheid voor de tweede helft van het seizoen worden geanalyseerd. Noteer alles nauwkeurig. Deze beoordeling vormt de basis voor beslissingen over de voorbereidingen aan het einde van het seizoen.




Raten met Bijen

Een volledig sterk bijenvolk midden in het seizoen zou 8 of meer raten in de onderste bak moeten bezetten. Minder dan dit aantal wijst erop dat het volk achterblijft in ontwikkeling.



Raten met Broed

Minimaal 5 raten met gedekt werksterbroed wijst op een productieve koningin met een goede legintensiteit. Tel specifiek de raten met gedekt broed.



Raten met Honing

Minimaal 3 raten met gedekte of verwerkte honing in de broedkamer geeft aan dat het volk voorraden opbouwt. Hoe meer, hoe beter aan het einde van het seizoen.

Controlepunt	Status	Opmerkingen
Tekenen van koningin (eieren, jonge larven)	✓ / ⚠ / ✗	Datum laatste bevestiging:
Kwaliteit van de broedverdeling	Compact / Onregelmatig / Zorgwekkend	Foto's gemaakt?
Populatiegrootte	Sterk / Gemiddeld / Zwak	Raten met bijen: ____
Voedselvoorraden	Ruim / Voldoende / Laag	Raten met honing: ____
Beschikbare ruimte	Voldoende / Krap / Vereist extra bak	Genomen maatregelen:
Varroa-mijttelling	Onder drempel / Op drempel / Boven drempel	Datum telling: ____
Karakter van het volk	Rustig / Licht verdedigend / Agressief	Opmerkingen:
Oogstpotentieel	Honing bak vult zich / Gemiddeld / Geen	Waarschijnlijke oogst?

Beslissing over de Honingoogst

De vraag over het oogsten van honing is een van de moeilijkste emotionele beslissingen waarmee een beginnende imker in het eerste jaar wordt geconfronteerd. Elke imker verlangt naar honing — het is het tastbare symbool van de bijenteelt, een product dat betekenis en realiteit geeft aan de geleverde inspanning. Toch kan te vroeg oogsten of te veel honing oogsten de kolonie werkelijk schaden of zelfs doden. Deze beslissing vereist eerlijkheid, geen optimisme.

Het basisprincipe is eenvoudig: **je oogst alleen wat de kolonie niet nodig heeft voor haar eigen overleving**. In de praktijk betekent dit dat het nest volledig voorzien moet zijn van voldoende honing om de kolonie door het komende zware seizoen te dragen, voordat enige honing uit de bovenste bakken als de jouwe kan worden beschouwd. Elke druppel uit het nest is van de bijen. Honing in de voor oogst bestemde bovenbak, boven een vol nest, die goed verzegeld is — alleen dat is echte overschot.

Oogsten Kan Mogelijk Zijn, Als...

- Het nest goed voorzien is van meer dan 13–15 kg verzegelde honing of zoveel als uw lokale mentor aanbeveelt als wintervoorraden
- De bovenbak voor minstens 80% correct verzegeld is met goed gedroogde honing
- De kolonie op volle sterkte is met een gezonde koningin
- U ruim op tijd bent vóór het einde van het actieve seizoen, zodat er tijd is om de voorraden aan te vullen
- Uw lokale mentor bevestigt dat de omstandigheden de oogst toelaten

Oogst de Honing Niet, Als...

- De voorraden in het nest er laag of matig uitzien
- De honing in de bovenbak grotendeels onverzegeld is (nog niet gedroogd)
- De kolonie zwak is, koninginnenproblemen heeft of hoge Varroamijt-aantallen
- Het zware seizoen binnen enkele weken begint
- De kast niet door een mentor is beoordeeld



Bij twijfel, laat de honing aan de bijen. Ze hebben er harder aan gewerkt dan u en hebben het meer nodig.

Is de honing klaar?

Honing die niet goed is ingedroogd en verzegeld, heeft een hoger vochtgehalte dan rijpe honing. Honing met een hoog vochtgehalte fermenteert na de oogst in de pot — het borrelt, verzuurt en wordt onbruikbaar. Het oogsten van honing uit onverzegelde of gedeeltelijk verzegelde raten is een van de meest voorkomende fouten van imkers in hun eerste jaar, die volledig te voorkomen zijn met geduld en een eenvoudige veldtest.

1 De verzamelingsregel

De eenvoudigste en meest betrouwbare indicator: oogst alleen raten waarbij minstens 80–90% van de cellen bedekt zijn met witte of crèmekleurige waskapjes. Een volledig verzegelde raat bevat ingedroogde, geconcentreerde en houdbare honing. Bij een lagere mate van afdekking bestaat het risico op fermentatie na de oogst.

2 De schudtest

Houd de raat horizontaal boven de open kast en schud er krachtig maar voorzichtig mee. Als er nectar uit de open cellen loopt, is het vochtgehalte te hoog — de bijen hebben het nog niet voldoende kunnen concentreren. Als er niets uit de open cellen loopt (en de verzegelde cellen stevig blijven), is de honing in de verzegelde cellen klaar.

3 De refractometeroptie

Een refractometer meet het vochtgehalte van geëxtraheerde honing. Honing met een vochtgehalte onder de 18,5% wordt beschouwd als veilig voor langdurige opslag. Honing met meer dan 20% vocht zal fermenteren. Een eenvoudige refractometer is een goedkoop instrument dat de moeite waard is om in te investeren als u van plan bent honing te oogsten en te verkopen of weg te geven.

4 Geduld is essentieel

Als uw honingkamer slechts voor 60–70% verzegeld is, wacht dan nog twee tot drie weken en controleer opnieuw. De bijen zullen de resterende cellen verzegelen naarmate de honing rijpt. Het oogsten van een gedeeltelijk verzegelde honingkamer levert honing van mindere kwaliteit op en kweekt ongeduld — een gewoonte die het imkeren in elk volgend seizoen schaadt.

Verwachtingen Vóór de Eerste Oogst

Eerlijke verwachtingen stellen vóór de eerste oogst helpt veel teleurstellingen te voorkomen. De realiteit is: sommige kolonies produceren in het eerste jaar daadwerkelijk een overschot aan honing om te oogsten. Veel kolonies doen dat echter niet. Beide uitkomsten zijn normaal en correct. Het verschil zit in de installatietijd van het volk, de lokale nectarbeschikbaarheid, de sterkte van de kolonie, de weersomstandigheden en de gezondheid van de koningin — factoren die extreem variabel zijn en die zelfs de meest zorgvuldige beginnende imker niet kan beïnvloeden.

Een pakket dat laat geïnstalleerd werd in een nectaararme omgeving en dat in het eerste jaar te kampen had met Varroa-mijt, hoeft geen enkel honingoverschot te produceren — en dat is een positief resultaat, als de kolonie het tweede seizoen levend, gezond en sterk ingaat. Een zwerm die vroeg in het voorjaar geïnstalleerd werd in een nectarrijke omgeving, onder uitstekende weersomstandigheden, kan in het eerste jaar een flinke hoeveelheid honing produceren. Beide imkers kunnen alles goed doen.

Best Case: Honingoverschot

Een sterk, goed ontwikkeld volk, vroeg geïnstalleerd vanuit een zwerm in een nectarrijke omgeving, kan een gedeeltelijk of volledig gevulde honingkamer produceren om te oogsten. Verheug je daarover — maar zorg er vóór je een raam meeneemt voor dat de voorraden in de broedkamer voldoende zijn.

Typisch Geval: Bescheiden Overschot

Een volk dat zich goed ontwikkelde, maar enkele moeilijkheden ondervond, kan 2–4 ramen met overschothoning produceren. Oogst ze voorzichtig, laat de broedkamer onaangeroerd en beschouw dit jaar als een succes.

Geen Overschot Dit Jaar

Veel eerstejaarsvolken verbruiken alle verzamelde honing voor de wintervoorraden. Dit is geen mislukking — het is een succes. Een volk dat het eerste jaar overleeft en het tweede seizoen ingaat met solide voorraden en een grote populatie, beloont je volledig in de volgende seizoenen.

 **Onthoud:** Elk potje honing geoogst van een bloeiend en goed verzorgd volk bewijst echte vaardigheden en kennis. Het tweede jaar is vaak het begin van de echte oogsten. Bescherm je investering uit het eerste jaar.

Basisgereedschap voor Honingsoogst

Voor een imker die in het eerste jaar een klein aantal ramen oogst, is duur industrieel materiaal niet nodig. De belangrijkste vereiste is netheid. Elk oppervlak dat in contact komt met honing moet geschikt zijn voor levensmiddelen, volkomen schoon en vrij van verontreinigingen. Honing is een hoogwaardig voedingsproduct — behandel het met dezelfde hygiënische zorgvuldigheid die u in de keuken hanteert.



Honingslinger (Extractor)

Een extractor gebruikt centrifugaalkracht om honing uit ontverzegelde ramen te halen. Handmatige extractors (met zwengel) zijn voldoende voor 2–4 ramen. Elektrische modellen zijn sneller voor grotere oogsten. Veel lokale imkerverenigingen lenen extractors uit aan hun leden — informeer daarnaar voordat u er zelf een koopt.



Ontverzegeld mes

Een elektrisch ontverzegeld mes of een koud gekarteld mes snijdt of schraapt de washoedjes van de honingraten voor de extractie. Een eenvoudige ontverzegeld vork werkt uitstekend voor kleine oogsten en beginnende imkers.



Zeef en Bezinkingsemmer

Honing uit de extractor bevat wasdeeltjes en luchtbellens. Een dubbele, levensmiddelengeschiedte zeef verwijderet het was. Een bezinkingsemmer (of een emmer met kraantje) laat de honing 24–48 uur rusten, zodat resterende onzuiverheden en schuim naar het oppervlak stijgen voordat u de potten vult.




Potten en Etiketten

Gebruik glazen of kunststoffen potten die zijn goedgekeurd voor levensmiddelen, met goed sluitende deksels. Was en droog ze grondig voor het vullen. Vermeld de oogstdatum, uw naam en alle lokaal vereiste informatie als u de honing wilt delen of verkopen.

- ❑ Voor zeer kleine oogsten (1–2 ramen) is de methode van „kneden en zeven” — waarbij de raten uit de ramen worden gesneden, met de hand gekneed en door een zeef worden gezeefd — geheel zonder mechanisch materiaal uitvoerbaar. Het is een trage maar eenvoudige en doeltreffende methode voor kleine oogsten in het eerste jaar.

Overzicht van de Oogstdag

De oogstdag is een van de meest bevredigende dagen in het jaar van een imker — maar hij vereist planning, hygiëne en aandacht voor de behoeften van de bijen, zelfs als u zich op de honing concentreert. Een goed georganiseerde oogstdag beschermt de kwaliteit van het product, minimaliseert verstoring van het bijenvolk en voorkomt roverij, wat een ernstig probleem kan worden wanneer honing buiten de kast wordt blootgesteld.



Werken met Bijen Tijdens de Oogst

Laat ramen met honing nooit langer dan een paar minuten buiten de kast staan. Gebruik een afgedekte bak of afgesloten kist om ramen van de kast naar de extractielocatie te vervoeren. Voer alle werkzaamheden buiten snel uit en verklein de vliegopening van de kast direct na het verwijderen van de ramen, zodat er geen roverij ontstaat terwijl u binnenshuis werkt.

Hygiëne op de Werkplek

Alle oppervlakken, gereedschappen en containers moeten geschikt zijn voor contact met levensmiddelen en goed schoongemaakt zijn. Vermijd houten oppervlakken die niet ontsmet kunnen worden. Was alles met heet water en zeep voor en na gebruik. Laat plakkerig materiaal niet buiten liggen — dit trekt bijen, wespen aan en kan binnen enkele minuten een roversituatie uitlokken.

Nazorg na de Oogst

Het werk stopt niet wanneer de honing in de pot zit. De uren en dagen direct na de oogst vormen een gevoelige periode voor uw bijenvolk. Het terugplaatsen van natte ramen, het beschermen van de kast tegen roverij en het beoordelen of het volk aanvullende voeding nodig heeft, zijn kritieke taken na de oogst die gepland moeten worden vóór de oogstdag — niet geïmproviseerd achteraf.

O1

Breng Natte Ramen Onmiddellijk Terug

Geslingerde ramen bevatten nog resterende honing en was, die de bijen grondig en efficiënt zullen schoonmaken. Breng de natte ramen op dezelfde dag als de oogst terug aan het volk, bij voorkeur 's avonds wanneer de vliegactiviteit laag is en het risico op roverij verminderd is. De bijen reinigen elke cel binnen 24–48 uur.

O3

Beoordeel de Voedselvoorraden

Voer binnen een week na de oogst een grondige controle uit van de voorraden in het broedlichaam. Ook als u voorzichtig bent geweest, verandert het verwijderen van de honingkamer de voedselsituatie van het volk. Als de voorraden lager lijken dan verwacht, begin dan nu met aanvullende voeding, nog vóór het begin van het moeilijke seizoen.

O2

Voorkom Roverij na de Oogst

De geur van vers geoogste honing en natte ramen is onweerstaanbaar voor bijen uit omliggende volken. Houd de ingang vernauwd gedurende de hele oogstdag en enkele dagen daarna. Laat nooit kleverig materiaal, honingdruppels of vrijelijk toegankelijk raat op enig moment buiten staan.

O4

Registreer Uw Oogst

Noteer het aantal geslingerde ramen, het totale gewicht van de geëxtraheerde honing, de datum en alle waarnemingen met betrekking tot de kwaliteit van de honing (kleur, geur, kristallisatie). Deze gegevens vormen waardevolle context voor het inschatten van het verwachte overschot in het tweede jaar en voor het verifiëren of de oogst correct is uitgevoerd.

Eindeseizoensbeoordeling

De eindeseizoensbeoordeling is een van de belangrijkste inspecties van het hele bijenjaar. Het laat zien of de kolonie klaar is om de komende zware periode te overleven. Kolonies die de winter ingaan met een zwakke populatie, een zieke koningin, onvoldoende voorraden of een hoog aantal Varroa-mijten, komen er zelden succesvol doorheen. Deze problemen nu ontdekken — terwijl u nog tijd heeft om ze op te lossen — is veel beter dan ze te ontdekken nadat de kolonie al is ingestort.

Deze inspectie moet grondig en zonder haast worden uitgevoerd. Reserveer meer tijd dan gewoonlijk, maak gedetailleerde aantekeningen en fotografeer alle zorgwekkende symptomen. Vragen die u moet beantwoorden: Is de koningin gezond en productief? Is de populatie van de kolonie voldoende om de temperatuur van de wintertros te handhaven? Zijn de voorraden toereikend voor de verwachte winterperiode? Is het Varroa-niveau op een aanvaardbaar niveau? Is de uitrusting in goede fysieke staat?



Conditie van de Koningin

Bevestig dat de koningin compact en gezond broed legt. Een koningin die verzwakt of onregelmatig broed legt in de late herfst, is mogelijk niet in staat de kolonie te leiden naar een krachtige herstart aan het begin van de lente. Dit is het kritieke moment om een zwakke koningin te vervangen, als de lokale omstandigheden dit nog toestaan.



Populatie

Een kolonie die de koude periode ingaat, heeft voldoende jonge bijen nodig om de temperatuur van de wintertros te handhaven en de populatie te herstellen na het hervatten van het seizoen. Tel de ramen met bijen en vergelijk met de lokale minimale aanbevelingen van uw lokale bijenteeltvereniging.



Voedselvoorraden

Til de kast op — die moet zwaar zijn. Controleer of er aan de randen van het broednest ramen zijn met verzegelde honing. Schat de totale voorraden in vergelijking met de minimale hoeveelheid die uw lokale mentor aanbeveelt voor de winterperiode in uw regio.



Varroa-niveau

Voer een mijttelling uit en vergelijk met de lokale risicodrempelwaarden. Als het mijtniveau de lokale behandelingsdrempel overschrijdt, is dit het kritieke venster om een behandeling uit te voeren — voordat de kolonie winterbijen heeft grootgebracht die gedurende de hele winterperiode schade door Varroa met zich meedragen.

Vorbereiding op het Zware Seizoen

Elke regio heeft zijn zware seizoen — een periode waarin bijen niet vrij kunnen vliegen, nectarbronnen onbereikbaar zijn en het volk uitsluitend moet leven van opgeslagen voorraden. In de meeste klimaten op het noordelijk halfrond is dat de winter. In sommige tropische gebieden is het het droge seizoen of het moessonseizoen. In bergachtige gebieden kan het eerder komen en langer duren dan in de naburige laagvlakten. Ongeacht de vorm die het zware seizoen in uw regio aanneemt, is het principe van voorbereiding universeel: alles wat gedaan moet worden, dient gedaan te worden *vóór* het begin van het zware seizoen — niet erna.



Isolatie en Windbescherming

In klimaten met temperaturen onder nul profiteren volken van isolatie die winterstress vermindert zonder vocht vast te houden. Wikkel of bedek de kast om de door wind veroorzaakte gevoelstemperatuur te verlagen, terwijl u voor voldoende ventilatie zorgt. Raadpleeg lokale imkers over de standaardpraktijk in uw klimaatgebied.



Beheer van de Vliegspleet

Verklein de vliegspleet tot de kleinste geschikte opening vóór het begin van het zware seizoen. Dit helpt de warmte in de kast te bewaren in koude regio's en vermindert het risico op roof, binnendringen van knaagdieren en tocht. In gebieden waar muizen voorkomen, monteert u een muizenwacht voordat de temperaturen dalen.



Noodtoegang tot Voedsel

In de winter kunnen in koude klimaten geen kwekers met vloeibare siroop worden gebruikt. Kandijnsuiker, fondantpasta of droge suiker die direct boven de tros worden geplaatst, bieden noodtoegang tot voedsel wanneer de tros zich niet naar de voorraden op de ramen kan verplaatsen. Vraag uw lokale mentor of het aanleggen van noodvoedselvoorraden standaardpraktijk is in uw regio.

Voedselvoorraden voor de Rustperiode

Voedselvoorraden zijn de belangrijkste variabele die de overleving van een bijenvolk tijdens de rustperiode bepaalt. Een volk met uitstekend varroabeheer, een gezonde koningin en een goede populatie zal toch sterven als het midden in een koude of droge periode zonder voedsel komt te zitten. Een goede voorbereiding van de voorraden vóór de rustperiode is niet optioneel — het is de belangrijkste materiële taak bij de voorbereiding op het einde van het seizoen.

De hoeveelheid voorraden die uw bijenvolk nodig heeft, hangt uitsluitend af van de lokale omstandigheden: hoe lang de rustperiode doorgaans duurt, hoe laag de temperaturen dalen (koudere clusters verbruiken meer energie), hoe groot de populatie van het volk is en of bijvoederen een standaardpraktijk is in uw regio. Uw lokale mentor kan u vertellen wat het minimale doel is voor een bijenvolk in uw specifieke gebied — dat getal is veel betrouwbaarder dan welke algemene aanbeveling uit een boek ook.

Beoordeling van de Huidige Voorraden

Til de kast licht op door hem aan de achterkant te kantelen — met ervaring leert u aanvoelen wat "zwaar genoeg" betekent. Een goed bevoorraadt volk dat klaar is voor de rust zal zichtbaar zwaarder zijn dan een volk met onvoldoende voorraden. Tel tijdens de inspectie de ramen met volledig verzegelde honing in het broednest en beoordeel op basis van lokale aanbevelingen of de hoeveelheid voldoende is.

- 📌 Vraag uw lokale mentor of imkervereniging specifiek: "Hoeveel kilogram voorraden heeft een bijenvolk nodig om de winter in onze regio te overleven?" Krijg een getal, niet alleen een algemene indruk.

Beslissing over Bijvoederen aan het Einde van het Seizoen

Als de voorraden onder het aanbevolen minimum liggen, kan aanvullend bijvoederen aan het einde van het seizoen deze aanvullen — maar de timing is cruciaal. Bijen hebben tijd nodig om vloeibare siroop te verwerken en te verzegelen voordat lage temperaturen dit proces onmogelijk maken. Voeren met dikke siroop (suiker en water in verhouding 2:1) aan het einde van het seizoen is in veel gebieden met een koud klimaat standaardpraktijk, omdat deze een hogere concentratie heeft en dichter bij honing ligt dan dunnere siropen. Stop met bijvoederen wanneer de temperaturen dalen tot onder het niveau waarop bijen de siroop effectief kunnen verwerken — lokale aanbevelingen stellen deze grens vast. Als de koude periode eerder komt dan u klaar bent met bijvoederen, kunnen droge suiker of een suikerbrood dat direct boven het cluster wordt geplaatst een noodoplossing zijn.

Vochtigheid, Ventilatie en Bescherming

Vochtigheid vormt in de meeste klimaatomstandigheden een grotere bedreiging voor overwinterende bijenvolken dan lage temperaturen. Bijen produceren warmte door de vorming van een wintertros en spiertrillingen, wat tegelijkertijd aanzienlijke hoeveelheden waterdamp genereert. In een slecht geventileerde kast condenseert deze damp op koude oppervlakken — met name op het binnenste deksel en het dak — en druppelt terug op de tros. Een natte en koude tros is veel kwetsbaarder voor verhongering, ziektes en sterfte dan een koude maar droge tros.

Het beheer van ventilatie is een kwestie van balans. Er is voldoende luchtcirculatie nodig om vochtige lucht uit de kast af te voeren, zonder dat er koude tocht ontstaat waartegen de tros zich niet kan verdedigen. Verschillende imkertradities in verschillende klimaten pakken dit probleem op uiteenlopende manieren aan — sommigen gebruiken ventilatieopeningen bovenin, anderen een gaasbodem en weer anderen plaatsen absorberende materialen boven de tros om vocht op te nemen. De juiste aanpak voor uw klimaat moet afkomstig zijn van lokale imkers die dit probleem in uw specifieke omgeving al meerdere seizoenen hebben opgelost.



Voorkom Druppelen

Zorg ervoor dat de kast licht naar voren helt, zodat condensatie die op het binnenste deksel ontstaat naar de voorrand afvloeit en naar buiten druppelt, in plaats van op de tros eronder te vallen. Controleer en bevestig deze helling nog voor de winter aanbreekt.



Voldoende Luchtcirculatie

Een vorm van bovenventilatie — een kleine opening bovenin de kast, een ingekeept binnenste deksel of een aparte bovenste vliegopening — maakt het mogelijk om met vocht verzadigde lucht af te voeren. De precieze configuratie hangt af van het type kast en de lokale gewoonten. Raadpleeg uw mentor over wat in uw regio de standaard is.



Windblootstelling

Een kast die volledig blootgesteld is aan de heersende winterwinden verliest veel meer warmte dan een beschermde kast. Als uw standplaats open is, overweeg dan een windscherm — een hek, haag, hooibalen of een vergelijkbare barrière aan de kant van de koude winden. Blokkeer de vliegopening niet en wikkel de kast niet zo strak in dat de luchtcirculatie volledig wordt geblokkeerd.



Integriteit van het Materiaal

Controleer alle bakken, deksels en bodems op scheuren, vervormingen of kieren die koude lucht doorlaten. Dicht alle verbindingen opnieuw af die losgeraakt zijn. Een kast die in de zomer stevig was, kan door temperatuurschommelingen gezakt of vervormd zijn. Een strakke en onbeschadigde kasconstructie is de eerste verdedigingslinie tegen kou en vochtigheid.



Sluit de kast nooit volledig af voor de winter. Vocht moet ergens kunnen ontsnappen. Het strak inpakken van een kast, al is het goedbedoeld, kan een omgeving met dodelijke vochtigheid creëren binnenin een verder volledig gezond bijenvolk.

Beheer van de Vliegspleet

De vliegspleet van de kast is een van de krachtigste beheerstools die u tot uw beschikking heeft, en verdient meer aandacht dan de meeste imkers in het eerste jaar eraan besteden. Gedurende het seizoen verandert de optimale configuratie van de vliegspleet samen met de sterkte van het volk, weersomstandigheden, plaagdruk en het tijdstip van het jaar. Één vaste instelling van de vliegspleet het hele jaar door is niet optimaal — actief beheer van de grootte van de vliegspleet is onderdeel van goede imkerpraktijk.

Bewoningsfase

Kleinste opening van de vliegspleet. Een nieuw volk is nog niet in staat een brede vliegspleet te verdedigen. Vermindert het risico op roverij en helpt de bijen de binnentemperatuur te handhaven tijdens de vestiging van de kolonie.

Hoogtepunt van het Seizoen

Vliegspleet volledig open voor maximaal vliegverkeer tijdens de belangrijkste drachtperiode. Een sterk volk op het hoogtepunt van het seizoen kan een volledig open vliegspleet verdedigen en profiteert van een onbeperkte verkeersstroom.

Rustig Seizoen

Kleinste opening. Installeer een muizenrooster als muizen plaatselijk een gevaar vormen. Zorg voor enige luchtstroom, maar minimaliseer koude tocht en het binnendringen van plagen. Controleer regelmatig of de vliegspleet niet verstopt is met dode bijen.

1

2

3

4

5

Vroege Groei

Vergroot geleidelijk naarmate de volkspopulatie groeit. Bijen kunnen een bredere opening verdedigen wanneer de arbeidskracht groot genoeg is. Houd pogingen tot roverij in de gaten voordat u verder vergroot.

Einde Seizoen / Dracht Neemt Af

Verklein de vliegspleet na het einde van de nectardracht. Het risico op roverij neemt toe in periodes zonder dracht. Een nauwe vliegspleet is veel gemakkelijker te verdedigen voor een kleinere herfstpopulatie.



Praktische tip: Een eenvoudige vliegspleetverkleiner — een houten lat of metalen plaatje op maat van de vliegspleet — is een van de goedkoopste en nuttigste imkerhulpmiddelen die u bezit. Houd hem bij de hand en gebruik hem actief gedurende het hele seizoen, in plaats van hem in de opslag te laten liggen.

Zorg in de Rustperiode of Winter

De rustperiode vereist een fundamentele verandering in de rol van de imker. In het actieve seizoen ligt jouw waarde in observatie, inspecties en snelle reactie. In de rustperiode — of dat nu een bevroren winter betekent, een droge periode met minimale vluchten of een andere langdurige periode van verminderde activiteit — ligt jouw waarde in *terughoudendheid*. De bijen hebben jouw inspecties niet nodig. Ze hebben nodig dat je ze met rust laat, ze van buitenaf observeert, ervoor zorgt dat de voedselvoorraden onaangeroerd zijn, en de sterke verleiding weerstaat om de kast elke warmere dag te openen.

Onnodige inspecties in de koude periode zijn werkelijk schadelijk. Het openen van de kast bij lage temperaturen verbreekt de tros, zorgt ervoor dat bijen de vrieskou in vliegen en niet overleven, laat koude lucht de broedzone binnen en verstoort de zorgvuldig gehandhaafde binnenomgeving die de tros met enorme energiekosten in stand hield. Als je geen concrete en dringende reden hebt — bijvoorbeeld tekenen van verhongering of schade door roofdieren — houd de kast dan gesloten en observeer in de koudste periode uitsluitend van buitenaf.

Externe Controles: Wat te Observeren

- Tijdens mildere dagen (boven 10–12 °C in koude klimaten) let op reinigingsvluchten — bijen die kort uitvliegen om te defeceren, wat gezond en normaal is
- Controleer of de vliegopening niet geblokkeerd is door opgehoopte dode bijen die de luchtcirculatie belemmeren
- Zoek naar sporen van schade door roofdieren — bekrast hout, omgevallen kast, verstoorde vliegopening
- Observeer of de kast tekenen van leven vertoont en geluiden maakt wanneer je op een koude en stille dag voorzichtig je oor tegen de wand legt — een gezonde tros geeft bij lichte verstoring een zacht gezoem af

Voedselvoorraden Monitoren zonder de Kast te Openen

Het regelmatig wegen van de kast tijdens de rustperiode maakt het mogelijk te beoordelen of de kolonie voorraden verbruikt in het verwachte tempo. Als de kast merkbaar lichter begint te worden tussen controles — met name aan het einde van een lange winterperiode — kunnen de voorraden van de kolonie opraken. In dat geval kan noodvoeding met kandijplaten of droge suiker die direct boven de tros wordt geplaatst (zonder de kast volledig te openen in de koude lucht) passend zijn. Raadpleeg een mentor voor je dit voor het eerst probeert.

Plannen tijdens de Wachttijd

De rustperiode is de beste gelegenheid om inspectiedagboeken door te nemen, notities van het eerste jaar te bestuderen, fouten en verbetermogelijkheden te identificeren, nieuw materiaal te bestellen en contact te leggen met de lokale bijenteeltgemeenschap. Lees, leer en bereid je voor — zodat wanneer de eerste warme dagen van het nieuwe seizoen aanbreken en de kolonie haar herstart begint, jij klaar bent om te handelen met de volledige competentie van een imker die de winter wijs heeft doorgebracht.

Probleemoplossingstabel

Gebruik deze tabel als snelle gids wanneer je tijdens een inspectie of bij het observeren van de vliegkol iets onverwachts opmerkt. Onthoud: de tabel helpt je te identificeren wat verder onderzocht moet worden — het vervangt geen overleg met een mentor of herhaalde inspectie bij ernstige problemen. Noteer altijd je observaties in het dagboek voordat je actie onderneemt.

Waargenomen symptoom	Mogelijke oorzaken	Aanbevolen volgende stap
Geen eieren of broed; bijen onrustig	Moerloos volk, koningin onlangs verloren of dood	Wacht 5–7 dagen en controleer opnieuw zorgvuldig. Zoek naar noodmoerdoppen. Neem contact op met mentor als de situatie niet verbetert.
Onregelmatig, verspreid broedpatroon	Verzwakte koningin, schade door Varroa-mijten, broedziekte, hygiënisch gedrag	Maak foto's en overleg met mentor. Voer een mijttelling uit. Onderneem geen actie op basis van één enkele inspectie.
Rottingsgeur uit de kast	Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed of dood broed	Verplaats geen materiaal. Neem onmiddellijk contact op met de plaatselijke bijenteeltinspecteur of bevoegde autoriteit.
Bijen met misvormde of ontbrekende vleugels	Vleugelmisvorming virus veroorzaakt door hoge Varroa-belasting	Voer zo snel mogelijk een mijttelling uit. Als de drempelwaarde wordt overschreden, pas direct een goedgekeurde behandelmethode toe.
Zeer weinig bijen, terwijl de populatie recent goed was	Zwermen, instorting van het volk, ziekte, honger, blootstelling aan pesticiden	Inspecteer grondig. Controleer de aanwezigheid van de koningin, eieren en voedselvoorraden. Neem dezelfde dag nog contact op met mentor.
Wasnetten en tunnels in de raten	Aantasting door wasmotlarven	Verwijder aangetaste raten. Versterk het volk. Beperk de ruimte tot wat de bijen kunnen bedekken. Verbeter de ventilatie.
Kleine donkere kevertjes die van het licht wegvlugten	Kleine kastkever (als die in jouw regio voorkomt)	Versterk het volk. Beperk de ruimte. Vraag mentor naar goedgekeurde plaatselijke bestrijdingsmethoden.
Gevechten bij de vliegkol, stapels dode bijen	Actieve roverij door naburige volken of wespen	Verklein de vliegkol onmiddellijk. Bedek de kast tijdelijk. Verwijder blootgestelde voederbakken of honingbronnen.
Zeer agressief volk zonder duidelijke reden	Ontbrekende koningin, slechte genetica, weer, verstoring, gebrek aan drachtaanbod	Noteer de weersomstandigheden. Inspecteer na enkele rustige dagen. Controleer de aanwezigheid van de koningin en broedkenmerken.
Bijen nemen geen suikerstroop uit de voederbak	Actieve nectardracht, verkeerde stroopmengverhouding, slecht geplaatste voederbak	Controleer de plaatselijke drachtomstandigheden. Pas de stroop concentratie aan. Zorg dat de voederbak toegankelijk is voor de tros.
Kast zeer licht in de koude periode	Uitgeputte voorraden, hongerrisico	Voeg onmiddellijk noodfondant of suikerdeeg toe, direct boven de tros. Overleg met mentor.
Witte, droge, krijtachtige kluiten in cellen of op de bodem	Schimmelziekte – kalkbroed (chalkbrood)	Verbeter de ventilatie en verlaag de luchtvochtigheid. Monitor gedurende 2–3 inspecties. Neem contact op met mentor als het probleem aanhoudt.
Veel darrenbroed met weinig werksters	Leggende werksters of een darrenmoer	Neem contact op met een ervaren mentor voordat je actie onderneemt — deze situatie vereist zorgvuldige diagnose.
Bijen die een tros vormen aan de buitenkant van de kast bij warm weer	Baarden (normaal bij hitte), overbevolking, slechte ventilatie	Controleer op overbevolking — voeg indien nodig ruimte toe. Zorg voor ventilatie. Normaal gedrag op hete dagen.

15 Fouten in het Eerste Jaar Die Je Moet Vermijden

Elke ervaren imker heeft de meeste van deze fouten minstens één keer gemaakt. Het verschil tussen een succesvol en een moeilijk eerste jaar zit er vaak in dat je deze lijst kent voordat er iets misgaat. Lees aandachtig, en als sommige situaties je bekend voorkomen — dat is geen reden voor schaamte, maar een reden om je gewoonten nu te veranderen, voordat het te laat is.

- 1 Geen Aantekeningen Bijhouden**

Geheugen is geen beheersysteem voor een bijenkast. Zonder schriftelijke notities kun je geen veranderingen bijhouden, patronen herkennen of onthouden wat je hebt gedaan en wanneer. Begin vanaf de eerste dag een inspectiedagboek bij te houden en gebruik het elke keer.
- 2 Varroa-mijten Negeren**

De meest voorkomende oorzaak van het verlies van een bijenvolk in het eerste jaar. Varroa vermenigvuldigt zich stilletjes en exponentieel. Controleer met tellingen, niet met schattingen. Een volk dat er gezond uitziet, kan zo'n mijtniveau hebben dat het zonder behandeling binnen enkele weken instort.
- 3 Te Frequente Inspecties**

Inspecties elke twee of drie dagen, gedreven door angst, verstoren de ontwikkeling van het volk, stressen de bijen en verspillen onnodige tijd. Eens per tien tot veertien dagen is in normale perioden voldoende. Vertrouw op de bijen.
- 4 Te Vroeg of Overmatig Honing Oogsten**

Honing oogsten voordat het volk een werkelijk overschot heeft, of honing wegnemen die de bijen nodig hebben voor de winter, is een van de betrouwbaarste manieren om het volk in het eerste jaar te verzwakken of te verliezen.
- 5 Te Vroeg Ruimte Toevoegen**

Een tweede broedbak op een volk van vier ramen verdeelt de warmte, vertraagt de broedontwikkeling en creëert ruimte voor plaagdieren. Wacht totdat het volk daadwerkelijk 7–8 ramen bedekt voordat je meer ruimte toevoegt.
- 6 Te Laat Ruimte Toevoegen**

De tegenovergestelde fout — een overvol volk in een overvolle broedbak zwelmt voordat je de waarschuwingssignalen opmerkt. Houd de raambezetting bij en voeg ruimte toe wanneer het volk werkelijk vol is, niet nadat het zwerf al is vertrokken.
- 7 Geen Hulp Vragen**

De imkersgemeenschap is genereus en ondersteunend. Lokale mentoren, verenigingen en ervaren burens zijn bijna altijd bereid beginners te helpen. Trots is de duurste uitgave in de imkerij. Vraag vroeg, vraag vaak.
- 8 Alle Koninginnencellen Vernietigen**

Het reflexmatig verwijderen van elke gevonden koninginnenbak kan het volk volledig zonder koningin achterlaten en zonder mogelijkheid tot herstel. Begrijp altijd waarom koninginnencellen aanwezig zijn voordat je besluit wat je ermee doet.
- 9 Inspecties bij Ongunstige Omstandigheden**

De kast openen op koude, winderige of regenachtige dagen koelt het broed af, irriteert de bijen en maakt nauwkeurige observatie vrijwel onmogelijk. Wacht op een zachte, rustige, zonnige dag — zelfs als dat betekent dat je nog een paar dagen extra wacht tussen inspecties.
- 10 Leeg Voederbakje**

Een leeg voederbakje in een periode waarin bijen afhankelijk zijn van bijvoeding is een langzaam opkomende crisis. Controleer en vul voederbakjes elke paar dagen bij tijdens actieve bijvoedingsperioden.
- 11 Geen Aandacht voor Gedragsveranderingen**

Een plotselinge gedragsverandering van rustig naar defensief is belangrijke informatie. Zonder aantekeningen kun je de trend niet waarnemen. Met aantekeningen kun je bepalen wanneer de verandering plaatsvond en wat deze mogelijk heeft veroorzaakt.
- 12 Eindeseizoen Beoordeling Overslaan**

De inspectie aan het einde van de zomer is waarschijnlijk de belangrijkste inspectie van het jaar. Een volk dat de winter ingaat met lage voorraden, een hoog Varroa-niveau of een verzwakte koningin overleeft zelden. Sla deze inspectie niet over.
- 13 Behandelen Zonder Monitoringgegevens**

Een Varroa-behandeling toepassen zonder vooraf mijten te tellen betekent gissen, wat overbodig, slecht getimed of onvoldoende effectief kan zijn. Monitor eerst, beslis dan op basis van echte gegevens en lokale drempelwaarden.
- 14 Materiaal in Slechte Staat Laten**

Gebroken kasten, gebroken ramen, verkeerd afgestelde deksels en roestige gereedschappen zijn niet alleen ergernissen — het zijn toegangspunten voor kou, plaagdieren en ziekten. Controleer en repareer al het materiaal voor en na elk seizoen.
- 15 Je Bijenkast Vergelijken met Internet-Perfectie**

Sociale media tonen prachtige, leerboekwaardige bijenvolken. Jouw volk is een levend organisme op een specifieke locatie, met een eigen karakter en uitdagingen. Meet je voortgang ten opzichte van je eigen beginpunt, niet ten opzichte van de beste momenten van anderen.

Volledige inspectielijst voor het eerste jaar

Druk deze checklist af of kopieer hem en neem hem mee naar elke inspectie, totdat de routine volledig automatisch is geworden. Een systematische controle van elk punt garandeert dat geen enkel belangrijk probleem over het hoofd wordt gezien. Vink elk punt aan na bevestiging, noteer eventuele afwijkingen en schrijf uw waarnemingen direct in het inspectieschrift vóór u de kast sluit.

✓	Controlepunt	Wat te noteren
☐	Vóór inspectie: zijn de weersomstandigheden geschikt?	Temperatuur: ____ Zonnig/Bewolkt/Winderig: ____
☐	Smoker aangestoken en produceert koele witte rook	Type brandstof: ____ Notities: ____
☐	Normale activiteit bij de vliegopening vóór het openen	Rustig / Defensief / Teken van roverij: ____
☐	Twee rookstoten bij de vliegopening, wacht 30 sec.	Reactie van het volk: ____
☐	Één tot twee rookstoten onder het dak vóór het openen	Reactie: ____
☐	Zijn eieren zichtbaar? (kleine witte rechtopstaande korreltjes in de cellen)	Ja / Nee — Raamnummer: ____
☐	Zijn jonge larven aanwezig? (parelmoerachtige C-vormen)	Ja / Nee — Uiterlijk: ____
☐	Patroon gesloten broed: compact of onregelmatig?	Aantal broedragen: ____ Patroon: ____
☐	Is de koningin gezien? (niet vereist als er eieren zijn gevonden)	Gezien / Niet gezien — Notities: ____
☐	Populatie: ramen bedekt met bijen?	Aantal bedekte ramen: ____
☐	Honingvoorraad: voldoende / laag / overvloedig?	Ramen met gesloten honing: ____ Stuifmeel aanwezig: J/N
☐	Beschikbare ruimte: lege cellen voor de koningin om te leggen?	Voldoende ruimte / Overvol — Benodigde actie: ____
☐	Zijn moerdoppen aanwezig?	Geen / Zwerm / Stille omwisseling / Nood — Locatie: ____
☐	Tekenen van plagen: Varroa, wasmot, kever?	Varroa zichtbaar: J/N Spinnenwebben mot: J/N Kevers: J/N
☐	Ongewone geur? Zuur / rottend / scherp?	Normaal / Ongewoon — Beschrijving: ____
☐	Ongewoon uiterlijk van het broed?	Normaal / Verontrustend — Foto gemaakt: J/N
☐	Temperament van het volk tijdens de inspectie	Rustig / Licht defensief / Agressief
☐	Toestand van de voerbak, indien in gebruik	Vol / Moet bijgevoerd worden / Verwijderd
☐	Actie ondernomen bij deze inspectie	Beschrijving: ____
☐	Volgende benodigde actie	Beschrijving: ____ Uiterlijk vóór: ____

✓ Een ingevulde checklist voor elke inspectie vormt de basis van goede imkerdocumentatie. Invullen duurt drie tot vijf minuten en bespaart u vele uren van giswerk later in het seizoen.

Flexibele Kalender van Seizoenstaken

Deze kalender is georganiseerd op basis van seizoensomstandigheden, niet op basis van vaste kalendermaanden. Vertaal deze fasen naar uw lokale kalender met hulp van ervaren imkers uit uw regio. Onthoud: uw lokale seizoen kan aanzienlijk afwijken van wat welk boek dan ook beschrijft, en lokale kennis heeft altijd voorrang.

Seizoensfase	Belangrijkste Taken	Waar Op Te Letten
Voorbereiding (Vóór aankomst bijen)	Bevestig de locatie van de kast, stabiliteit van de standaard, richting van de vliegopening. Bereid alle apparatuur voor. Zorg voor een waterbron. Neem contact op met een lokale mentor. Herzie het installatieplan.	Volledigheid van apparatuur, stabiliteit van de standaard, toegang tot water, bevestiging van hulpcontacten.
Installatie	Installeer het pakket of zwerm op de raten. Stel de vliegopening in op minimale grootte. Voeg een voederbak toe. Observeer van buiten de eerste 48 uur. Eerste opening van de kast op dag 5–7.	Activiteit bij de vliegopening, oriëntatievluchten, stuifmeel aanvoer, vrijlating van de koningin.
Vroege Ontwikkeling	Controleer elke 10–14 dagen. Bevestig dat de koningin legt. Monitor de raatbouw. Voer als lokale omstandigheden dat vereisen. Corrigeer gekromde raten in een vroeg stadium.	Aanwezigheid van eieren, broedpatroon, bevolkingsgroei, voedselvoorraden, kwaliteit van de raten.
Expansie	Voeg een tweede broedkamer of honingkamer toe wanneer 7–8 raten bedekt zijn met bijen. Blijf tekenen van zwermen monitoren. Voer een Varroa-telling uit. Vergroot de vliegopening met de groeiende populatie.	Overbevolking, moerdoppen, ruimte in het broednest, Varroa-niveau, veranderingen in temperament.
Hoofddracht	Beperk onnodige ingrepen. Controleer het vullen van honingkamers elke 2–3 weken. Zorg voor toegang tot water. Monitor het zwerminstinct. Verminder de controlefrequentie naar 14–21 dagen.	Vultempo van honingkamers, voortgang van het afdekken, aanwezigheid van moerdoppen, intensiteit van vliegverkeer.
Oogstbeslissing	Evalueer afgesloten honing correct. Bevestig dat de voorraden in de broedkamer vol zijn. Oogst alleen het overschot. Geef natte raten dezelfde dag terug. Controleer na de oogst op tekenen van roofgedrag.	Percentage afgedekte cellen, gewicht van de broedkamer, sterkte van het volk, tekenen van roofgedrag.
Einde Seizoen	Voer een volledige afsluiting van het seizoen uit. Behandel Varroa als het aantal mijten dat vereist. Vul de voedselvoorraden aan tot het lokale minimum. Vervang indien nodig een zwakke koningin. Verklein de vliegopening.	Kwaliteit van de koningin, Varroa-telling, gewicht van de voedselvoorraden, omvang van het volk, staat van de apparatuur.
Rustig Seizoen	Minimale verstoring. Externe controles elke 1–2 weken. Monitor het gewicht van de kast. Zorg dat de vliegopening vrij is. Geef noodvoeding als de voorraden bijna op zijn. Plan het volgende seizoen.	Gewichtstrend van de kast, blokkering van de vliegopening, reinigingsvluchten op warmere dagen, schade door predatoren.



Belangrijke herinnering: Deze kalender is slechts een oriënterend kader. De timing van elke fase is afhankelijk van het lokale klimaat, drachtplanten en regionale omstandigheden. Verifieer seizoensdata altijd bij uw lokale imkervereniging of een ervaren imker uit uw regio.

Samenvatting van het Eerste Jaar

Aan het einde van je eerste volledige jaar als imker — of dat nu wordt gemarkeerd door de komst van de koude periode, de eerste rustfase van de bijen of simpelweg twaalf maanden na de installatie van de kast — neem de tijd voor zorgvuldige reflectie. Je eerste jaar heeft een opmerkelijke hoeveelheid praktijkdata opgeleverd. Inspectiedagboeken, foto's, aantekeningen over wat je verwarrend, verrassend of verontrustend vond — dit alles vormt een schat aan persoonlijke kennis. Een imker die zijn eerste jaar serieus reflecteert, begint het tweede jaar met een aanzienlijk voordeel.

Gebruik de onderstaande reflectievragen als gestructureerde terugblik. Schrijf je antwoorden op — niet alleen in gedachten. Schrijven vereist helderheid en helpt vage indrukken om te zetten in concrete observaties. Deel je gedachten met je mentor als je er een hebt, en gebruik ze als basis voor je voorbereidingsplan voor het tweede jaar.

Wat Ging Goed?

- Welke elementen van jouw beheersroutine voelden comfortabel en efficiënt aan?
- Wat heb je geobserveerd dat bevestigde dat je op de goede weg was?
- Waren er momenten waarop jouw voorbereiding duidelijk resultaat opleverde?
- Welke gewoonten van dit jaar wil je rechtstreeks meenemen naar het tweede jaar?

Wat Was Moeilijk of Werkte Niet?

- Waar voelde je je het onzekerst of minst voorbereid?
- Waren er situaties waarbij je te laat, te vroeg of helemaal niet handelde?
- Had je problemen met de bijenfamilie — moeilijkheden met de koningin, plaagdruk, ziekteverschijnselen, honger?
- Wat zou je anders doen als je die momenten opnieuw kon beleven?

Wat Moet Worden Verbeterd?

- Welke imkersvaardigheden zijn het zwakst — het vinden van de koningin, broedbeoordeling, Varroa-monitoring?
- Zijn er gebieden waar je op aannames vertrouwde in plaats van op data?
- Heb je meer lokale begeleiding nodig, een cursus of ervaring in een andere bijenstal?
- Werkt jouw registratiesysteem, of heeft het een herziening nodig?

Wat Voorbereiden voor het Tweede Jaar?

- Welke uitrusting heeft reparatie, modernisering of vervanging nodig?
- Welke materialen moet je klaar hebben voor het begin van het nieuwe seizoen?
- Wat is jouw Varroa-beheersplan voor volgend jaar en wanneer begint het?
- Overweeg je een tweede kast? (Een tweede familie levert waardevolle vergelijkingsdata op.)

✓ **Een imker die het eerste jaar afsluit met een levende en gezonde bijenfamilie en een notitieboek vol eerlijke observaties, heeft al meer bereikt dan de meeste beginners. Het tweede jaar zal beter zijn — omdat je dit jaar aandachtig hebt geobserveerd.**

U Hebt Het Eerste Jaar Overleefd

Van Nerveuze Beginner tot Imker met Een Jaar Ervaring

Toen u voor het eerst deze routekaart ontving, bevond u zich waarschijnlijk ergens tussen enthousiasme en angst — misschien allebei tegelijk. De bijen zouden snel arriveren, de uitrusting was in elkaar gezet en de hoeveelheid informatie om te verwerken was overweldigend. Het eerste jaar imkeren vraagt meer van een nieuwe imker dan bijna elke andere leerervaringen: het daagt hem uit om geduldig te observeren, vastberaden te handelen, kalm te blijven in momenten van onzekerheid en zijn groeiend oordeel te vertrouwen — zelfs als u er nog niet zeker van bent of het juist is.

Als uw bijenvolk leeft, hebt u enorme reden tot trots. U hebt geleerd ramen te lezen. U hebt inspecties uitgevoerd zonder paniek. U hebt Varroa in de gaten gehouden. U hebt beslissingen genomen over voeding, ruimte in de kast beheerd, vliegactiviteit nauwlettend gevolgd — en het belangrijkste — u hebt om hulp gevraagd wanneer u die nodig had. Dit zijn geen kleine dingen. Dit is het fundament van een imkerpraktijk die een heel leven kan duren.

Als uw volk het niet heeft overleefd, bevindt u zich in het gezelschap van vele ervaren en getalenteerde imkers. Verliezen in het eerste jaar zijn gebruikelijk, achteraf vaak voorspelbaar en altijd leerzaam. Een imker die zijn eerste volk verliest en begrijpt waarom, is beter voorbereid op het tweede jaar dan degene die makkelijk succes had en nooit werd uitgedaagd. Analyseer uw aantekeningen eerlijk, zoek naar aanwijzingen en begin opnieuw met de kennis die alleen een veeleisend jaar kan geven.

Imkeren is geen doel. Het is een praktijk — voortdurend, bescheiden, eindeloos fascinerend — een gesprek met een van de meest opmerkelijke organismen in de natuur. Elk seizoen leert u iets wat het vorige niet kon. Het eerste jaar heeft u een fundament gegeven. Al het andere wordt hierop gebouwd.

Boek 1

Imkeren voor Beginners — Planning, uitrusting, typen kasten en alles wat u nodig had voordat uw bijen arriveerden.

Boek 2

Routekaart voor de Imker in het Eerste Jaar — Dit boek. Uw operationeel handboek voor inspecties, volksgezondheid, seizoensbeheer en het overleven van het eerste jaar.

Boek 3

Mede voor Beginners — Wanneer uw volk bloeit en u echte honingoverschotten heeft, leidt Boek 3 u door de kunst van het omzetten ervan in mede.

Bewaar uw aantekeningen. Vertrouw uw bijen. Vraag om hulp. Kom volgend seizoen terug klaar om het beter te doen.