| Study | logOR [95%CI] | P-value |
|---|---|---|
| Hartwig_Melanoma_PD-(L)1, n = 35 | −2.51 [−4.28; −0.74] | 0.01 |
| Fehrenbacher_Lung_PD-(L)1, n = 21 | −1.99 [−4.70; 0.73] | 0.15 |
| Damrauer_Bladder_PD-(L)1, n = 32 | −1.61 [−3.34; 0.12] | 0.07 |
| Rittmeyer_Lung_PD-(L)1, n = 97 | −0.99 [−1.93; −0.05] | 0.04 |
| Ravi_Lung_PD-(L)1, n = 56 | −0.47 [−1.36; 0.41] | 0.29 |
| Liu_Melanoma_PD-(L)1, n = 28 | 0.60 [−0.69; 1.90] | 0.36 |
| Mariathasan_Bladder_PD-(L)1, n = 25 | 0.77 [−0.84; 2.39] | 0.35 |
| Total | −0.73 [−1.57; 0.11] | |



−3 −2 −1 0 1 2 3
logOR estimate

Heterogeneity: $\chi_6^2 = 13.54$ ($P = .04$), $I^2 = 55.7\%$ [0.0%; 81.0%]
Test for overall effect: $z = −1.70$ ($P = .09$)