Probabilidad y variables aleatorias para ML con R y Python

Ricardo Alberich, Juan Gabriel Gomila y Arnau Mir2021-04-08

Probabilidad y variables aleatorias para ML con R y Python



R.Alberich, J.G.Gomila y Arnau Mir Curso online completo Disponible en Udemy https://tinyurl.com/ujr92xv 2

Índice general

Pi	rereq	uisitos: Teoría de conjuntos y combinatoria	,
	0.1.	Teoría de conjuntos	
		Combinatoria	
	0.3.	Para acabar	1
	0.4.	Otros aspectos a tener en cuenta	1
1.	Pro	babilidad	1'
	1.1.	Probabilidades Básicas	1
	1.2.	Probabilidad condicionada	2
	1.3.	Bayes	3
		Independencia de sucesos	
2	Var	iables Aleatorias	3
		Introducción a las variables aleatorias	
		Variables aleatorias discretas	
		Variables aleatorias continuas	
		Transformaciones de variables aleatorias	
		Desigualdades de Markov y de Chebychev	
		Cuantiles de variables aleatorias	
3	Dist	tribuciones Notables	6:
	3.1.	Distribuciones discretas	6
		Cuantiles de distribuciones notables discretas	
		Distribuciones continuas	
4	Var	iables Aleatorias. Complementos	4
••		Momentos de variables aleatorias	
		Asimetría de una variable aleatoria	
		Curtosis o apuntamiento de una variable aleatoria	
		Métodos de transformación	
		Fiabilidad	
		Generación de muestras de variables aleatorias por ordenador	
		Entronía 1	

Consulta el curso completo creado por Ricardo Alberich, Juan Gabriel Gomila y Arnau Mir solamente en Udemy.

Puedes consultar todas las transparecias del curso en formato HTML desde nuestro Gihub.io.

También tienes todas las distribuciones de probabilidad en nuestro Shiny interactivo.

Asienta las bases para convertirte en el Data Scientist del futuro con todo el contenido de probabilidad del curso. En particular verás los mismos contenidos que explicamos en primero de carrera a matemáticos, ingenieros, economistas, biólogos, médicos o informáticos.

- natematicos, ingenieros, economistas, biologos, m

 1. Probabilidad

 2. Variables aleatorias

 3. Distribuciones notables

 4. Complementos avanzados

 5. Variables bidimensionales

 6. Variables multidimensionales

 7. Convergencia y Teorema Central del límite

Y todo con más de 30 horas de vídeo a demanda, cientos de ejercicios, tareas, talleres y trucos de los profesores para que te conviertas en un experto de la materia.

İNDICE GENERAL

5.			16
	5.1.	Dos variables aleatorias	16
	5.2.	Función de distribución conjunta	16
	5.3.	Variables aleatorias bidimensionales discretas	17
	5.4.	Variables aleatorias bidimensionales continuas	17
	5.5.	Independencia de variables aleatorias	18
	5.6.	Momentos conjuntos y valores esperados conjuntos	19
	5.7.	Variables aleatorias condicionales y valor esperado condicional	20
	5.8.	Variables aleatorias definidas como función de dos variables aleatorias conjuntas $\ \ \dots \ \ $	21
6.	Vec	tores aleatorios	22
	6.1.	Varias variables aleatorias	22
	6.2.	Función de distribución conjunta	22
	6.3.	Variables aleatorias n-dimensionales discretas	23
	6.4.	Variables aleatorias n-dimensionales continuas	24
	6.5.	Independencia de variables aleatorias	24
		Momentos conjuntos y valores esperados conjuntos	
7.	Lev	de los grandes números y Teorema Central del Límite	26
		Muestras aleatorias simples	26
		Convergencia de sucesiones de variables aleatorias	
		Leyes de los grandes números	
		Teorema Central del Límite	
			-

ÍNDICE GENERAL

Prerequisitos: Teoría de conjuntos y combinatoria

Para aprender cálculo de probabilidades son necesarios conocimientos de

- Cálculo: derivadas, integrales, límites, sumas de series...
- 2. Geometría básica y Álgera Lineal : rectas, hiperplanos, volúmenes... Matrices, valores propios... 3. Teoría de Conjuntos y Combinatoria.

Por experiencia sabemos que la mayoría de estudiantes tienen más conocimientos de Cálculo, Geometría y Matrices. Sin embargo, muchos tienen una falta de conocimientos en Teoría básica de Conjuntos y Combinatoria (Matemática Discreta).

0.1. Teoría de conjuntos

Definición de conjunto

La definición de conjunto es una idea o noción primitiva. Es decir, es una idea básica del pensamiento humano: un conjunto es una colección de objetos (números, imágenes, jugadores de fútbol, palabras, colores...).

La Teoría de Conjuntos básica es simple y natural y es la que necesitamos para este curso. Por otro lado, la Teoría de Conjuntos matemática es más compleja y presenta varias paradojas como la paradoja

La idea o noción práctica de conjunto es la de una colección de objetos de un cierto tipo.

Estas colecciones o conjuntos se pueden definir por:

- \bullet Compresión: reuniendo los objetos que cumplen una propiedad p
- Extensión: dando una lista exhaustiva de los miembros del conjunto

0.1.1. Conjuntos básicos

Los conjuntos suelen tener un conjunto madre como por ejemplo

- $$\begin{split} \bullet & \ \mathbb{N} = \{0,1,2,\ldots\}; \text{ los números naturales. } \\ \bullet & \ \mathbb{Z} = \{\ldots,-2,-1,0,1,2,\ldots\}; \text{ los números enteros. } \\ \bullet & \ \mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \ \middle| \ p,q \in \mathbb{Z} \ \text{y} \ q \neq 0 \right\}; \text{ los números racionales.} \end{split}$$

0.1. TEORÍA DE CONJUNTOS

0.1.3. Operaciones con conjuntos

Intersección.

Sea Ω un conjunto v A v B dos subconjuntos de Ω .

El conjunto **intersección** de A y B es el formado por todos los elementos que pertenecen a A y B. Se denota por $A \cap B$.

Más formalmente

$$A\cap B=\left\{x\in\Omega\ \big|\ x\in A\ {\bf y}\ x\in B\right\}.$$

El conjunto **unión** de A v B es el formado por todos los elementos que pertenecen a A o que pertenecen a B. Se denota por $A \cup B$.

$$A \cup B = \left\{ x \in \Omega \ \middle| \ x \in A \text{ o } x \in B \right\}.$$

El conjunto diferencia de A y B es el formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Se denota por $A-B=A-(A\cap B)$.

Más formalmente

$$A-B=\left\{x\in\Omega\ \big|\ x\in A\ {\bf y}\ x\not\in B\right\}.$$

Complementario

El complementario de un subconjunto A de Ω es $\Omega - A$ y se denota por A^c o \bar{A}

$$A^c = \left\{ x \in \Omega \ \middle| \ x \notin A \right\}.$$

0.1.4. Más propiedades y definiciones

Sea Ω un conjunto y $A,\,B,\,C$ tres subconjuntos de Ω

- Se dice que dos conjuntos A y B son disjuntos si $A \cap B = \emptyset$.

- So that que us conjuntes $A \ y \ B$ son disjuntes $A \ Y \ B$ on di
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ (propiedad asociativa). $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (propiedad distributiva). $(A \circ)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (leyes de De Morgan).

ÍNDICE GENERAL

■ R = {Todos los puntos de una recta}; los números reales

Recordemos que i es la unidad imaginaria que satisface $i = +\sqrt{-1}$.

 $\begin{array}{l} \mathbb{R} = \{a+b : i \mid a,b \in \mathbb{R}\}; \text{ los números complejos.} \\ \mathbb{R} = \{a+b : i \mid a,b \in \mathbb{R}\}; \text{ los números complejos.} \\ \mathbb{R} = \{a,b,c,\ldots,A,B,C,\ldots\} \\ \mathbb{R} = \{paz,guerra,amor,probabilidad,\ldots\} \end{array}$

$0.1.2.\,$ Características y propiedades básicas de los conjuntos

- \blacksquare A cada objeto x de Ω lo llamaremos elemento del conjunto Ω y diremos que x pertenece a $\Omega.$
- It can object v ∈ Ω
 Lo denotaremos por x ∈ Ω
 Un conjunto de un elemento, por ejemplo {1}, recibe el nombre de conjunto elemental (o singleton del inglés).
- Sean A y B conjuntos, diremos que A es igual a B si todos los elementos A están en B y todos
- Stan Ny Deonjuntos, inclino que la Ferrigiana a B si cotas se elementos de B están en A. Por ejemplo, A = {1,2,3} es igual a B = {3,1,2}.
 Si A es un conjunto tal que si x ∈ A entonces x ∈ B, diremos que A es un subconjunto de o que está contenido en B. Lo denotaremos por A ⊆ B.
- El conjunto que no tiene elementos se denomina conjunto vacío y se denota por el símbolo ∅.
 Dado A un conjunto cualquiera, obviamente ∅ ⊆ A.

Tomemos como conjunto base $\Omega = \{1, 2, 3\}$

- Ω es un conjunto de cardinal 3, se denota por $\#(\Omega)=3$ o por $|\Omega|=3$ El conjunto Ω tiene $2^3=8$ subconjuntos.

- reorijumo α trene 2^{-} e 8 succonjumos. El vacio \emptyset y los elementales $\{1\}, \{2\}, \{3\}$. Los subconjuntos de dos elementos: $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$. El conjunto total de tres elementos $\Omega = \{1, 2, 3\}$.

Dado un conjunto Ω podemos construir el **conjunto de todas sus partes** (todos sus subconjuntos) al que denotamos por $\mathcal{P}(\Omega)$. También se denomina de forma directa **partes de** Ω .

Cardinal de las partes de un conjunto

El cardinal de las partes de un conjunto es $\#(\mathcal{P}(\Omega)) = 2^{\#(\Omega)}$.

Por ejemplo # $(\mathcal{P}(\{1,2,3\})) = 2^{\#(\{1,2,3\})} = 2^3 = 8.$

Efectivamente.

$$\mathcal{P}(\{1,2,3\}) = \{\emptyset,\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}\}.$$

Dado un subconjunto A de Ω podemos construir la función característica de A

$$\chi_A:\Omega \to \{0,1\}$$

donde dado un $\omega \in \Omega$

$$\chi_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$$

ÍNDICE GENERAL

0.1.5. Con R, ejemplos

Con ${\tt R},$ los conjuntos de pueden definir como vectores

[1] 1 2 3 4 5

(B = c(1,4,5))[1] 1 4 5

(C = c(4,6,7,8))

[1] 4 6 7 8

 $A \cap B$

intersect(A,B)

[1] 1 4 5 $A \cup B$

union(A,B)

Γ17 1 2 3 4 5

B-C

setdiff(B,C)

[1] 1 5

 $A^c = \Omega - A$

setdiff(Omega,A)

[1] 6 7 8 9 10

0.1.6. Con Python, ejemplos

{1, 4, 5}

C = set([4,6,7,8]) C

{8, 4, 6, 7}

A & B ## intersección (&: and/y)

{1, 4, 5}

A | B ## unión (|: or/o)

{1, 2, 3, 4, 5}

A - C ## diferencia

{1, 2, 3, 5}

Omega-C ## complementario

{1, 2, 3, 5, 9, 10}

0.2. Combinatoria

La combinatoria es una rama de la Matemática Discreta que, entre otras cosas, cuenta distintas configuraciones de objetos de un conjunto

Por ejemplo, si tenemos un equipo de baloncesto con 7 jugadores ¿cuántos equipos de 5 jugadores distintos podemos formar?

0.2.1. Combinaciones

Número combinatorio o número binomial

Nos da el número de subconjuntos de tamaño k de un conjunto de tamaño n. Este número es

$$C_n^k = {n \choose k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Recordemos que

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$$

En nuestro caso con 7 jugadores, n=7, el número de equipos distintos de k=5 es

$$C_7^5 = {7 \choose 5} = \frac{7!}{5! \cdot (7-5)!} = \frac{7!}{5! \cdot 2!}$$

= $\frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{6 \cdot 7}{2} = \frac{42}{2} = 21.$

Podemos formar 21 equipos distintos

0.2. COMBINATORIA

0.2.4. Variaciones (sin repetición).

Denotaremos las variaciones (sin repetición) de k elementos (de orden k) de un conjunto de n elementos por V_k^n su valor es

$$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = (n-k+1) \cdot (n-k+2) \cdots n.$$

En nuestro ejemplo con n=3 dígitos podemos escribir las siguientes variaciones de orden k=2

$$V_{n=3}^{k=2} = \frac{3!}{(3-2)!} = \frac{1\cdot 2\cdot 3}{1} = 6.$$

Exercise 0.2. Ejercicio

 $\label{lem:condition} Carga~el~paquete~\texttt{gtools}~de~R~e~investiga~la~función~\texttt{permutations}(\texttt{n},~\texttt{r},~\texttt{v},~\texttt{set},~\texttt{repeats.allowed})~para~calcular~todas~las~variaciones~anteriores.$

Variaciones con repetición

¿Y repitiendo algún dígito?

$$VR_n^k = n^k$$

Efectivamente, en nuestro caso

11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33

$$VR_{n-3}^{k=2} = n^k$$
.

0.2.5. Permutaciones

Las permutaciones de un conjunto de cardinal n son todas las variaciones de orden máximo, n. Las denotamos v valen:

$$P_n=V_n^n=n!$$

Por ejemplo, todos los números que se pueden escribir ordenando todos los dígitos $\{1,2,3\}$ sin repetir

library(combinat)

for(permutacion in permn(3)) print(permutacion)

- [1] 1 2 3 [1] 1 3 2 [1] 3 1 2 [1] 3 2 1

Exercise 0.1. Ejercicio

Carga el paquete gtools de Re investiga la función combinations (n, r, v, set, repeats.allowed) para calcular todas las combinaciones anteriores.

0.2.2. Combinaciones con repetición

En combinatoria, las combinaciones con repetición de un conjunto son las distintas formas en que se puede hacer una selección de elementos de un conjunto dado, permitiendo que las selecciones puedan

El número CR_n^k de multiconjuntos con k elementos escogidos de un conjunto con n elementos satisface:

- \blacksquare Es igual al número de combinaciones con repetición de k elementos escogidos de un conjunto con
- Es igual al número de formas de repartir k objetos en n grupos

$$CR_n^k=\binom{n+k-1}{k}=\frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!}.$$

Example 0.1. Ejemplo

Vamos a imaginar que vamos a repartir 12 caramelos entre Antonio, Beatriz, Carlos y Dionisio (que representaremos como A, B, C, D). Una posible forma de repartir los caramelos sería: dar 4 caramelos a Antonio, 3 a Beatriz, 2 a Carlos y 3 a Dionisio. Dado que no importa el orden en que se reparten, podemos representar esta selección como 'AAAABBBCCDDD'.

Otra forma posible de repartir los caramelos podría ser: dar 1 caramelo a Antonio, ninguno a Beatriz y Carlos, y los 11 restantes se los damos a Dionisio. Esta repartición la representamos como "ADDDDDDDDDDDD".

Recíprocamente, cualquier serie de 12 letras A, B, C, D se corresponde a una forma de repartir los caramelos. Por ejemplo, la serie 'AAAABBBBDDD' corresponde a: Dar 4 caramelos a Antonio, 5 caramelos a Beatriz, ninguno a Carlos y 3 a Dionisio.

De esta forma, el número de formas de repartir los caramelos es:

$$CR_{12}^4 = \begin{pmatrix} 12 + 4 - 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

0.2.3. Variaciones.

Variaciones

Con los números $\{1,2,3\}$ ¿cuántos números de dos cifras distintas podemos formar sin repetir ninguna

Los podemos escribir

Luego hay seis casos

ÍNDICE GENERAL 14

[1] 2 3 1 [1] 2 1 3

13

Efectivamente.

$$P_3 = 3! = 1 \cdot 2 \cdot 3$$
.

Exercise 0.3. Ejercicio

Carga el paquete combinat de R e investiga la funcion permn para calcular todas las permutaciones

Exercise 0.4. Ejercicio

Investiga el paquete itertools y la función comb de scipy.misc de Python e investiga sus funciones para todas las formas de contar que hemos visto en este tema.

Exercise 0.5. Ejercicio

La función gamma de Euler cobrará mucha importancia en el curso de estadística. Comprueba que la función gamma (x+1) da el mismo valor que la función factorial (x) en R para todo $x=\{1,2,3\cdots,10\}$.

0.2.6. Números multinomiales. Permutaciones con repetición.

Consideremos un conjunto de elementos $\{a_1,a_2,\dots,a_k\}$.

Entoces, si cada uno de los objetos a_i de un conjunto, aparece repetido n_i veces para cada i desde 1 hasta k, entonces el número de permutaciones con elementos repetidos es:

$$PR_n^{n_1,n_2,\dots,n_k} = {n \choose n_1 \quad n_2 \quad \dots \quad n_k} = \frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!},$$

 $\text{donde } n = n_1 + n_2 + \dots + n_k.$

Example 0.2. Ejemplo

 $\label{eq:condition} \begin{tabular}{ll} \be$

El conjunto de letras de la palabra considerada es el siguiente: $\{A,B,D,I,L,O,P,R\}$ con las repeticiones siguientes: las letras A, B, D, e I, aparecen 2 veces cada una; y las letras L, O, P, R una vez cada una de ellas.

Por tanto, utilizando la fórmula anterior, tenemos que el número de palabras (permutaciones con elementos repetidos) que podemos formar es

$$PR_{12}^{2,2,2,2,1,1,1,1} = \frac{12!}{(2!)^4(1!)^4} = 29937600.$$

0.3. Para acabar

0.3.1. Principios básicos para contar cardinales de conjuntos

El principio de la suma

Sean A_1,A_2,\dots,A_n conjuntos disjuntos dos a dos, es decir $A_i\cap A_j=\emptyset$ para todo $i\neq j,\,i,j=1,2,\dots n.$ Entonces

$$\#(\cup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} \#(A_i).$$

Principio de unión exclusión

Consideremos dos conjuntos cualesquiera ${\cal A}_1, {\cal A}_2,$ entonces el cardinal de su unión es

$$\#(A_1 \cup A_2) = \#(A_1) + \#(A_2) - \#(A_1 \cap A_2).$$

El principio del producto

Sean $A_1,A_2,\dots A_n$

$$\begin{array}{ll} \#(A_1 \times A_2 \times \cdots A_n) = & \#\left(\{(a_1, a_2, \ldots a_n) | a_i \in A_i, i = 1, 2, \ldots n \} \right) \\ = & \prod_{i=1}^n \#(A_i). \end{array}$$

0.4. Otros aspectos a tener en cuenta

Evidentemente, nos hemos dejado muchas otras propiedades básicas de Teoría de Conjuntos y de

- Propiedades de los números combinatorios.
 Binomio de Newton.
 Multinomio de Newton.

Si nos son necesarias las volveremos a repetir a lo largo del curso o bien daremos enlaces para que las

Exercise 0.6. Nota

Puedes repasar todos esos conceptos con ejercicios y más en el Curso de estadística descriptiva con $\tt R$ y Python con M. Santos y J.G. Gomila.

Capítulo 1

Probabilidad

1.1. Probabilidades Básicas

Experimento aleatorio: experimento que repetido en las mismas condiciones puede dar resultados diferentes, pero que a largo plazo son predecibles.

Example 1.1. Ejemplo

Tirar un dado de 6 caras y anotar el número de puntos de la cara superior.

Suceso elemental: cada uno de los posibles resultados del experimento aleatorio.

Example 1.2. Ejemplo

Los sucesos elementales del ejemplo anterior serían:



CAPÍTULO 1. PROBABILIDAD



Espacio muestral: el conjunto Ω formado por todos los sucesos elementales del experimento aleatorio.

Example 1.3. Ejemplo

El espacio muestral del ejemplo anterior del dado es



pero por comodidad, a partir de ahora pondremos

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$$

Suceso: Cualquier subconjunto del espacio muestral

Alguno sucesos notables que merece la pena nombrar son:

- Suceso seguro o cierto: Ω .
 Suceso imposible o vacio: \emptyset
- Partes de un conjunto: $\mathcal{P}(\Omega)$, conjunto de todos los sucesos del experimento aleatorio (es decir, el conjunto de todos los subconjuntos de Ω).

Exercise 1.1. Ejercicio

 \Bar{c} Cuántos elementos contiene el conjunto de partes de Ω del experimento anterior?

Example 1.4. Ejemplo n-grama

Se define un n-grama de una palabra como el conjunto de n letras consecutivas de la misma (contando los blancos de inicio y final de palabra que marcamos como "_").

Consideremos el experimento aleatorio que consiste en escoger al azar un 3-grama de la palabra "_Baleares_". Vamos a escribir el espacio muestral y algunos sucesos elementales del mismo.

En este caso, si consideramos la palabra " Baleares ", el espacio muestral del experimento sería:

$$\Omega = \{_Ba, Bal, ale, lea, ear, are, res, es_\}$$

Algunos sucesos serían:

- 3-gramas que empiezan por a: {ale, are}.
 3-gramas de inicio y final de palabra: {_Ba, es_}.
 3-gramas que contengan una l: {Bal, ale, lea}.

1.1.1. Operaciones con sucesos

Si tenemos dos sucesos $A,B\subseteq\Omega,$ podemos definir:

- Ω: suceso total o seguro.

- 31: suceso totat o seguro.

 \emptyset : suceso vacío o imposible.

 $A \cup B$: suceso unión; el que ocurre si sucede A o B.

 $A \cap B$: suceso intersección; el que ocurre si sucede A y B.

 A^c : suceso complementario; el que sucede si NO sucede A.

 $A B = A \cap B^c$: suceso diferencia; el que acontece si sucede A y NO sucede B.

Sucesos incompatibles: A y B son incompatibles (o disjuntos) cuando $A\cap B=\emptyset.$

Example 1.5. Ejemplo género

Supongamos que una clase se divide entre Mujeres y Hombres. Vamos a definir el espacio muestral, los sucesos elementales y a realizar algunas operaciones entre ellos.

- $\begin{tabular}{ll} \bullet & \text{Estudiantes de esta clase: } \Omega. \\ \bullet & \text{Mujeres de esta clase: } A. \\ \bullet & \text{Estudiantes que son zurdos: } B. \\ \end{tabular}$

Algunas operaciones entre los conjuntos:

- $A \cup B$: Estudiantes que son mujeres o que son zurdos.

- A ∪ B: Estudiantes que son mujeres o que son zi
 A ∩ B: Mujeres de esta clase que son zurdas.
 A^c: Hombres de esta clase.
 A − B: Mujeres de esta clase.
 A − B: Mujeres de la clases que NO son zurdas.
 B − A: Hombres de la clase que son zurdos.
 ¡Cuidado! No son incompatibles.

1.1.2. Propiedades

Conmutativas:

 $A\cup B=B\cup A,\quad A\cap B=B\cap A$


Asociativas:

 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$


Distributivas:

 $A\cap (B\cup C)=(A\cap B)\cup (A\cap C),\quad A\cup (B\cap C)=(A\cup B)\cap (A\cup C)$

1.1. PROBABILIDADES BÁSICAS





21



Leves de De Morgan


 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$





Complementario del complementario


 $(A^c)^c=A$




Leyes de De Morgan

 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

22 CAPÍTULO 1. PROBABILIDAD





1.1.3. Definición de probabilidad

La probabilidad de un suceso es una puntuación (score) numérica entre 0 y 1 que mide la verosimilitud de que este evento se produzca.

Esta verosimilitud puede estar justificada por:

- Estimación personalEstimación de expertos
- La frecuencia con la que se da
 Cálculo formal

Sea Ω el espacio muestral de un experimento aleatorio. Supongamos que el número de posibles resultados, por el momento, es finito

Una probabilidad sobre Ω es una aplicación $P:\mathcal{P}(\Omega)\to [0,1]$ con las siguientes propiedades:

- 1. $0 \le P(A) \le 1$, para todo suceso A.
- 2. $P(\Omega) = 1$.

Si {A₁, A₂,..., A_n} son sucesos disjuntos dos a dos, entonces

$$P(A_1\cup A_2\cup \cdots \cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots +P(A_n).$$

Si $a \in \Omega$ es un suceso elemental, cometeremos el abuso de notación de poner P(a) en lugar de $P(\{a\})$.

Example 1.6. Ejemplo: grupos sanguíneos

En la página de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares podemos encontrar información sobre los porcentajes de tipos de sangre de los donantes de las Islas Baleares:

$$A:46\,\%;\ B:7.5\,\%;\ AB:3.5\,\%;\ O:43\,\%.$$

; Cuál es la probabilidad de que un balear donante de sangre no sea del tipo O?

Experimento aleatorio: tipo de sangre de un paciente humano

$$\Omega = \{A.B.AB.O\}$$


 ${f Probabilidad}$ de un suceso: se asimila al porcentaje observado de individuos Suceso: $\{O\}^c = \{A,B,AB\}$

$$P(\{{\rm O}\}^c)\!=\!P(\{{\rm A,B,AB}\})\!=\!P({\rm A})+P({\rm B})+P({\rm AB})\!=\!0.57.$$

1.1.4. Propiedades

Propiedades básicas de la probabilidad

- P(∅) = 0.
- $P(A-B) = P(A) P(A \cap B)$ porque $P(A) = P(A-B) + P(A \cap B)$.



- Si $B \subseteq A$, entonces $0 \le P(B) \le P(A)$.
- $\quad \bullet \ P(A^c) = 1 P(A).$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) P(A \cap B)$ porque

1.1. PROBABILIDADES BÁSICAS

Example 1.7. Ejemplo: Frecuencia de vocales

Los porcentajes de vocales de un determinado idioma (de alfabeto latino) según la Wikipedia son:

$$A:18.7\,\%;\ E:26.1\,\%;\ I:25.7\,\%;\ O:24.4\,\%;\ U:5.1\,\%.$$

 ${}_{\stackrel{.}{b}}{\rm C}$ uál es la probabilidad que una vocal escogida al azar de este idioma sea una E o una O?

El espacio muestral del experimento es $\Omega = \{A, E, I, O, U\}.$

El suceso que deseamos analizar es $\{E,O\}$.

Y su probabilidad es

$$P(\{E,O\}) = P(E) + P(O) = 0.261 + 0.244 = 0.505.$$

Example 1.8. Ejemplo: Consumo de drogas

Según un artículo de El País, en un control especial de la policía el 0.1% de todos los conductores analizados en un control de tráfico dan positivo en un el test en cocaína, y el 1% da positivo en cannabis. Un 1.05% da positivo en alguno de los dos test.

 $\xi \text{Cuál}$ es la probabilidad que un individuo analizado en el control de drogas escogido al azar no dé positivo en ninguno de lo dos test?

Los sucesos elementales del enunciado del problema son:

- A: dar positivo en cocaína; P(A) = 0.001. B: dar positivo en cannabis; P(B) = 0.01.

En este caso nos interesa estudiar los sucesos:

- $A\cup B$: dar positivo en alguno de los dos test; $P(A\cup B)=0.0105$. $(A\cup B)^c$: no dar positivo en ninguno de los test,

de donde, por tanto:

$$P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.0105 = 0.9895.$$

Example 1.9. Ejemplo

En un control especial de la policía el $0.1\,\%$ de todos los conductores analizados en un control de tráfico dan positivo en un el test en cocaína, y el 1% da positivo en cannabis. Un $1.05\,\%$ da positivo en alguno de los dos test.


¿Cuál es la probabilidad que un analizado al azar dé positivo en los dos test en cocaína y cannabis? Los sucesos elementales son:

- A: dar positivo en cocaína; P(A) = 0.001.
- \blacksquare B: dar positivo en cannabis; P(B)=0.01

En este caso nos interesa estudiar los sucesos:


• $A \cup B$: dar positivo en algún de los dos test; $P(A \cup B) = 0.0105$.

$$\begin{array}{ll} P(A) + P(B) - P(A \cap B) & = & P(A - B) + P(A \cap B) + \\ & P(B - A) + P(A \cap B) - P(A \cap B) \\ & = & P(A - B) + P(A \cap B) + P(B - A) \\ & = & P(A \cup B). \end{array}$$



 $\bullet \ P(A \cup B \cup C):$

$$\begin{array}{ll} P(A \cup B \cup C) &=& P(A) + P(B) + P(C) \\ &-P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C). \end{array}$$



$$P(A \cup B \cup C) = P(1) + P(2) + P(3) + P(4) + P(5) + P(6) + P(7).$$

 \blacksquare Si $A=\{a_1,a_2,\ldots,a_k\},$ entonces

$$P(A) = P(a_1) + P(a_2) + \dots + P(a_k).$$

• Si todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad,

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} \Big(= \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}} \Big)$$

CAPÍTULO 1. PROBABILIDAD

A ∩ B: dar positivo en los dos test,

de donde, por tanto:

25

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

= 0.001 + 0.01 - 0.0105 = 0.0005.

¿Cuál es la probabilidad de que un conductor analizado dé positivo en cocaína pero no en cannabis? Los sucesos elementales son:

- A: dar positivo en cocaína; P(A) = 0.001.
- B: dar positivo en cannabis; P(B) = 0.01

En este caso nos interesa estudiar los sucesos:

- $A\cap B$: dar positivo en los dos test; $P(A\cap B)=0.0005$. A-B: dar positivo en cocaína, pero no en cannabis,

de donde, por tanto:

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = 0.001 - 0.0005 = 0.0005.$$

1.2. Probabilidad condicionada

 Probabilidad condicionada: Dados dos sucesos A y B, con P(A)>0, la probabilidad P(B|A) de B condicionado a A es la probabilidad

- de que suceda B suponiendo que pasa A,
 de que si pasa A, entonces suceda B,
 de que un resultado de A también pertenezca a B.

Se calcula a través de la definición:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Example 1.10. Ejemplo: frecuencia género y gafas

En una clase de 20 hombres y 30 mujeres, 15 hombres y 18 mujeres llevan gafas. Contestemos las siguientes preguntas:

 \bullet ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno lleve gafas?

$$\frac{33}{50}$$
.

 \bullet ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno sea mujer y lleve gafas?

• ¿Cuál es la probabilidad de que un chica lleve gafas?

$$\frac{18}{30} = \frac{18/50}{30/50} = \frac{P(\text{mujer y gafas})}{P(\text{mujer})}$$

 \bullet Si escogemos un estudiante al azar ¿Cuál es la probabilidad que si es mujer, entonces lleve gafas?

$$\frac{18}{30}$$

 \bullet ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno que lleve gafas sea mujer?

$$\frac{18}{33} = \frac{18/50}{33/50} = \frac{P(\text{mujer y gafas})}{P(\text{gafas})}.$$

• Si escogemos un estudiante al azar ¿Cuál es la probabilidad de que si lleva gafas, entonces sea

$$\frac{18}{33}$$

1.2.1. ¡Atención!

Hay que distinguir bien entre

- $P(A \cap B)$: probabilidad de A y B, Probabilidad de que lleve gafas y sea mujer.
- $\bullet \ P(A|B)$: probabilidad de que si pasa B,entonces pase A, Probabilidad de que, si es mujer, lleve

Cuando utilizamos probabilidad condicional P(A|B) estamos restringiendo el espacio muestral a B.

1.2.2. Propiedades

La probabilidad condicionada es una probabilidad

Proposición

Sea $A\subseteq \Omega$ un suceso tal que P(A)>0, entonces

$$\begin{array}{cccc} P(-|A): & \mathcal{P}(\Omega) & \to & [0,1] \\ & B & \mapsto & P(B|A). \end{array}$$

satisface las propiedades de las probabilidades, como por ejemplo:

$$\begin{split} &P(B^c|A) = 1 - P(B|A), \\ &P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1 \cap B_2|A). \end{split}$$

Exercise 1.2. Ejercicio

Escribid el resto de propiedades que cumpliría una probabilidad condicionada al evento A.

Example 1.11. Ejemplo: Hipertensos

Un 15 % de los adultos son hipertensos, un 25 % de los adultos creen que son hipertensos, y un 9 % de los adultos son hipertensos y creen que lo son.

1.2. PROBABILIDAD CONDICIONADA

$$P(A|S) = \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = ?$$

- $\bullet \ P(A) = 0.5, P(S) = 0.65, P(A^c \cap S^c) = P((A \cup S)^c) = 0.15,$
- $P(A \cup S) = 1 P((A \cup S)^c) = 0.85$,
- $\bullet \ P(A\cap S)=P(A)+P(S)-P(A\cup S)=0.3,$

$$P(A|S) = \frac{P(A \cap S)}{P(S)} = \frac{0.3}{0.65} \approx 0.46.$$

 $\Bar{\wp}$ Cuál es la probabilidad de que un correo no lleve adjuntos si no es SPAM?

$$P(A) = 0.5, P(S) = 0.65, P(A^c \cap S^c) = P((A \cup S)^c) = 0.15$$

$$P(A^c|S^c) = \frac{P(A^c \cap S^c)}{P(S^c)} = \frac{P(A^c \cap S^c)}{1 - P(S)} = \frac{0.15}{0.35} \approx 0.43.$$

1.2.3. Teorema de la probabilidad total

Teorema de la probabilidad total

Dados dos sucesos A y B se tiene que

$$\begin{array}{ll} P(B) &= P(B\cap A) + P(B\cap A^c) \\ &= P(A)\cdot P(B|A) + P(A^c)\cdot P(B|A^c). \end{array}$$

Partición del espacio espacio muestral

Los sucesos A_1,A_2,\dots,A_n son una **partición** del espacio muestral Ω de un determinado experimento aleatorio, si cumplen las condiciones siguientes:

1.
$$A_1 \cup A_2 \cup ... \cup A_n = \Omega$$

 $\begin{array}{ll} 1. \ \ A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n = \Omega, \\ 2. \ \ A_1, A_2, \ldots, A_n \ \text{son incompatibles dos a dos} \ (A_i \cap A_j = \emptyset). \end{array}$

Teorema de la probabilidad total (generalización) Se
a A_1,A_2,\dots,A_n una partición de $\Omega.$ Se
aBun suceso cualquiera. Entonces

$$\begin{array}{ll} P(B) &= P(B\cap A_1)+\dots+P(B\cap A_n) \\ &= P(A_1)\cdot P(B|A_1)+\dots+P(A_n)\cdot P(B|A_n). \end{array}$$

Example 1.14. Ejemplo: Dígito de control de error

Un dígito de control de error toma el valor 0 en un 99 % de los casos en que hay un error y en un 5 % de los mensajes sin error. La probabilidad de error en un mensaje es del $0.5\,\%$

 ${}_{\stackrel{.}{b}}\mathrm{Cu\acute{a}l}$ es la probabilidad de que un mensaje escogido al azar tenga el dígito de control a 0? Sean los sucesos del enunciado:

- · Si un adulto cree que es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad que lo sea?
- Si un adulto es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad que crea que lo es?

- $\begin{array}{l} \bullet \ A \hbox{: ser hipertenso; } P(A) = 0.15. \\ \bullet \ B \hbox{: creer ser hipertenso; } P(B) = 0.25, \end{array}$

entonces podemos definir el suceso

A ∩ B: ser hipertenso v creerlo: P(A ∩ B) = 0.09.

de donde, la probabilidad condicionada de ser hipertenso creyéndonos que lo somos es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.09}{0.25} = 0.36.$$

Si un adulto es hipertenso, ¿cuál es la probabilidad que crea que lo es?

Si tenemos los sucesos:

- A: ser hipertenso,
 B: creer ser hipertenso

entonces buscamos la probabilidad P(B|A):

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.09}{0.15} = 0.6.$$

Example 1.12. Ejemplo: dígitos de control

Un dígito de control de error toma el valor 0 en el 99 % de los casos en que hay un error. Si la probabilidad de error en un mensaje es del 0.5 %. ¿cuál es la probabilidad de que el mensaje sea erróneo y el código de error tenga valor 0?

- $\label{eq:bounds} \begin{array}{l} \bullet \ B \text{: mensaje con error; } P(B) = 0.005, \\ \bullet \ A \text{: c\'odigo de error vale } 0, \\ \bullet \ P(A|B) = 0.99, \end{array}$

entonces:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = 0.005 \cdot 0.99 = 0.00495.$$

Example 1.13. Ejemplo: SPAM

Un $50\,\%$ de correos recibidos en un servidor llevan adjuntos y un $65\,\%$ son publicidad no deseada (SPAM). Sólo un $15\,\%$ de estos correos no llevan adjuntos y no son SPAM.

- ¿Cuál es la probabilidad que un correo lleve adjunto si es SPAM?
 ¿Cuál es la probabilidad que un correo no tenga adjuntos si no es SPAM?

¿Cuál es la probabilidad que un correo lleve adjunto si es SPAM?

- A: llevar adjuntos, P(A)=0.5, S: SPAM, P(S)=0.65, $A^c\cap S^c=(A\cup S)^c$: no llevar adjunto y no ser SPAM, $P((A\cup S)^c)=0.15$.

CAPÍTULO 1. PROBABILIDAD

- B: mensaje con error; P(B) = 0.005,
- A: código de error vale 0

entonces obtenemos las probabilidades a partir del enunciado:

- P(A|B) = 0.99.
- $P(A|B^c) = 0.05$.

y por tanto,

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(B^c) \cdot P(A|B^c)$$

= 0.005 \cdot 0.99 + 0.995 \cdot 0.05 = 0.0547

1.2.4. Clasificación o Diagnósticos

Consideremos alguna de las siguientes situaciones:

- Un algoritmo detecta si una transacción con tarjeta de crédito es fraude o no.
- Un algoritmo detecta si tiene o no que mostrar un anuncio en una web.

 Una prueba de embarazo.
- Una prueba médica para una enfermedad concreta.

Nos ceñiremos a la casuística más elemental, donde el algoritmo de clasificación o la diagnosis solo da dos resultados: **Positivo** (sí tienes la enfermedad, sí es un fraude) o **Negativo** (en caso contrario).

En todas estas situaciones podemos calcular lo que se llama **matriz de confusión** que representa todas las situaciones posibles. En el caso de estudiar una condición de tipo binario,

	El Test da Positivo	El Test da Negativo
Condición Positiva	Correcto	Error
Condición Negativa	Error	Correcto

En general, los modelos y algoritmos de clasificación suelen aportar puntuaciones (scores) que determinan el grado de pertenencia a una clase, o que miden si dos objetos están en la misma clase

Así, el resultado del clasificador o del diagnóstico puede ser:

- ullet un número real, en cuyo caso el clasificador entre cada clase debe determinarse por un valor
- umbral (threshold). Por ejemplo, para determinar si una persona está estresada podemos dar un scores entre 0 y 1 (1 máximo estrés 0 estrés nulo).

 un resultado discreto que indica directamente una de las clases (esto es necesario si es un algoritmo que debe decidir qué hacer con el objeto.

Positivos y Negativos en Clasificación Consideremos un problema de predicción de clases binario, en el que los resultados se etiquetan positivos (P) o negativos (N). Hay cuatro posibles resultados a partir de un clasificador binario como el propuesto.

- Si el resultado de una exploración es P y el valor dado es también P, entonces se conoce como
- Si el restinado de una expioración es 1 y el valor dado es samoca 1, curvace se como un Verdadero Positivo (VP).
 Sin embargo, si el valor real es N entonces se conoce como un Falso Positivo (FP).
 De igual modo, tenemos un Verdadero Negativo (VN) cuando tanto la exploración como el valor dado son N

Un Falso Negativo (FN) cuando el resultado de la predicción es N pero el valor real es P.

Un ejemplo aproximado de un problema real es el siguiente: consideremos una prueba diagnóstica que persiga determinar si una persona tiene una cierta enfermedad.

- $\bullet\,$ Un falso positivo en este caso ocurre cuando la prueba predice que el resultado es positivo, cuando la persona no tiene realmente la enfermedad.
- т рассова во съда съдписние за списъщения.

 Un falso negativo, or el contrario, courre cuando el resultado de la prueba es negativo, sugiriendo que no tiene la enfermedad cuando realmente sí la tiene.

En un diagnóstico de una cierta condición (por ejemplo, test embarazo, test de enfermedad), tenemos dos tipos de sucesos

- T: el test da positivo,

- T: et test da positivo,
 M: el sujeto satisface la condición,
 Falsos positivos T ∩ M^c: El test da positivo, pero la condición no se da,
 Coeficiente de falsos positivos P(T[M^c),
 Falsos negativos T^c ∩ M: El test da negativo, pero la condición sí que se da,
 Coeficiente de falsos negativos: P(T^c|M).

Example 1.15. Ejemplo: Prueba médica

Un test diseñado para diagnosticar una determinada enfermedad tiene un coeficiente de falsos negativos de 0.06, y un coeficiente de falsos positivos de 0.04. En un estudio masivo se observa que un $15\,\%$ de la población da positivo al test.

 $\ensuremath{\mathring{\iota}}$ Cuál es la probabilidad que una persona escogida aleatoriamente tenga esta enfermedad?

Los datos del problema son:

- T: dar positivo al test; P(T) = 0.15,

$$P(T) = P(M) \cdot P(T|M) + P(M^c) \cdot P(T|M^c),$$

$$\begin{split} P(T|M) &= 1 - P(T^c|M) = 0.94, \\ P(M^c) &= 1 - P(M). \end{split}$$

$$\begin{array}{ll} 0.15 &= P(M) \cdot 0.94 + (1 - P(M)) \cdot 0.04 \\ &= 0.04 + 0.9 \cdot P(M), \\ P(M) &= \frac{0.11}{0.9} \approx 0.1222. \end{array}$$

1.3. BAYES

B: el test da positivo.

Ahora podemos calcular la probabilidad que un individuo que haya dado positivo en el test esté

33

$$\begin{array}{lcl} P(A|B) & = & \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)} \\ & = & \frac{0.99 \cdot 0.005}{0.005 \cdot 0.99 + 0.995 \cdot 0.05} = 0.09. \end{array}$$

Para calcular la probabilidad de que un individuo que haya dado $\mathbf{negativo}$ en el test \mathbf{no} esté infectado hacemos

$$\begin{array}{ll} P(A^c|B^c) &= \frac{P(B^c|A^c) \cdot P(A^c)}{P(B^c|A) \cdot P(A) + P(B^c|A^c) \cdot P(A^c)} \\ &= \frac{0.95 \cdot 0.995}{0.01 \cdot 0.005 \cdot 0.995} = 0.999947. \end{array}$$

Exercise 1.3. Eiercicio: Ventas por internet

Se ha observado que los cientes de una empresa de ventas por internet son de tres tipos, A, B y C, disjuntos dos a dos. La probabilidad de ser de cualquiera de cada uno de los tipos es 1/3, pero la probabilidad de compra de cada tipo es diferente: si es de tipo A compra un 50 % de las veces, si de tipo B, un 75 % de las veces, y de tipo C, un 60 %.

Supongamos que llega un cliente ¿cuál es la probabilidad de que si ha comprado sea del tipo B?

• Los sucesos del ejercicio son A: el cliente es de tipo A, B: el cliente es de tipo B, C: el cliente es de tipo C.

$$P(A) = P(B) = P(C) = 1/3.$$

Buscamos estudiar el suceso E: el cliente compra, se tiene que:

$$P(E|A) = 0.5, P(E|B) = 0.75, P(E|C) = 0.6. \label{eq:posterior}$$

$$P(B|E) \!=\! \frac{P(E|B) \cdot P(B)}{P(E|A) \cdot P(A) \!+\! P(E|B) \cdot P(B) \!+\! P(E|C) \cdot P(C)} \!= \! \dots$$

Exercise 1.4. Ejercicio: Detección precoz de abandono de clientes

Un test de detección precoz de abandono de clientes de una empresa de telefonía da positivo el $97.5\,\%$ de las ocasiones en las que, posteriormente, el cliente se da de baja, y un 12 % de las veces en que no se dio de baja. La probabilidad que un cliente escogido al azar se dé de baja es de un 2 %.

- ¿Cuál es la probabilidad que un individuo escogido al azar dé positivo en el test?
 ¿Cuál es la probabilidad que un individuo escogido al azar se dé de baja y dé positivo en el test?
 ¿Cuál es la probabilidad que un individuo que dé negativo en el test se dé de baja?

1.3. Bayes

1.3.1. Fórmula de Bayes

Teorema de Bayes

Sean Ay Bdos sucesos. SiP(B)>0,entonces

$$\begin{array}{ll} P(A|B) & = & \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} \\ \\ & = & \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(A^c) \cdot P(B|A^c)} \end{array}$$

Example 1.16, Ejercicio

Demostrar el teorema de Bayes utilizando que

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \cdots$$

Teorema de Bayes generalizado

Sea A_1,A_2,\dots,A_n una partición de $\Omega.$ Sea B un suceso tal que P(B)>0. Entonces (para cualquier $i=1,2,\dots,n)$:

$$\begin{array}{ll} P(A_i|B) & = & \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)} \\ & = & \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + \dots + P(A_n) \cdot P(B|A_n)} \end{array}$$

Example 1.17. Ejercicio

Demostrar el teorema de Bayes utilizando que

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \cdots$$

Example 1.18. Ejemplo: Test VIH

Un test para detección de VIH da positivo un 99 % de los casos en los que está presente y en un 5 % de los casos en los que el virus está ausente. En una población con un 0.5 % de infectados por VIH:

- ¿Cuál es la probabilidad que un individuo que haya dado positivo en el test esté infectado?
 ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo que haya dado negativo en el test no esté infectado?

Los sucesos del ejemplo son:

A: individuo infectado,

CAPÍTULO 1. PROBABILIDAD

Definimos los sucesos y datos del ejercicio:

- T: Dar positivo al test,
- B: darse de baja; P(B) = 0.02,
 P(T|B) = 0.975, P(T|B^c) = 0.12.

$$P(B) = 0.02, P(T|B) = 0.975, P(T|B^c) = 0.12.$$

¿Cuál es la probabilidad que un individuo escogido al azar dé positivo en el test?

$$P(T) = P(B) \cdot P(T|B) + P(B^c) \cdot P(T|B^c)$$

= $0.02 \cdot 0.975 + 0.98 \cdot 0.12 = 0.1371$.

¿Cuál es la probabilidad que un individuo escogido al azar se dé de baja y dé positivo en el test?

$$P(B \cap T) = P(B) \cdot P(T|B) = 0.02 \cdot 0.975 = 0.0195.$$

 ${}_{\stackrel{.}{b}}$ Cuál es la probabilidad que un individuo que dé negativo en el test se dé de baja?

$$\begin{split} P(B|T^c) &=& \frac{P(B\cap T^c)}{P(T^c)} = \frac{P(B) - P(B\cap T)}{1 - P(T)} \\ &=& \frac{0.02 - 0.0195}{1 - 0.1371} \approx 0.00058. \end{split}$$

$$P(B|T^c) = \frac{P(T^c|B) \cdot P(B)}{P(T^c|B) \cdot P(B) + P(T^c|B^c) \cdot P(B^c)},$$

donde

$$P(T^c|B) = 1 - P(T|B) = 0.025,$$

 $P(T^c|B^c) = 1 - P(T|B^c) = 0.88.$

1.4. Independencia de sucesos

1.4.1. Sucesos independientes

Sucesos Independientes

Diremos que los sucesos A y B son **independientes** si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

$$A_1,\dots,A_n$$
son sucesos **independientes** cuando, para toda subfamilia $A_{i_1},\dots,A_{i_k},$

$$P(A_{i_1}\cap \cdots \cap A_{i_k})=P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_k}).$$

Proposición:

Dados dos sucesos A y B con P(A), P(B) > 0, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- A y B son independientes.
- 2. P(A|B) = P(A). 3. P(B|A) = P(B).

Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- 1. A y B son independientes.
- A^c y B son independientes.
 A y B^c son independientes.
- A^c y B^c son independientes

Example 1.19. Ejemplo: Compra billete avión

En la web de viajes WEBTravel, el $55\,\%$ de los clientes compra billete de avión, el $20\,\%$ alojamiento en hotel, y el $60\,\%$ billete de avión o alojamiento en hotel. ¿Son los sucesos comprar billete de avión y comprar alojamiento en hotel independientes?

Los sucesos y datos del ejemplo son:

- A: comprar billete de avión, P(A) = 0.55. B: comprar alojamiento, P(B) = 0.2,

por tanto, podemos calcular las probabilidades siguientes

 $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$ = 0.55 + 0.2 - 0.6 = 0.15, $P(A) \cdot P(B) \ = \ 0.55 \cdot 0.2 = 0.11.$

Por tanto, concluimos que son dependientes, va que $P(A \cap B) \neq P(A) \cdot P(B)$,

1.4.2. Sucesos independientes vs disjuntos

Exercise 1.5. Ejercicio

- Dos sucesos A v B disjuntos, ; son necesariamente independientes?

- Dos sucesso A y B independientes, ¡son necesariamente independientes;
 Dos sucesso A y B independientes, ¡son necesariamente disjuntos?
 ∅ y un suceso cualquiera A, ¡son necesariamente independientes?
 ∆ Ω y un suceso cualquiera A, ¡son necesariamente independientes?
 ¿Qué condiciones se tienen que dar para que un suceso A sea independiente de sí mismo?

Capítulo 2

Variables Aleatorias

2.1. Introducción a las variables aleatorias

- \bullet Hasta ahora nuestros sucesos han sido de varios tipos: $\{C,+\}$ en la moneda, nombres de periódicos, ángulos en una ruleta, número de veces que sale cara en el lanzamiento de una moneda
- Necesitamos estandarizar de alguna manera todos estos sucesos. Una solución es asignar a cada suceso un cierto conjunto de números reales, es decir, convertir todos los sucesos en sucesos de números reales para trabajar con ellos de forma unificada.
- Para conseguirlo utilizaremos unas funciones que transformen los elementos del espacio muestral en números; estas funciones son las variables aleatorias.

2.1.1. Definición de variable aleatoria

Comenzaremos dando una definición poco rigurosa, pero suficiente, de variable aleatoria.

Variable Aleatoria (definición práctica)

Una variable aleatoria (v.a.) es una aplicación que toma valores numéricos determinados por el resultado de un experimento aleatorio.

Notación:

- Normalmente representaremos las v.a. por letras mayúsculas $X,Y,Z\dots$ Los valores que "toman" las v.a. los representaremos por letras minúsculas (las mismas en principio) x, y, z ...

Example 2.1. Eiemplo: Dado seis caras

Lanzamos un dado convencional de parchís y el espacio muestral del experimento es

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Una v.a. $X:\Omega\to\mathbb{R}$ sobre este espacio queda definida por

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

$$X(1) = 1, X(2) = 2, X(3) = 3,$$

 $X(4) = 4, X(5) = 5, X(6) = 6.$

- Ahora el suceso $A=\{2,4,6\}$, es decir "salir número par", es equivalente a $\{X=2,X=4,X=6\}$. El suceso $B=\{1,2,3\}$, es decir "salir número inferior o igual a 3" es en términos de la v.a. $\{X=1,X=2,X=3\}$ o también $\{X\leq 3\}$.

Example 2.2. Ejemplo: Juego lanzamiento anilla

Consideremos el experimento lanzar una anilla al cuello de una botella. Si acertamos a ensartar la anilla en la botella, el resultado del experimento es éxito y fracaso en caso contrario

El espacio muestral asociado a este experimento será $\Omega = \{$ éxito, fracaso $\}$. Construyamos la siguiente

 $X : \{\text{éxito, fracaso}\} \rightarrow \mathbb{R}$

definida por

X(éxito) = 1 y X(fracaso) = 0.

2.1.2. Tipos de variables aleatorias

Hay dos tipos fundamentales de variables aleatorias, las discretas y las continuas.

Damos a continuación una definición informal.

Variables Aleatorias Discretas y Continuas

- Una variable aleatoria es discreta si sólo puede tomar una cantidad numerable de valores con probabilidad positiva.
- Las variables aleatorias continuas toman valores en intervalos
- También existen las variables aleatorias mixtas; con una parte discreta y otra continua.

Example 2.3. Ejemplo: Tipos de variables aleatorias

Son variables aleatorias discretas:

- Número de artículos defectuosos en un cargamento.
- Número de clientes que llegan a una ventanilla de un banco en una hora.
- Número de errores detectados en las cuentas de una compañía
 Número de reclamaciones de una póliza de un seguro médico.
- Son variables aleatorias continuas:

 - Renta anual de una familia.
 Cantidad de petróleo importado por un país.
 Variación del precio de las acciones de una compañía de telecomunicaciones.
 - Porcentaje de impurezas en un lote de productos químicos

39

41

2.2. Variables aleatorias discretas

2.2.1. Distribuciones de probabilidad para v.a. discretas.

- Pasamos ahora a describir el comportamiento de la v.a. Para ello utilizaremos distintas funciones
- que nos darán algunas probabilidades de la variable aleatoria.
 En el caso discreto, estas funciones son la de probabilidad y la función de distribución o de probabilidad acumulada.
- En el caso discreto, la función de probabilidad es la que nos da las probabilidades de los sucesos elementales de la v.a. que definimos a continuación.

Función de Probabilidad

La función de probabilidad (probability mass function o incluso abusando de notación probability density function) de una variable aleatoria discreta X a la que denotaremos por $P_X(x)$ está definida

$$P_X(x) = P(X = x),$$

es decir, la probabilidad de que X tome el valor $\boldsymbol{x}.$

Si X no asume ese valor x, entonces $P_{\nu}(x) = 0$.

Dominio de una variable aleatoria discreta

El conjunto

$$D_X = \{x \in \mathbb{R} \mid P_X(x) > 0\}$$

recibe el nombre de dominio de la v.a. y son los valores posibles de esta variable.

En el caso discreto lo más habitual es que $X(\Omega) = D_X$.

Example 2.4. Ejemplo: Juego del parchís

Lanzamos un dado de parchís una vez, en esta ocasión representaremos los sucesos elementales por el número de puntos de la cara obtenida, tenemos que

 $\Omega = \{\text{1-puntos,2-puntos,3-puntos,4-puntos,5-puntos,6-puntos}\},$

y la variable aleatoria $X:\Omega\to\mathbb{R}$ viene definida por

$$X(i-puntos) = i para i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Supongamos que el dado está bien balanceado. Entonces

$$P_X(1) = P_X(2) = P_X(3) = P_X(4) = P_X(5) = P_X(6) = \frac{1}{6}$$

Concretamente:

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{6} & \text{si } x=1,2,3,4,5,6 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Su dominio es

$$D_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

2.2. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Example 2.7. Ejemplo: Lanzamiento moneda

Lanzamos al aire tres veces, de forma independiente, una moneda perfecta. El espacio muestral de este experimento es

$$\Omega = \{ccc, cc+, c+c, +cc, c++, +c+, ++c, +++\}$$

(expresados en orden de aparición).

Este espacio tiene todos los sucesos elementales equiprobables.

Consideremos la variable aleatoria asociada a este experimento:

X = número de caras en los tres lanzamientos

Su función de probabilidad es:

$$\begin{array}{l} P(X=0) = P(\{+++\}) = \frac{1}{8}, \\ P(X=1) = P(\{c++,+c+,++c\}) = \frac{3}{8}, \\ P(X=2) = P(\{cc+,c+c,+cc\}) = \frac{3}{8}, \\ P(X=3) = P(\{ccc\}) = \frac{1}{8}. \end{array}$$

Podemos reescribir la función de probabilidad de X de forma simplificada:

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{8}, & \text{si } x = 0, 3, \\ \\ \frac{3}{8}, & \text{si } x = 1, 2, \\ \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Efectivamente los valores de la función de distribución suman 1:

$$\sum_{x=0}^{3} P_X(x) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1.$$

Distribución de Probabilidad

La función de distribución de probabilidad (acumulada) de la v.a. X (de cualquier tipo; discreta o continua) $F_X(x)$ representa la probabilidad de que X tome un menor o igual que x, es decir,

$$F_X(x)=P(X\leq x).$$

Esta función también se denomina función de distribución de probabilidad o simplemente función de distribución de una v.a., y en inglés cumulative distribution function por lo que se abrevia con el acrónimo cdf.

Propiedades de la Función de Distribución

Sea X una v.a. y F_X su función de distribución:

1.
$$P(X>x)=1-P(X\le x)=1-F_X(x).$$
 2. Sea a y b tales que $a< b, \ P(a< X\le b)=P(X\le b)-P(X\le a)=F_X(b)-F_X(a).$

Example 2.5. Ejemplo: Lanzamiento moneda

Sea X la v.a. asociada al lanzamiento de una moneda. Su espacio muestral es $\Omega = \{c, +\}$, la v.a. queda

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{si } \omega = c, \\ 0 & \text{si } \omega = +. \end{cases}$$

Su función de probabilidad es:

$$P_X(x) = P(X=x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{si } x = 0, 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Finalmente su dominio es $D_X = \{0, 1\}$

Example 2.6. Ejemplo: Urna con bolas

Tenemos una ur
na con tres bolas rojas, una negra y dos blancas. Realizamos una extracción y observamos el color de la bola. Entonces, un espacio muestral es

$$Ω = {roja, blanca, negra}.$$

Una variable aleatoria asociada al experimento es:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega = roja, \\ 2, & \text{si } \omega = negra, \\ 3, & \text{si } \omega = blanca. \end{cases}$$

La función de probabilidad es

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{3}{6}, & \text{si } x = 1, \\ \frac{1}{6}, & \text{si } x = 2, \\ \frac{2}{6}, & \text{si } x = 3, \\ 0, & \text{en otro cas} \end{array} \right.$$

El dominio de la v.a. X es $D_X = \{1, 2, 3\}$.

Propiedades básicas de la función de probabilidad

Sea X una v.a. discreta $X:\Omega\to\mathbb{R}$ con dominio D_X . Su función de probabilidad P_X verifica las siguientes propiedades:

$$\begin{array}{ll} \bullet & 0 \leq P_X(x) \leq 1, \ \mathrm{para\ todo}\ x \in \mathbb{R}. \\ \bullet & \sum\limits_{x \in D_X} P_X(x) = 1. \end{array}$$

•
$$\sum_{x \in D} P_X(x) = 1$$
.

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

Demostración

42

Tenemos que el complementario de X mayor que x es: $\overline{\{X>x\}}=\{X>x\}^c=\{X\leq x\}.$ Además,

$$P(X>x)=1-P(\overline{\{X>x\}})=1-P(X\leq x)=1-F_X(x),$$

lo que demuestra la primera propiedad.

Por otro lado, que X se encuentre entre dos valores a y b es $\{a < X \le b\} = \{X \le b\} - \{X \le a\}$. Ahora

$$\begin{split} P(a < X \leq b) &= P(\{X \leq b\} - \{X \leq a\}) \\ &= P(\{X \leq b\}) - P(\{X \leq a\}) \\ &= F_X(b) - F_X(a). \end{split}$$

Más propiedades de la Función de Distribución

Sea ${\cal F}_X$ la función de distribución de una v.a. X entonces:

- 0 $\leq F_X(x) \leq 1$. La función F_X es no decreciente. La función F_X es continua por la derecha. Si denotamos por $F_X(x_0^-) = \lim_{x \to x_0^-} F(x)$, entonces se cumple que $P(X < x_0) = F_X(x_0^-)$ y que $\begin{array}{l} P(X=x_0)=F_X(x_0)-F_X(x_0^-).\\ \bullet \ \ \text{Se cumple que } \lim_{x\to\infty}F_X(x)=1; \lim_{x\to-\infty}F_X(x)=0. \end{array}$
- Toda función
 ^{x→∞} F verificando las propiedades anteriores es función de distribución de alguna v.a.
- $\label{eq:linear_equation} \begin{array}{l} X.\\ \bullet \ P(X>x) = 1 F_X(x).\\ \bullet \ \mathrm{Dados}\ a,b \in \mathbb{R}\ \mathrm{con}\ a < b, \end{array}$
 - $P(a < X < b) = F_Y(b) F_Y(a).$

${\bf Advertencia\ desigual dades\ estrictas}$

En las propiedades anteriores no se pueden cambiar, en general, las desigualdades de estrictas o no

Veamos qué propiedades tenemos cuando se cambian estas desigualdades.

Dada una ${\cal F}_X$ una función de distribución de la v.a. X y denotamos por

$$F_X(x_0^-) = \lim_{x \to x_-} F_X(x),$$

entonces se cumplen las siguientes igualdades:

- $\begin{array}{l} \bullet \ P(X=x) = F_X(x) F_X(x^-). \\ \bullet \ P(a < X < b) = F_X(b^-) F_X(a). \\ \bullet \ P(a \le X < b) = F_X(b^-) F_X(a^-). \\ \bullet \ P(X < a) = F_X(a^-). \\ \bullet \ P(X < a) = F_X(a^-). \\ \bullet \ P(a \le X \le b) = F_X(b) F_X(a^-). \end{array}$

43

45

• $P(X \ge a) = 1 - F_X(a^-)$.

- $P(X \geq a) = 1 F_X(a^-)$. Si F_X es continua en x es tiene que P(X = x) = 0. Así que si la v.a. es continua $P(X \leq a) = P(X < a) + P(X = a) = P(X < a) y$ propiedades similares. Sea X una variable aleatoria discreta que con dominio D_X y que tiene por función de probabilidad $P_X(x)$ entonces su función de distribución $F_X(x_0)$ es

$$F_X(x_0) = \sum_{x \in T} P_X(x),$$

donde \sum indica que sumamos todos los $x\in D_X$ tales que $x\leq x_0.$

Demostración

Si X es continua

$$P(X=a) = F(a) - F(a^-) = F(a) - F(a) = 0, \\$$

por lo tanto

$$P(X \le a) = P(X < a) + P(X = a) = P(X < a) + 0 = P(X < a),$$

lo que demuestra la primera propiedad.

Para demostrar la segunda basta hacer

$$F_X(x_0) = P(X \leq x_0) = P\left(\bigcup_{x \leq x_0; x \in D_X} \{x\}\right) = \sum_{x \leq x_0} P(X = x) = \sum_{x \leq x_0} P_X(x).$$

Example 2.8. Ejemplo: dado (continuación)

En el experimento del dado se tiene que

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{1}{6}, & {\rm si} \ x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \\ 0, & {\rm en} \ {\rm el} \ {\rm resto} \ {\rm de} \ {\rm casos.} \end{array} \right. \, ,$$

por lo tanto.

$$F_X(x) = P(X \le x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 1, \\ \frac{1}{6}, & \text{si } 1 \le x < 2, \\ \frac{2}{6}, & \text{si } 2 \le x < 3, \\ \frac{3}{6}, & \text{si } 3 \le x < 4, \\ \frac{4}{6}, & \text{si } 4 \le x < 5, \\ \frac{3}{6}, & \text{si } 5 \le x < 6, \\ 1, & \text{si } 6 \le x. \end{array} \right.$$

Calculemos más detalladamente algún valor de F_X , por ejemplo

$$\begin{array}{ll} F_X(3.5) &=& P(X \leq 3.5) = P(\{X=1\} \cup \{X=2\} \cup \{X=3\}) \\ &=& P(\{X=1\}\} + P(\{X=2\}) + P(\{X=3\}) \\ &=& \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \end{array}$$

2.2. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Si $n \to \infty$ se tiene que $\lim_{n \to \infty} \frac{n_x}{n} = P_X(x)$.

Por lo tanto
$$E(X) = \lim_{n \to \infty} \sum_{x=1}^6 x \cdot \frac{n_x}{n}$$

Entonces el valor esperado en una v.a. discreta puede entenderse como el valor promedio que tomaría una v.a. en un número grande de repeticiones.

Example 2.10. Ejemplo: Erratas en un texto

Sea X el número de erratas en una página de un texto, con dominio $D_X = \{0,1,2\}.$

Resulta que

$$P(X=0)=0.42,\ P(X=1)=0.4,\ P(X=2)=0.18.$$

entonces

$$E(X) = 0 \cdot 0.42 + 1 \cdot 0.4 + 2 \cdot 0.18 = 0.76.$$

Elegida una página del texto al azar esperamos encontrar 0.76 errores por página.

Supongamos que el editor nos paga 2 euros por cada página que encontremos con 1 error y 3 euros por cada página con dos errores (y nada por las páginas correctas) ¿Cuánto esperamos cobrar si analizamos

$$0 \cdot 0.42 + 2 \cdot 0.4 + 3 \cdot 0.18 = 1.34$$

Esperanzas de funciones de variables aleatorias discretas

Sea Xuna v.a. discreta con función de probabilidad P_X y de distribución $F_X.$ Entonces el ${\bf valor}$ esperado de una función g(x) es :

$$E(g(X)) = \sum_x g(x) \cdot P_X(x).$$

Propiedades de los valores esperados

- $\begin{array}{ll} \bullet & E(k) = k \text{ para cualquier constante } k. \\ \bullet & \text{Si } a \leq X \leq b \text{ entonces } a \leq E(X) \leq b. \end{array}$
- Si X es una v.a. discreta que toma valores enteros no negativos entonces $E(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} (1

Exercise 2.1. Ejercicio

La demostración de las propiedades anteriores se deja como ejercicio.

o de otra forma,

$$\begin{split} F_X(3.5) &=& \sum_{x \leq 3.5} P_X(x) = \sum_{x=1}^3 P(X=x) \\ &=& \sum_{x=1}^3 \frac{1}{6} = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}. \end{split}$$

Propiedades de la función de distribución

Sea Xuna variable con función de distribución ${\cal F}_X$ entonces:

- Si x < x', entonces $F_X(x) \le F_X(x')$, es decir, es una función creciente, no necesariamente estrictamente creciente.
- $\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ y $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1$.
- Es continua por la derecha: $\lim_{x \to +\infty} F_X(x) = F_X(x_0)$.

2.2.2. Valores esperados o esperanza

Al igual que en la estadística descriptiva se utilizan distintas medidas para resumir los valores centrales y para medir la dispersión de una muestra, podemos definir las correspondientes medidas para variables aleatorias.

A estas medidas se les suele añadir el adjetivo poblacionales mientras que a las que provienen de la

Por ejemplo, podemos buscar un valor que resuma toda la variable. Este valor es el que "*esperamos*" que se resuma la v.a. o esperamos que las realizaciones de la v.a. queden cerca de él. Veamos su definición formal.

Esperanza de una variable aleatoria discreta

El valor **esperado o esperanza** (expected value en inglés) E(X) de una v.a. discreta X, se define

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x P_X(x).$$

En ocasiones se denomina **media** (mean en inglés) poblacional o simplemente media y muy frecuentemente se la denota $\mu_X=E(X)$ o simplemente $\mu=E(X)$.

Example 2.9. Ejemplo: lanzamiento de un dado n veces

Supongamos que lanzamos un dado n veces y obtenemos unas frecuencias absolutas n_i para el resultado i con $i=1,\dots,6$. Sea X la v.a. que nos representa el valor de una tirada del dado.

Calculemos la media aritmética (o media muestral) de los datos

$$\overline{x} = \frac{1 \cdot n_1 + 2 \cdot n_2 + 3 \cdot n_3 + 4 \cdot n_4 + 5 \cdot n_5 + 6 \cdot n_6}{n} = \sum_{x=1}^6 x \cdot \frac{n_x}{n}.$$

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

Example 2.11. Ejemplo: paleta de colores aleatoria

Supongamos que estamos sentados delante de nuestro ordenador con un amigo y le decimos que en dos $\overline{}$ minutos podemos programar una paleta para poner colores a unos gráfico

Queremos que la paleta tenga dos botones con las opciones color rojo y color azul. Como hemos programado a gran velocidad resulta que el programa tiene un error; cada vez que se abre la paleta los colores se colocan al azar (con igual probabilidad) en cada botón, así que no sabemos en qué color

Además, como nos sobraron 15 segundos para hacer el programa y pensando en la comodidad del usuario, la paleta se cierra después de haber seleccionado un color y hay que volverla a abrir de nuevo.

La pregunta es: ¿cuál es el valor esperado del número de veces que hemos pinchar el botón de color azul antes de obtener este color?

Llamemos X al número de veces que pinchamos en el botón azul (y nos sale rojo) hasta obtener el primer azul. La variable X toma valores en los enteros no negativos. Su función de probabilidad queda

$$P_X(x) = P(X = x) = P(\overbrace{rojo, rojo}^x, \underbrace{veces}_{o, \dots, rojo}, azul) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1}.$$

Series geométricas

Una progresión geométrica de razón r es una sucesión de la forma

$$r^0, r^1, \dots, r^n, \dots.$$

La serie geométrica es la suma de todos los valores de la progresión geométrica $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$

Propiedades

 \blacksquare Las sumas parciales desde el término n_0 al n de una progresión geométrica valen

$$\sum_{k=n_0}^{n} r^k = \frac{r^{n_0} - r^n r}{1 - r}.$$

Si |r| < 1 la serie geométrica es convergente

$$\sum_{k=0}^{+\infty} r^{k} = \frac{1}{1 - r^{k}}$$

 \blacksquare En el caso en que se comience en n_0 se tiene que

$$\sum_{k=n_0}^{+\infty} r^k = \frac{r^{n_0}}{1-r}$$

 \bullet Si |r|<1 también son convergentes las derivadas, respecto de r, de la serie geométrica y convergen a la derivada correspondiente. Así tenemos que

$$\begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{+\infty} r^k \end{pmatrix}' = \sum_{k=1}^{+\infty} k r^{k-1} = \left(\frac{1}{1-r}\right)' = \frac{1}{(1-r)^2} \\ \left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k \right)'' = \sum_{k=2}^{+\infty} k (k-1) r^{k-2} = \left(\frac{1}{1-r}\right)'' = \frac{2}{(1-r)^3}.$$

Example 2.12. Ejemplo: paleta de colores (continuación)

Si seguimos con el ejemplo de la paleta de colores, su esperanza es:

$$\begin{split} E(X) &= \sum_{x=0}^{+\infty} x \cdot P(X=x) = \sum_{x=0}^{+\infty} x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^{\sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 1. \end{split}$$

Ahora calculemos su función de distribución

$$\begin{array}{rcl} F_X(x) & = & P(X \leq x) = \sum_{k=0}^x P(X=k) = \sum_{k=0}^x \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} \\ & = & \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}^{x+1} \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} \,. \end{array}$$

Como la variable toma valores enteros positivos, podemos calcular su valor esperado de esta otra

$$E(X) = \sum_{x=0}^{+\infty} (1 - F_X(x)) = \sum_{x=0}^{+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$$

Exercise 2.2. Ejercicio

Calculad el valor esperado de la variable

Y=número de intentos para conseguir el color azul.

Momentos de orden m

Llamaremos **momento de orden** m respecto al punto ${\cal C}$ a

$$E\left((X-C)^m\right)$$
.

2.2. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Example 2.13. Ejemplo: número de errores (continuación)

Calculemos en el ejemplo anterior la varianza del número de errores.

Recordemos que:

$$P(X=0)=0.42,\ P(X=1)=0.4,\ P(X=2)=0.18,$$

v que

$$E(X) = 0.76.$$

Entonces:

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) - (0.76)^2.$$

Ahora necesitamos calcular

$$E(X^2) = 0^2(0.41) + 1^2(0.4) + 2^2(0.18) = 0.4 + 0.72 = 1.12, \\$$

y por lo tanto

$$Var(X) = E(X^2) - (0.76)^2 = 1.12 - 0.5776 = 0.542,$$

$$\sqrt{Var(X)} = \sqrt{0.542}$$

En resumen $\sigma_X^2=0.542$ y $\sigma_X=\sqrt{0.542}.$

Más propiedades de la varianza

- $Var(X) \geq 0$. $Var(cte) = E(cte^2) (E(cte))^2 = cte^2 cte^2 = 0$. El mínimo de $E((X-C)^2)$ se alcanza cuando C = E(X) y es Var(X). Esta propiedad es una de las que hace útil a la varianza como medida de dispersión.

Se deja como ejercicio la demostración de estas propiedades.

2.2.4. Transformaciones lineales.

Transformación lineal

Un cambio de variable lineal o transformación lineal de una v.a. X es otra v.a. Y=a+bX

Esperanza de una transformación lineal

Sea X una v.a. con $E(X) = \mu_X$ y $Var(X) = \sigma_X^2$ y $a,b \in \mathbb{R}$. Entonces si Y = a + bX:

- $\begin{array}{l} \bullet \ E(Y) = E(a+bX) = a+b \cdot E(X) = a+b \cdot \mu_X. \\ \bullet \ Var(Y) = Var(a+bX) = b^2 \cdot Var(X) = b^2 \cdot \sigma_X^2. \end{array}$

- \bullet Cuando C=0 los momentos reciben el nombre de **momentos respecto al origen**
- Cuando C = E(X) reciben el nombre de momentos centrales o respecto de la media. Luego la esperanza es el momento de orden 1 respecto al origen. Estos momentos son la versión poblacional de los momentos que vimos en el curso de estadística descriptiva, recibiendo estos último el nombre de momentos muestrales.

Resumen de conceptos

- Hemos descrito el comportamiento aleatorio de una v.a. discreta mediante sus funciones de pro-
- babilidad P_X y de distribución F_X .

 También tenemos un valor central; el valor esperado E(X).

 Como medida básica nos queda definir una medida de lo lejos que están los datos del valor central, E(X). Una de estas medidas es la varianza de X.

2.2.3. Medidas de la variabilidad

Sea X una v.a. Llamaremos **varianza** de X a

$$Var(X) = E((X - E(X))^{2})$$

Por lo tanto, la varianza es el momento central de orden 2.

De forma frecuente se utiliza la notación

$$\sigma_X^2 = Var(X)$$

A la raíz cuadrada positiva de la varianza

$$\sigma_X = +\sqrt{Var(X)}$$
,

se la denomina desviación típica o estándar de X.

Propiedad

 $\bullet\,$ Si X es una v.a. discreta con función de probabilidad P_X su varianza es

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E((X-E(X))^2) = \sum_i (x-E(X))^2 \cdot P_X(x).$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_{-} x^2 \cdot P_X(X) - (E(X))^2$$

Demostración de b)

$$\begin{split} Var(X) & = & \sum_{x} (x - E(X))^2 \cdot P_X(x) = \sum_{x} (x^2 - 2xE(X) + (E(X)^2) \cdot P_X(x) \\ & = & \sum_{x} x^2 \cdot P_X(x) - E(X) \sum_{x} 2x \cdot P_X(x) + (E(X)^2) \sum_{x} P_X(x) \\ & = & E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2. \end{split}$$

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

•
$$\sigma_Y = \sqrt{Var(Y)} = \sqrt{b^2 \cdot Var(X)} = |b| \cdot \sigma_X$$
.

Demostración

$$\begin{split} E(Y) &=& E(a+bX) = \sum_x (a+b\cdot X) \cdot P_X(x) \\ &=& a \sum_x P_X(x) + b \sum_x x \cdot P_X(x) \\ &=& a+b \cdot E(X) = a+bu \,. \end{split}$$

Exercise 2.4. Ejercicio

Las demostración de las demás propiedades se dejan como ejercicio.

2.3. Variables aleatorias continuas

Como ya hemos dicho las variables aleatorias continuas toman valores en intervalos o áreas.

Lo más habitual es que estas variables tengan función de distribución continua y derivable (salvo a los mejor en una cantidad finita o numerable de puntos).

En lo que sigue supondremos que la función de distribución de variables aleatorias continuas cumplen estas propiedades

Notemos que si X es una v.a. con función de distribución continua se tiene que $P(X=x_0)=F_X(x_0)-F(x_0^-)=0$. Por lo que no tiene sentido definir función de probabilidad.

En general tendremos que $P(X < x_0) = P(X \le x_0).$

Por otra parte podemos utilizar una regla parecida del cociente entre casos favorables y casos posibles de Laplace pero en este caso el conteo se hace por la medida de los casos posibles partida por la medida de los casos favorables.

Veamos un ejemplo de v.a. continua, que ampliaremos en el tema siguiente, en el que se utilizan todos

Example 2.14. Ejemplo: distancia de un dardo al centro de la diana

Consideremos la v.a. continua X = distancia del dardo al centro de la diana.

Supongamos que lanzamos un dardo a una diana de radio 1, de forma que sea equiprobable cualquier distancia al centro (¡Cuidado! esto no es equivalente a que cualquier punto de la diana sea equiprobable).

$$F_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ x, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 1, & \text{si } x \geq 1. \end{array} \right.$$

- $\begin{tabular}{l} \bullet & {\rm C.F.} \ longitud \ favorable \ {\rm es} \ x-0. \\ \bullet & {\rm C.P.} \ longitud \ posible \ {\rm es} \ 1-0. \\ \end{tabular}$

51

53


Luego

$$P(X \le x) = \frac{C.F.}{C.P.} = \frac{x-0}{1-0} = x.$$

curve(punif(x,0,1),xlim=c(-1,2),col="blue

main="Función de distribución de una v.a. uniforme en el intervalo unidad.")

Función de distribución de una v.a. uniforme en el intervalo unidad



2.3.1. Propiedades

En las variables continuas los sucesos del tipo $\{X \leq x\}$ y $\{X < x\}$ tendrán la misma probabilidad, y otros tipos de sucesos similares también. Algunas de estas propiedades se explicitan en la siguiente proposición.

Propiedades

Dada una v.a. continua X se tiene que:

- $\begin{array}{l} \bullet \ P(X \leq b) = P(X < b). \\ \bullet \ P(X < b) = P(X < a) + P(a < X < b). \\ \bullet \ P(a < X < b) = P(X < a) P(X < a). \end{array}$

Demostración:

La primera es evidente P(X < b) = P(X < b) + P(X = b) = P(X < b).

2.3. VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Función de distribución de una variable aleatoria

Sea X una v.a. con función de distribución F_X . Sea $f:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función de densidad tal que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$
, para todo $x \in \mathbb{R}$.

Entonces Xes una variable aleatoria continua y f_X es la densidad de la v.a. X

El conjunto $D_X=\{x\in\mathbb{R}|f_x(x)>0\}$ recibe el nombre de soporte o dominio de la variable aleatoria

Ejemplo: diana (continuación)

En nuestro ejemplo, la función fes una densidad

$$f_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ 1, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 0, & \text{si } 1 \leq x, \end{array} \right.$$

que es la densidad de X. En efecto:

• Si
$$x \leq 0$$
, entonces $\int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = 0$.

$$\bullet$$
 Si $0 \leq x \leq 1,$ entonces $\int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^x 1 \, dt = x.$

• Si
$$x \geq 1$$
, entonces $\int_{-\infty}^x f_X(t) dt = \int_0^1 1 \, dt = 1$.

Por lo tanto, $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

curve(dunif(x,0,1),xlim=c(-0.5,1.5),col="blue", main="Densidad de la distribución uniforme en [0,1]")

Para demostrar la segunda, tenemos

$$\{X \leq a\} \cap \{a < X < b\} = \emptyset,$$

$$\{X \leq a\} \cup \{a < X < b\} = \{X < b\},$$

entonces

$$\begin{array}{rcl} P(X < b) & = & P(\{X \le a\} \cup \{a < X < b\}) \\ & = & P(X \le a) + P(a < X < b) \\ & = & P(X < a) + P(a < X < b). \end{array}$$

Exercise 2.5. Ejercicio

La demostración de la tercera propiedad es similar a la segunda pero aplicando la primera. La dejamos

Propiedades de la función de distribución

Las propiedades anteriores y combinaciones de ellas se pueden escribir utilizando la función de distribución de X:

Propiedades de la Función de Distribución

Dada una variable aleatoria continua se tiene que

- $\begin{array}{l} \bullet \ \ F_X(b) = F_X(a) + P(a < X < b). \\ \bullet \ \ P(a < X < b) = F_X(b) F_X(a). \\ \bullet \ \ P(a \le X \le b) = F_X(b) F_X(a). \end{array}$

Exercise 2.6. Ejercicio Se deja la demostración como ejercicio.

Example 2.15. Ejemplo: diana (continuación)

En el ejemplo de la diana:

$$P(0.25 < X < 0.3) = F_X(0.3) - F_X(0.25) = 0.3 - 0.25 = 0.05. \label{eq:problem}$$

2.3.2. Función de densidad

Función de densidad

Una función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ es una función de densidad sobre \mathbb{R} si cumple que


- $f_X(x) \ge 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. f es continua salvo a lo sumo en una cantidad finita de puntos sobre cada intervalo acotado de

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = 1.$$

54

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

Densidad de la distribución uniforme en [0,1]



2.3.3. Utilidad de la función de densidad

La función de densidad nos permite calcular diversas probabilidades.

Propiedades de la función de densidad

 \blacksquare Sea Xuna v.a. continua con función de distribución F_X y de densidad $f_X,$ entonces

$$P(a < X < b) = P(a < X \le b) = P(a \le X < b) =$$

$$P(a \le X \le b) = \int_{a}^{b} f_X(x) dx.$$

 \blacksquare Si A es un subconjunto de $\mathbb R$ entonces

$$P(X \in A) = \int_{A} f(x)dx = \int_{A \cap D_{X}} f(x)dx.$$

Propiedades de la función de densidad

Sea Xuna v.a. continua con función de distribución ${\cal F}_X$ y de densidad $f_X,$ entonces:

- Si f_x es continua en un punto $x,\,F_X$ es derivable en ese punto y $F_X'(x)=f_X(x)$. P(X=x)=0 para todo $x\in\mathbb{R}.$

Exercise 2.7. Ejercicio

Comprobar estas propiedades en el ejemplo de la diana.

Example 2.16. Ejemplo: tiempo ejecución de un proceso.

Sea X = tiempo de ejecución de un proceso. Se supone que X sigue una distribución uniforme en dos unidades de tiempo, si tarda más el proceso se cancela

Calculemos la función de densidad y de distribución de la v.a \boldsymbol{X} .

$$F_X(x) = P(X \le x) = \frac{\text{Casos Favorables}}{\text{Casos Posibles}} = \frac{x}{2}$$

Luego su función de distribución es

$$F_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{x}{2}, & \text{si } 0 < x < 2, \\ 1, & \text{si } 2 \leq x. \end{array} \right.$$

Su función de densidad por su lado es:

$$f_X(x) = F_X'(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \frac{1}{2}, & \text{si } 0 < x \leq 2, \\ 0, & \text{si } 2 \leq x. \end{array} \right.$$

- $f_X(x) \ge 0$, y tiene un conjunto finito de discontinuidades: $\{0,2\}$.
- $F_X(x)=\int_{-\infty}^x f_X(t)dt,$ para todo $x\in\mathbb{R}.$ (Ejercicio: resolverlo gráficamente.)

Calcular la probabilidad de que uno de nuestros procesos tarde más de una unidad de tiempo en ser procesado. Calcular también la probabilidad de que dure entre 0.5 y 1.5 unidades de tiempo

2.3.4. Esperanza y varianza para variables aleatorias continuas

Los mismos comentarios y definiciones que se dieron en la sección correspondiente del tema de estadística descriptiva son aplicables aquí,

Así que sólo daremos las definiciones, la forma de cálculo y algunos ejemplos.

En lo que sigue, salvo que diagamos lo contrario, X es una v.a. continua con función de densidad $f_X(x)$

Esperanza y a continuas

2.4. TRANSFORMACIONES DE VARIABLES ALEATORIAS

Example 2.18. Ejemplo: venta de vinos

En una empresa de venta de vinos por internet, sea X el número de litros de vino del país vendidos en un año. Supongamos que sabemos que E(X)=10000 y que Var(X)=100. Supongamos que los gastos fijos de distribución son 50,000 € y el beneficio por litro es de 10 € por botella. Definimos gastos fijos de distribución son 50.000 € y en penencio jT=10X-50000 que será el beneficio después de gastos.

Entonces la esperanza del beneficio es

$$E(T) = 10E(X) - 50000 = 50000,$$

$$Var(T) = 10^{2} Var(X) = 10000$$

2.4. Transformaciones de variables aleatorias

Muchas variables aleatorias son funciones de otras v.a. En lo que sigue resumiremos diversas técnicas para dada una v.a. X y una transformación Y = h(X) encontrar F_Y a partir de F_X .

Tranformaciones de v.a. discretas

Sea X una v.a. discreta con $X(\Omega)=\{x_1,x_2,\dots,x_n...\}$ y sea $h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ una aplicación. Entonces Y=h(X) es también una v.a. discreta. Además si P_X y F_X son las funciones de probabilidad y de distribución de X entonces

$$\begin{split} \bullet \ P_Y(y) &= \sum_{x_i \mid h(x_i) = y} P_X(x_i). \\ \bullet \ F_Y(y) &= \sum_{x_i \mid h(x_i) \le y} P_X(x_i). \end{split}$$

Desafortunadamente para variables no discretas, el resultado no es tan sencillo como la expresión anterior, pues la transformación de, por ejemplo, una v.a. continua puede ser continua, discreta, mixta.

Transformación de v.a. continuas en continuas

Sea X una v.a. continua cuya función de densidad es f_X . Sea $h: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación estrictamente monótona y derivable; por lo tanto, $h'(x) \neq 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$. Sea Y = h(X) la transformación de X por h. Entonces Y es una v.a. continua con función de densidad

$$f_Y(y) = \left. \frac{f_X(x)}{|h'(x)|} \right|_{x=h^{-1}(}$$

Densidad de una transformación de una v.a. continua

Sea X una v.a. continua cuya función de densidad es f_X . Sea

$$h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
,

una aplicación, no necesariamente monótona tal que

- sea derivable con derivada no nula,
- \bullet la ecuación h(x)=ytiene un número finito de soluciones $x_1,x_2,..,x_n,$

Su esperanza es:

$$E(X) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx.$$

 $\, \bullet \,$ Si g(x) es una función de la variable X entonces:

$$E(g(X)) = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f_X(x) dx.$$

Su varianza es:

$$Var(X)=\sigma_X^2=E((X-\mu_X)^2)=\int\limits_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu_X)^2f_X(x)dx.$$

Su desviación típica es:

$$\sigma_X = +\sqrt{\sigma_X^2}$$
.

Propiedades

- $\begin{array}{ll} \bullet & \sigma_X^2 \geq 0. \\ \bullet & Var(cte) = E(cte^2) (E(cte))^2 = cte^2 cte^2 = 0. \end{array}$
- $Var(x) = E(X^2) \mu_X^2 = \int x^2 f_X(x) dx \mu_X^2$
- \blacksquare El mínimo de $E((X-C)^2)$ se alcanza cuando C=E(X) y es Var(X).

Example 2.17. Ejemplo: diana (continuación)

Calcular μ_X y σ_X^2 en el ejemplo de la diana.

Resultado

$$\mu_X = \frac{1}{2}, \ E(X^2) = \frac{1}{3}, \ Var(X) = \frac{1}{12}.$$

Proposición

Sea X una v.a. continua con $E(X)=\mu_X$ y $Var(X)=\sigma_X^2$ sea $Y=a+b\cdot X$, donde $a,b\in\mathbb{R}$, es una nueva v.a. continua obtenida mediante una transformación lineal de X. Se verifican las mismas propiedades que en el caso discreto:

- $E(Y) = E(a+b\cdot X) = a+b\cdot E(X)$. $Var(Y) = Var(a+b\cdot X) = b^2\cdot Var(X)$. $\sigma_Y = [b]\cdot \sigma_X$. $Z = \frac{b\cdot \mu_X}{\sigma_X}$ es una transformación lineal de X de forma que

$$E(Z) = 0 \text{ v } Var(Z) = 1.$$

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

entonces:

$$f_Y(y) = \sum_{k=1}^{n} \frac{f_X(x)}{|h'(x)|}\Big|_{x=x_1}$$

Método general de transformación de v.a.

Cuando no podamos aplicar las propiedades anteriores intentaremos calcular primero la función de distribución de la transformación y luego su densidad

Notemos que en general si Y=g(X)es una v.a. transformación de la v.a. X entonces

$$F_Y(y) = P(Y \le y) = P(g(X) \le y).$$

Por ejemplo, si g es estrictamente creciente y continua

$$F_Y(y) = P(g(X) \le y) = P(X \le g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y)),$$

y si g es estrictamente decreciente v continua,

$$F_Y(y) = P(g(X) \le y) = P(X \ge g^{-1}(y)) = 1 - F_X(g^{-1}(y)).$$

2.5. Desigualdades de Markov y de Chebychev

En esta sección veremos distintas desigualdades que acotan determinadas probabilidades de una varia-

Estas desigualdades sirven en algunos casos para acotar probabilidades de determinados sucesos.

También son útiles desde el punto de vista teórico, por ejemplo para justificar que la varianza es una medida de la dispersión de los datos

2.5.1. Desigualdad de Markov

Sea X una v.a. positiva con E(X) finita. Entonces

$$P(X \ge a) \le \frac{E(X)}{a}$$
, para todo $a > 0$.

Demostración:

Si Xes continua y solo toma valores positivos

$$\begin{split} E(X) &=& \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^a x \cdot f_X(x) dx + \int_a^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \\ &\geq \int_0^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx \geq a \int_0^{+\infty} f_X(x) dx = a \cdot P(X \geq a), \end{split}$$

de donde se sigue que

$$P(X \ge a) \le \frac{E(X)}{a}$$
.

Corolario

Sea X una v.a. con E(X) finita entonces para todo a>0

$$P(|X| \ge a) \le \frac{E(|X|)}{a}$$

Exercise 2.9. Ejercicio

Demuestra el corolario anterior a partir de la desigualdad de Markov.

2.5.2. Desigualdad de Chebychev

Designaldad de Chebychev

La desigualdad de Chebychev también se denomina de Chebyshov y en inglés Chebyshev.

Sea Xuna v.a. con $E(X)=\mu$ y $Var(X)=\sigma^2$ entonces para todo a>0,

$$P(|X - \mu| \ge a) \le \frac{\sigma^2}{a^2}$$
.

Demostración

Apliquemos la consecuencia de la desigualdad de Markov a la v.a. no negativa $Y^2=(X-\mu)^2$. Entonces

$$P(Y^2 \geq a^2) \leq \frac{E(Y^2)}{a^2} = \frac{E((X - \mu)^2)}{a^2} = \frac{Var(X)}{a^2} = \frac{\sigma^2}{a^2}$$

Por otra parte

$$P(Y^2 \geq a^2) = P(|Y| \geq a) = P(|X-\mu| \geq a),$$

hecho que, junto con la desigualdad anterior, demuestra el resultado.

Utilidad básica de la desigualdad de Chebychev

Supongamos que X es una v.a. con Var(X) = 0. Entonces, aplicando la desigualdad anterior,

$$P(|X - E(X)| \ge a) = 0$$
, para todo $a > 0$,

lo que implica que

$$P(X = E(X)) = 1.$$

por lo que probabilidad de que X sea constantemente E(X) es 1, hecho que nos confirma la utilidad de la varianza como una medida de la dispersión de los datos

2.6. CUANTILES DE VARIABLES ALEATORIAS

Dada una variable aleatoria X, si existe la inversa de la función de distribución de X, F_X^{-1} , el cuantil de orden p sería el valor que tiene la función F_X^{-1} en p: $x_p = F^{-1}(p)$

En caso de no existir la inversa, dado p, definimos el conjunto A_p como:

$$A_p = \{x \in \mathbb{R}, \ | \ F_X(x) \geq p\}$$

Entonces el cuantil p es el mínimo del conjunto A_p considerando sólo valores del dominio de la variable: $x_p = \min_{x \in D_Y} (A_p)$. Este mínimo siempre existirá y nos da una fórmula explícita para calcular los cuantiles de cualquier variable aleatoria.

Example 2.20. Ejemplo: variable aleatoria que nos da el resultado del lanzamiento de un

Sea X la variable aleatoria uniforme discreta que nos da el número de puntos obtenidos en el lanzamiento de un dado (seis caras numeradas del 1 al 6).

Su dominio es $D_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y su función de probabilidad es

$$P_X(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{si } x = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Su función de distribución es:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 1, \\ \frac{k}{6} & \text{si } k \leq x < k+1 \text{ para } x = 1, 2, 3, 4, 5, \\ 1, & \text{si } x \geq 6. \end{array} \right.$$

La función siguiente llamada \mathtt{ddado} nos define la función de probabilidad de X para un dado de n

Por ejemplo, el valor de ${\cal P}_X(0.5)$ sería:

ddado(0.5,n=6)

Γ17 O

y los valores de $P_X(i)$ para $i=1,\dots 10$ sería:

ddado(1:10,n=6)

- [1] 0.1666667 0.1666667 0.1666667 0.1666667 0.1666667 0.1666667 0.0000000
- [8] 0.0000000 0.0000000 0.0000000

La función pdado nos da la función de distribución de X:

Example 2.19. Ejemplo: tiempo de respuesta

Se sabe que el tiempo de respuesta medio y la desviación típica de un sistema multiusuario son 15 y 3 unidades de tiempo, respectivamente. Entonces:

$$P(|X-15| \geq 5) \leq \frac{9}{25} = 0.36.$$

Si substituimos a por $a\cdot \sigma$ en la desigualdad de Chebychev, nos queda:

$$P(|X - \mu| \ge a\sigma) \le \frac{\sigma^2}{(a\sigma)^2} = \frac{1}{a^2}$$

que es otra manera de expresar la desigualdad de Chebychev

Más formas de la desgualdad de Chebychev

La designaldad de Chebychev también se puede escribir de al menos dos maneras más

$$P(\mu - a \le X \le \mu + a) \ge 1 - \frac{\sigma^2}{a^2},$$

y tomado como $a=k\cdot\sigma,$

60

$$P(\mu - k \cdot \sigma \le X \le \mu + k \cdot \sigma) \ge 1 - \frac{1}{k^2}$$
.

Tomando la segunda expresión que hemos visto para la desigualdad de Chebychev para distintos valores de k > 0, tenemos la siguiente tabla:

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline k & P(|X-E(X)| \geq k \cdot \sigma) \\ \hline 1 & \leq 1 \\ 2 & \leq 0.25 \\ 3 & \leq 0.111 \\ 4 & \leq 0.0025 \\ \hline \end{array}$$

Por ejemplo para k=2, esta designaldad se puede interpretar como que, dada una v.a. X con cualquier distribución que tenga E(X) y Var(X) finitos, la probabilidad de que un valor se aleje de la media μ más de a=2 desviaciones típicas es menor o igual que 0.25.

Es decir sólo el 25 % de los valores estarán alejados de la media más de 2σ , jsea cual sea la distribución de la v.a.!

2.6. Cuantiles de variables aleatorias

Si X es una v.a. con dominio D_X y 0 , llamaremos cuantil de orden <math>p al menor valor perteneciente al dominio $x_n \in D_X$ tal que:

$$P(X < x_n) > p$$
.

En R, cada distribución X tiene la función $\mathtt{qX}(\mathtt{p},\dots)$ que devuelve precisamente el cuantil x_p tal que

CAPÍTULO 2. VARIABLES ALEATORIAS

```
pdado=function(x,n=6)
  t
sapply(x,FUN=function(y){ if (y<1){ return(0)}else{if(y>=n){return(i)} else
{return(sum(ddado(c(1:(floor(y))),n=n)))}})
```

Los valores de $F_X(i)$ para $i=0,\ldots,11$ serían:

pdado(0:11,6)

- [1] 0.0000000 0.1666667 0.3333333 0.5000000 0.6666667 0.8333333 1.0000000 [8] 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000

A continuación, construímos la función q
dado que nos calcula el cuantil p, para $0 \leq p \leq 1,$ de la variable X como el mínimo del conjunto A_p :

```
qdado=function(p,n=6){
sapply(p,FUN=function(pp=p,nn=n)
  if(pp<0 | pp>1) {return(NA)}
  else {
aux=pp>=pdado(1:n,nn)
  ifelse(all(!aux),return(1),return(max(which(pp>=pdado(1:n,nn)))))}}
```

Si p=1.5 o p=-1, la función anterior nos devuelve NA ya que ni 1.5 ni -1 están entre 0 y 1:

```
[1] NA
qdado(-1)
```

[1] NA

Los cuantiles $x_{0.1}$, $x_{0.5}$ $x_{0.6}$ y x_1 son: qdado(c(0.1,0.5,0.6,1))

[1] 1 3 3 6

Capítulo 3

Distribuciones Notables

En este tema estudiaremos diversos tipos de experimentos que son muy frecuentes y algunas de las variables aleatorias asociadas a ellos.

Estas variables reciben distintos nombres que aplicaremos sin distinción al tipo de población del experimento, a la variable o a su función de probabilidad, densidad o distribución

Empezaremos con las variables aleatorias discretas que se presentan con frecuencia, ya que están Enligicandias con situacionnes muy comunes como el número de caras en varios lanzamiento de una moneda, el número de veces que una maquina funciona hasta que se estropea, el número de clientes en una cola...

3.1. Distribuciones discretas

3.1.1. Distribución de Bernoulli

 $Consideremos un experimento con dos resultados posibles: \'{e}xito (E) y fracaso (F). El espacio de sucesos$

Supongamos que la probabilidad de éxito es P(E)=p, y naturalmente P(F)=1-p=q, con 0< p<1.

Consideremos la aplicación

$$X:\Omega=\{E,F\}\to\mathbb{R},$$

definida por $X(E) = 1, \ X(F) = 0.$

Su función de probabilidad es:

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 1-p=q, & \text{si } x=0, \\ p, & \text{si } x=1, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso} \end{array} \right.$$

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

65

Veamos los cálculos básicos usando la distribución Ber(p = 0.25) en R.

dbinom(0.size=1.prob=0.25)

dbinom(1,size=1,prob=0.25)

Γ11 0.25 rbinom(n=20, size = 1, prob=0.25)

El siguiente código dibuja las función de probabilidad y la de distribución de una Ber(p=0.25)El sguente codigo dibuja las funcion de probabilidad y la de distribucion de una Be
par(mfrow=c(1,2))
plot(x=c(0,1),y=dbinom(c(0,1),size=1,prob=0.25),
 ylim=c(0,1),xlim=c(-1,2),xlab="x",
 main="Función de probabilidad\n Ber(p=0.25)")
lines(x=c(0,0,1,1),y=c(0,0.75,0,0.25), type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(pbinom(x,size=1,prob=0.25),
 xlim=c(-1,2),col="blue",
 main="Función de distribución\n Ber(p=0.25)")
par(mfrow=c(1,1))

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Su función de distribución es

$$F_X(x) = P(X \le x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1 - p = q, & \text{si } 0 \le x < 1, \\ 1, & \text{si } 1 \le x. \end{array} \right.$$

Bajo estas condiciones, diremos que X es una v.a. Bernoulli o que sigue una ley de distribución de probabilidad Bernoulli de parámetro p.

Lo denotaremos por $X \equiv Ber(p)$ o también $X \equiv B(1, p)$.

 ${\bf A}$ este tipo de experimentos (éxito/fracaso) se les denomina experimentos Bernoulli.

Fue su descubridor un científico suizo Jacob Bernoulli, uno más de la de la conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la de la conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la de la conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la de la conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la de la conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Jacob Bernoulli, uno más de la del su conocida familia de científicos suizo Del su conocida familia de científicos de la del su conocida familia del su conosuizos Bernoulli.

Esperanza de una v.a. $X\ Ber(p)$

Su valor esperado es:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{1} x \cdot P(X = x) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p.$$

Calculemos también ${\cal E}(X^2)$:

$$E(X^2)=\sum_{x=0}^1 x^2\cdot P(X=x)=0^2\cdot (1-p)+1^2\cdot p=p.$$
 Varianza de una v.a. X $Ber(p)$

66

$$Var(X)=E(X^2)-\left(E(X)\right)^2=p-p^2=p\cdot (1-p)=p\cdot q.$$

Su desviación típica es:

$$\sqrt{Var(X)} = \sqrt{p \cdot (1-p)}$$
.


Resumen v.a con distribución Bernoulli

X Bernoulli	Ber(p)
$D_X =$	
$P_X(x) = P(X=x) =$	$\begin{cases} q & \text{si } x = 0 \\ p & \text{si } x = 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$
$F_X(x) = P(X \le x) =$	
E(X) = p	$Var(X) = p \cdot q$

Example 3.1. Ejemplo de Distribución Bernoulli

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

2.0



Gráficas interactivas Ber(p)

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
sliderInput("p_ber", label = "Probabilidad éxito p:",
    min = 0.01, max = 0.99, value = 0.25, step = 0.01)
renderPlot({
par(mfrow=c(1,2))
    p=input$p_ber
plot(x=c(0,1),y=dbinom(c(0,1),size=1,prob=p),
plat(x=(v,1),y=aniona(t(-0), x).xi=x=1,proop),
ylim=(c(-0),1),xiim=((-0),5,2),xiab="x",pch=21,
main=paste0(c("Funcion de probabilidad\n
Ber(p=",p,")",0cllapse=""),bg="black")
segments(x0=0,y0=0,xi=0,yi=1-p, col = "blue", lty =2)
segments(x0=1,y0=0,xi=1,yi=p, col = "blue", lty =2)
segments(x0=1,y0=0,xi=1,yi=p, col = "blue", lty =2)
segments(x0=-1,y0=p,xi=1,yi=p, col = "blue", lty =2)
segments(x0=1,y0=p,xi=1,yi=p, col = "blue", lty =2)
segments(x0=1,y0=p,xi=1,yi=p, col = "blue", lty =2)
y=pbinom(x,size=1,prob=p)
```

curve(pbinom(x,size=1,prob=p), xlim=c(-1,2),col="blue par(mfrow=c(1,1))
})

3.1.2. Distribución binomial

Si repetimos n veces de forma independiente un experimento Bernoulli de parámetro p, el espacio muestral Ω estará formado por cadenas de E's y F's de longitud n. Consideremos la v.a.:

$$X(\overline{EFFF...EEF}) =$$
 número de éxitos en la cadena.

A la variable aleatoria anterior se la conoce como distribución binomial de parámetros n y p, y lo denotaremos por $X \equiv B(n, p)$.

Función de probabilidad de una binomial

Su función de probabilidad es:

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}, & \text{ si } x = 0, 1, \dots, n, \\ 0, & \text{ en otro caso.} \end{array} \right.$$

Función de distribución de una binomial

Su función de distribución no tiene una fórmula cerrada. Hay que acumular la función de probabi-

$$\begin{split} F_X(x) &= P(X \leq x) &= \sum_{i=0}^x P_X(i) \\ &= \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq 0, \\ \sum\limits_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i} & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \leq x < k+1, \\ k = 0, 1, \dots, n, \\ 1, & \text{si } n \leq x. \end{array} \right. \end{split} \right. \end{split}$$

Números binomiales con R

Los números binomiales calculan el número de equipos de baloncesto distintos que (k=5 jugadores) se pueden hacer con 6 jugadores (n=6).

Es decir, cuántas maneras distintas hay para elegir (choose) 5 jugadores en un conjunto de 6 jugadores. Todo el mundo diría ¡¡¡6!!! Efectivamente con R es

choose(6,5)

Con 10 jugadores, el número de equipos de 5 distintos es bastante más grande

choose(10.5)

Γ11 252

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Exercise 3.2. Ejercicio

Justificar de forma intuitiva que si X_i con $i=1,2,\ldots,n$ son v.a. Ber(p) independientes entonces $X = \sum_{i} X_{i}$ sigue una distribución B(n,p).

69

Resumen v.a con distribución binomial B(n,p)

X binomial	B(n,p)
$D_X =$	$\{0, 1, \dots n\}$
$P_X(x) = P(X=x) =$	$\begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & \text{si } x = 0, \dots, n \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$
$F_X(x) = P(X \le x) =$	no tiene fórmula (utilizad funciones
	de R o Python)
$E(X) = n \cdot p$	$Var(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Cálculos de la distribución Binomial con R

Veamos los cálculos básicos con funciones de R para una v.a X con distribución binomial B(n = 10, p =

Si queremos calcular con R
 algún valor de la función de distribución, como por ejemplo
 $F_X(0)=P(X\leq$ 0), tenemos que hacer

pbinom(0,size=10,prob=0.25)

[1] 0 05631351

y si queremos por ejemplo $F_X(4)=P(X\leq 4),$ tenemos que hacer:

pbinom(4,size=10,prob=0.25)

[1] 0.9218731

Sin embargo, si queremos calcular algún valor de la función de probabilidad, como por ejemplo P(X=0), tenemos que hacer:

dbinom(0,size=10,prob=0.25)

[1] 0.05631351

o, por ejemplo para P(X=4):

dbinom(4,size=10,prob=0.25)

[1] 0.145998

Generación de muestras aleatorias con R

Generaremos una muestra aleatoria de 100 valores de una población con distribución B(20, 0.5) set.seed(2019)

rbinom(100, size = 20, prob=0.5)

Y, por ejemplo, con un equipo de fútbol profesional que tiene en plantilla 22 jugadores (quitando los guardametas) se pueden formar ¡¡nada menos que!!

choose(22,10)

Γ17 646646

un bonito número capicúa que nos da el número de equipos distintos que se pueden formar.

Obviamente se tiene que una v.a. Bernoulli es una binomial con n=1: B(1,p)=Ber(p).

Exercise 3.1. Ejercicio

Calculad las funciones de distribución de una binomial B(n = 1, p = 0.3) y comprobad que coinciden con las distribuciones de una Ber(p=0.3)

Observaciones sobre la distribución binomial

- ullet La probabilidad de fracaso se suele denotar con q=1-p, sin ningún aviso adicional, con el
- fin de acortar y agilizar la escritura de las fórmulas.

 Su función de distribución no tienen una formula general, hay que calcularla con una función de R o Python. En el siglo pasado se tabulaban en los libros de papel:-).

 En el material adicional os pondremos unas tablas de esta distribución para distintos valores de
- In a material autorial os pointenas más trabas de cás uterial autorial para assimtes valores de n y p para que disfruíció de tan ancestral método de cálculo.
 Cualquier paquete estadístico u hoja de cálculo dispone de funciones para el cálculo de estas probabilidades, así que el uso de las tablas queda totalmente anticuado.

Esperanza de una B(n, p)

Su esperanza es:

$$E(X) = \sum_{k=0}^{n} k \cdot {n \choose k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} = n \cdot p.$$

La esperanza de X^2 es:

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^n k^2 \cdot {n \choose k} \cdot p^k \cdot q^{n-k} = n \cdot p \cdot q + (n \cdot p)^2$$

Varianza de una B(n, p)

Su varianza es:

$$Var(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2 = n \cdot p \cdot q = n \cdot p \cdot (1-p).$$

Su desviación típica es

$$\sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$
.

En temas posteriores veremos una forma sencilla del cálculo de la esperanza y varianza de una B(n, p)como las suma de n v.a. Ber(p) independientes.

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Example 3.2. Eiemplo

70

El ejemplo anterior correspondería a repetir 100 veces el experimento de lanzar una moneda 20 veces y contar el número de caras

Cálculos de la distribución Binomial con Python

Veamos los cálculos básicos con funciones de Pyython para una v.a X con distribución binomial B(n =10, p = 0.25).

Primero importamos la función binom de la librería scipy.stat:

from scipy.stats import binom

En general, en el paquete scipy, la función de probabilidad se invocará con el método pmf, la de distribución con el método cdf, mientras que una muestra aleatoria que siga esta distribución, con el método rvs. En todos ellos aparecerá siempre el parámetro loc que se utiliza para desplazar el dominio de la variable aleatoria. Por ejemplo, en este ca

binom.pmf(k, n, p, loc) = binom.pmf(k - loc, n, p)

Para calcular los valores de la función de distribución como por ejemplo $F_X(0) = P(X \le 0)$ y $F_X(4) = P(X \le 0)$ $P(X \le 4)$ utilizamos la función cdf:

binom.cdf(0,n=10,p=0.25) 0.056313514709472656

binom.cdf(4,n=10,p=0.25)

0.9218730926513672

Notemos que al no indicar el valor de ${\tt loc},$ se le asume que toma el valor 0.

Para calcular los valores de la función de probabilidad P(X=0) y P(X=4) utilizamos la función

binom.pmf(0,n=10,p=0.25)

0.056313514709472684

binom.pmf(4,n=10,p=0.25)

0.14599800109863295

Notemos que al no indicar el valor de ${\tt loc},$ se le asume que toma el valor 0.

Si queremos generar una muestras aleatorias que siga una distribución binomial, podemos usar la función rvs. En este caso, generaremos una muestra aleatoria de 100 valores de una población B(20,0.5)

```
binom.rvs(n=20,p=0.25,size = 100)
                         7, 4, 2, 6, 4, 4, 2, 5, 6, 8, 4, 3, 6, 8, 4, 3, 7, 7, 5, 2, 10, 4, 3, 7, 4, 1, 3, 8, 6, 5, 8, 3, 4, 5, 4, 4, 1, 5, 3, 5, 5, 6, 8, 7, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 2, 5, 6, 6, 5, 5, 2, 8, 5, 7, 2, 8, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 6, 7,
                                                                                                                                                                                   6,
5,
1,
5,
                                                                                                                                                                                                 3,
5,
8,
7,
3,
                                                                                                                                                                                                             5, 3, 4,
8, 10, 1,
3, 2, 6,
6, 5, 3,
3, 5, 9,
4])
```

Notemos que la secuencia aleatoria generada no es la misma que con R. De hecho, si volvemos a ejecutar esta función obtendremos una muestra aleatoria distinta.

```
binom.rvs(n=20,p=0.25,size = 100)
array([4, 7, 3, 5, 3, 5, 4, 6, 4, 5, 1, 8, 6, 7, 4, 5, 4, 5, 5, 8, 4, 6, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 6, 7, 7, 2, 6, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 2, 7, 5, 4, 9, 5, 4, 5, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 4, 5, 7, 6, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 7, 6, 3, 4, 6, 3, 7, 2, 6, 6, 9, 5, 6, 2, 4, 6, 5, 7, 5, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 7, 8, 7, 5, 2, 1])
```

Veamos algunos cálculos básicos con funciones de Python para la binomial B(n=10,p=0.25).

binom.cdf(5,n=10,p=0.25)

```
0.9802722930908203
binom.pmf(1,n=10,p=0.25)
```

0.18771171569824247

binom.rvs(n=20,p=0.25,size=10)

```
array([5, 9, 4, 6, 4, 2, 3, 9, 4, 2])
```

Gráficas de la distribución Binomial con R

```
par(mfrow=c(1,2))
 aux=rep(0,22)
aux=rep(0,22)
aux[seq(2,22,2)]=dbinom(c(0:10),size=10,prob=0.25)
plot(x=c(0:10),y=dbinom(c(0:10),size=10,prob=0.25),
ylim=c(0,1),xlim=c(-1,11),xlab="x",
main="Función de probabilidad\n B(n=10,p=0.25)")
lines(x=rep(0:10,each=2),y=aux, type = "h", 1ty = 2,col="blue")
curve(pbinos(x,siz=10,prob=0.25),
xlim=c(-1,11),col="blue")
main="Función de distribución\n B(n=10,p=0.25)")
par(mfrow=c(1,1))
```

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

```
par(mfrow=c(1,2))
aux=rep(0,(n+1)*2)
aux[seq(2,(n+1)*2,2)]=dbinom(c(0:n),size=n,prob=pr)
plot(x=c(0:n),y=dbinom(c(0:n),size=n,prob=pr),
    ylim=c(0,1),xlim=c(-1,n+1),xlab="x",
    main=paste0(c"Función de probabilidad\n B(n=",n,",p=",pr,")"),collapse = ""))
lines(x=rep(0:n,each=2),y=aux, type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(pbinom(x,size=n,p=r),
    xlim=c(-1,n+1),col="blue",
    main=paste0(c"Función de distribución\n B(n=",n,",p=",pr,")"),
    collapse = ""))
    par(mfrow=c(1,1))
   aux=rep(0,(n+1)*2)
```

73

Gráficos de la distribución binomial con Python


Exercise 3.3. Ejercicio


Buscad en la documentación de Python cómo se dibuja la función de probabilidad y de distribución de una binomial y recread los gráficos anteriores

```
Pista: Necesitaremos investigar más librerías:
```

```
import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt
 n, p = 10, 0.25
n, p = 10, 0.25
x = np.arange(binom.ppf(0.01, n, p),binom.ppf(0.99, n, p))
fig =plt.figure(figsize=(5, 2.7))
ax = fig.add_subplot(1,2,1)
ax.plot(x, binom.pmf(x, n, p), 'bo', ms=8, label='binom pmf')
ax.vlines(x, 0, binom.pmf(x, n, p), colors='b', lw=5, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
    tick.label.set_double(1,2,2)
ax = fig.add_subplot(1,2,2)
ax = fig.add_subplot(1,2,2)
ax.plot(x, binom.cdf(x, n, p), 'bo', ms=8, label='binom pmf')
ax.vlines(x, 0, binom.cdf(x, n, p), colors='b', lw=5, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get_major_ticke():
 tick.label.set_fontsize(5)
for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
 fig.suptitle('Distribucion Binomial')
plt.show()
```

Función de distribución Función de probabilidad






Gráficas interactivas de la distribución Binomial

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidPage(
fluidRow(
  column(6,
        column(6.
         sliderInput("p_binom", label = "Probabilidad éxito p:",
min = 0.01, max = 0.99, value = 0.25, step = 0.01)
renderPlot({
 n=input$n_binom
 pr=input$p_binom
```

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES



Example 3.3. Ejemplo: número de bolas rojas extraídas de una urna con reposición

Tenemos una urna con $100\ \mathrm{bolas}$ de las cuales $40\ \mathrm{son}$ rojas y $60\ \mathrm{son}$ blancas. Extraemos al azar una bola, anotamos su color y la devolvemos a (reponemos en) la urna.

Supongamos que repetimos este proceso n=10 reponiendo en cada ocasión la bola extraída.

Consideremos la variable aleatoria X como el número de bolas rojas extraídas (con reposición) en n=10 repeticiones del mismo experimento de Bernoulli.

Bajo estas condiciones repetimos n=10 veces el mismo experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito (sacar bola roja)

$$P(Roja) = P(xito) = p = \frac{40}{100} = 0.4.$$

Así que la variable X, que es el número de bolas rojas extraídas de la urna (con reposición) en n=10 ocasiones, sigue una ley binomial B(n=10,p=0.4).

Nos preguntamos:

74

- 1. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos exactamente 4 bolas rojas?
- 2. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos al menos 4 bolas rojas?
 3. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos menos de 3 bolas rojas?
 4. ¿Cuál es el valor esperado del número de bolas rojas?
 5. ¿Cuál es la desviación típica del número de bolas rojas?

Solución 1. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos exactamente 4 rojas?

Utilizando la función de probabilidad, tenemos que:

$$\begin{array}{ll} P(X=4) &= \binom{10}{4} \cdot 0.4^4 \cdot (1-0.4)^{10-4} = \frac{10!}{(10-4)! \cdot 4!} \cdot 0.4^4 \cdot 0.6^6 \\ &= \frac{78 \cdot 9 \cdot 10}{12 \cdot 3 \cdot 4} \cdot 0.4^4 \cdot 0.6^6 = 0.2508227. \end{array}$$

Con R

dbinom(4,size=10,prob = 0.4)

Γ17 0.2508227

Solución 2. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos al menos 4 bolas rojas?

La probabilidad de sacar al menos 4 rojas se expresa como $P(X \geq 4) = 1 - P(X < 4) = 1 - P(X \leq 3)$:

$$\begin{array}{ll} P(X \leq 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= \binom{0}{0} \cdot 0.4^{0} \cdot (1 - 0.4)^{10 - 0} + \binom{10}{1} \cdot 0.4^{1} \cdot (1 - 0.4)^{10 - 1} \\ &+ \binom{0}{2} \cdot 0.4^{2} \cdot (1 - 0.4)^{10 - 2} + \binom{10}{3} \cdot 0.4^{3} \cdot (1 - 0.4)^{10 - 3} \\ &= 0.3829806 \end{array}$$

Con R

pbinom(3,10,0.4)

[1] 0.3822806

Así que

$$P(X > 4) = 1 - P(X < 4) = P(X < 3) = 1 - 0.3822806 = 0.6177194.$$

Otra manera usando R sería:

1-pbinom(3,10,0.4)

[1] 0.6177194

Aunque en estos casos el parámetro lower.tail = FALSE es sin duda nuestra mejor opción: pbinom(3,10,0.4,lower.tail = FALSE)

Solución 3. ¿Cuál es la probabilidad de que saquemos menos de 3 bolas rojas?

$$\begin{array}{ll} P(X<3) &= P(X\leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) \\ &= \binom{10}{0} \cdot 0.4^{0} \cdot (1-0.4)^{10-0} + \binom{10}{1} \cdot 0.4^{1} \cdot (1-0.4)^{10-1} \\ &+ \binom{10}{2} \cdot 0.4^{2} \cdot (1-0.4)^{10-2} \\ &= 0.1672898. \end{array}$$

En F

dbinom(0,10,0.4)+dbinom(1,10,0.4)+dbinom(2,10,0.4)

[1] 0.1672898

pbinom(2,10,0.4)

[1] 0 1672898

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

La v.a. definida anteriormente diremos que sigue una distribución geométrica de parámetro p. La denotaremos por Ge(p). Su dominio será: $D_X=\{0,1,2,\ldots\}$.

Calculemos como ejemplo $\mathrm{P}(X \leq 3).$ Por la propiedad de la probabilidad del suceso complementario tenemos que

$$P(X \le 3) = 1 - P(X > 3) = 1 - P(X \ge 4)$$

Efectivamente, el complementario del evento $X \le 3$ nos dice que hemos fracasado más de tres veces hasta conseguir el primer éxito, es decir, **hemos fracasado 4 o más veces**. Podemos simbolizar dicho evento de la forma siguiente:

$$\{X > 3\} = \{X \ge 4\} = \{FFFF\}$$

Ahora, al ser los intentos independientes, tenemos que:

$$\begin{array}{ll} P(X>3) & = P(\{FFFF\}) = P(F) \cdot P(F) \cdot P(F) \cdot P(F) \\ & = (1-p) \cdot (1-p) \cdot (1-p) \cdot (1-p) = (1-p)^{3+1} = (1-p)^4. \end{array}$$

El valor de la función de distribución de X en x=3 será, pues:

$$F_X(3) = P(X \le 3) = 1 - P(X > 3) = 1 - (1 - p)^{3 + 1}.$$

Generalizando el resultado anterior a cualquier entero positivo k=0,1,2,..., tenemos:

$$F_X(k) = P(X \le k) = 1 - (1-p)^{k+1}, \text{ si } k = 0, 1, 2, \dots$$

En general, tendremos que:

$$F_X(x) = P(X \le x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1 - (1 - p), & \text{si } k = 0 \le x < 1, \\ 1 - (1 - p)^2, & \text{si } k = 1 \le x < 2, \\ 1 - (1 - p)^3, & \text{si } k = 2 \le x < 3, \\ 1 - (1 - p)^{k+1}, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \le x < k + 1, \\ \text{para } k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

De forma más compacta, tendremos que

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1 - (1-p)^{k+1}, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \leq x < k+1, \\ \text{para } k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Notemos que el límite de la función de distribución es:

$$\lim_{k\to +\infty} F_X(k) = \lim_{k\to +\infty} 1 - (1-p)^{k+1} = 1,$$

ya que 0 < 1 - p < 1.

Sumas derivadas series geométricas

Recordemos las propiedades siguientes del tema de variables aleatorias:

Solución 4. ¿Cuál es el valor esperado del número de bolas rojas?

Como Xes una B(n=10,p=0.4)sabemos que

$$E(X) = n \cdot p = 10 \cdot 0.4 = 4$$
.

Aunque en Python tenemos la función stats que nos lo calcula directamente:

E(X) = 4

76

Solución 5. ¿Cuál es la desviación típica del número de bolas rojas?

La varianza es:

$$Var(X) = n \cdot p \cdot (1-p) = 10 \cdot 0.4 \cdot 0.6 = 2.4.$$

Por lo tanto, la desviación típica es:

$$\sqrt{Var(X)} = \sqrt{2.4} = 1.5491933.$$

Aunque en Python tenemos la función stats que nos lo calcula directamente:

$$print("Var(X) = \{v\}".format(v=binom.stats(n = 10, p = 0.4, moments='v')))$$

Var(X) = 2.4

3.1.3. Distribución geométrica

Todos hemos jugado a, por ejemplo, tirar una moneda hasta que obtengamos la primera cara.

O también tirar una pelota a una canasta de baloncesto hasta obtener la primera canasta.

Desde otro punto de vista, también podemos intentar modelar el número de veces que accionamos una interruptor y la bombilla se ilumina hasta que falla.

O también, el número de veces que un cajero automático nos da dinero hasta que falla.

La modelización de este tipo de problemas se consigue con la llamada distribución geométrica.

Distribución geométrica

Repitamos un experimento Bernoulli, de parámetro p, de forma independiente hasta obtener el primer \acute{o} ito

Sea X la v.a. que cuenta el número de fracasos antes del primer éxito. Por ejemplo, que hayamos tenido x fracasos será una cadena de x fracasos culminada con un éxito. Más concretamente

$$P(\overbrace{FFF\dots F}^xE) = P(F)^x \cdot P(E) = (1-p)^x \cdot p = q^x \cdot p.$$

Su función de probabilidad es:

$$P_X(x) = P(X=x) = \begin{cases} (1-p)^x \cdot p, & \text{si } x = 0, 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

• Si |r|<1 también son convergentes las derivadas, respecto de r, de la serie geométrica y convergen a la derivada correspondiente. Así, tenemos que:

$$\begin{split} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)' &= \sum_{k=1}^{+\infty} k \cdot r^{k-1} \\ &= \left(\frac{1}{1-r}\right)' = \frac{1}{(1-r)^2}, \\ \left(\sum_{k=0}^{+\infty} r^k\right)'' &= \sum_{k=2}^{+\infty} k \cdot (k-1) \cdot r^{k-2} \\ &= \left(\frac{1}{1-r}\right)'' = \frac{2}{(1-r)^3}. \end{split}$$

Esperanza de una v.a. Ge(p)

Recordemos que $P(X=x)=(1-p)^x\cdot p$ si $x=0,1,2,\dots$ y aplicado la fórmula anterior con r=1-p,

$$\begin{array}{ll} E(X) & = & \sum_{x=0}^{+\infty} x \cdot P_x(x) = \sum_{x=0}^{+\infty} x \cdot (1-p)^x \cdot p = p \cdot (1-p) \cdot \sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot (1-p)^{x-1} \\ & = & p \cdot (1-p) \cdot \frac{1}{(1-(1-p))^2} = p \cdot (1-p) \cdot \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p}. \end{array}$$

Valor $E(X^2)$ de una v.a. Ge(p)

$$\begin{array}{ll} E(X^2) &=& \sum_{x=0}^{+\infty} x^2 \cdot P_X(x) = \sum_{x=1}^{+\infty} x^2 \cdot (1-p)^x \cdot p \\ &=& \sum_{x=0}^{+\infty} (x \cdot (x-1) + x) \cdot (1-p)^x \cdot p \\ &=& \sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot (x-1) \cdot (1-p)^x \cdot p + \sum_{x=1}^{+\infty} x \cdot (1-p)^x \cdot p \\ &=& (1-p)^2 \cdot p \cdot \sum_{x=2}^{+\infty} x \cdot (x-1) \cdot (1-p)^{x-2} \\ &+& (1-p) \cdot p \cdot \sum_{x=2}^{+\infty} x \cdot (1-p)^{x-1} \\ &=& (1-p)^2 \cdot p \cdot \sum_{x=2}^{+\infty} x \cdot (1-p)^{x-1} \\ &+& (1-p) \cdot p \cdot \sum_{x=2}^{+\infty} x \cdot (1-p)^{x-1} \\ &=& p \cdot (1-p)^2 \cdot \frac{1}{p^2} + (1-p) \cdot p \cdot \frac{1}{p^2} \\ &=& p \cdot (1-p)^2 \cdot \frac{1}{p^2} + (1-p) \cdot p \cdot \frac{1}{p^2} \\ &=& \frac{2(1-p)^2}{p^2} + \frac{1-p}{p}. \end{array}$$

Varianza de una v.a. Ge(p)

$$\begin{array}{lll} Var(X) & = & E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2\cdot(1-p)^2}{p^2} + \frac{1-p}{p} - \left(\frac{1-p}{p}\right)^2 \\ & = & \frac{2\cdot(1-p)^2 + p\cdot(1-p) - (1-p)^2}{p} = \frac{(1-p)^2 + p\cdot(1-p)}{p^2} \\ & = & \frac{1-2p + p^2 + p^2}{p^2} \\ & = & \frac{1-p}{p^2}, \end{array}$$

y su desviación típica será

$$\sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$$

Resumen Ge(p) empezando en 0

79

 $X = \text{Geométrica (empieza en 0)} \qquad \begin{array}{c} \text{número de fracasos para conseguir el} \\ \text{primer éxito} \end{array}$

$$\begin{array}{ll} D_X &= \{0,1,\dots n,\dots\} \\ P_X(x) = P(X=x) &= \begin{cases} (1-p)^x \cdot p, & \text{si } x=0,1,2,\dots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \\ F_X(x) = P(X \leq x) &= \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1-(1-p)^{k+1}, & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1, \\ \text{para } k = 0,1,\dots \end{cases} \\ E(X) &= \frac{1-p}{p}, \quad Var(X) = \frac{1-p}{p^2}. \end{array}$$

La variable geométrica que cuenta los intentos para obtener el primer éxito

Supongamos que sólo estamos interesados en el **número de intentos** para obtener el primer éxito.

Si definimos Y como número de intentos para obtener el primer éxito, entonces Y=X+1, donde $X\equiv Ge(p)$.

Su dominio es $D_Y = \{1, 2, ...\}$

La media se incrementa en un intento debido al éxito $E(Y)=E(X+1)=E(X)+1=\frac{1-p}{p}+1=\frac{1}{p}.$

La varianza es la misma $Var(Y) = Var(X+1) = Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$.

Resumen Ge(p) comenzando en 1

 $\begin{array}{c} \text{ mimero de INTENTOS para OBTENER el }\\ Y \text{ geométrica (que cuenta el éxito empieza en 1)} & \text{ mimero de INTENTOS para OBTENER el }\\ D_Y = \\ D_Y = \begin{cases} 1, 2, \dots n, \dots \}\\ \{(1-p)^{y-1} \cdot p, & \text{si } y=1, 2, 3, \dots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}\\ F_Y(y) = P(Y \leq y) = \\ \begin{cases} 0, & \text{si } y < 1\\ 1-(1-p)^k, & \text{si } \begin{cases} k \leq y < k+1, \\ \text{para } k=1, 2, 3, \dots \end{cases}\\ E(X) = \frac{1}{p} & Var(X) = \frac{1-p^2}{2^p}. \end{cases}$

Propiedad de la falta de memoria

Sea X una v.a. discreta con dominio $D_X = \{0,1,2,\ldots\},$ con P(X=0) = p.

Entonces X sigue una ley Ge(p) si, y sólo si,

$$P(X > k + j | X > j) = P(X > k)$$

para todo $k, j = 0, 1, 2, 3 \dots$

Demostración

Si X es geométrica, entonces el lado derecho de la igualdad es

$$P(X>k)=1-P(X\leq k)=1-\left(1-(1-p)^{k+1}\right)=(1-p)^{k+1},$$

$3.1.\ DISTRIBUCIONES\ DISCRETAS$

Utilizando la recurrencia anterior, podemos calcular todas las probabilidades P(X=k) a partir de la P(X=0)=n

$$\begin{array}{ll} P(X=0) &= p, \\ P(X=1) &= P(X=0+1) = (1-p) \cdot P(X=0) = (1-p) \cdot p, \\ P(X=2) &= P(X=1+1) = (1-p) \cdot P(X=1) = (1-p) \cdot (1-p) \cdot p = (1-p)^2 \cdot p, \\ \vdots &: \\ P(X=k) &= P(X=(k-1)+1) = (1-p) \cdot P(X=k-1) = (1-p) \cdot (1-p)^{k-1} \cdot p \\ &= (1-p)^k \cdot p, \end{array}$$

lo que demuestra el recíproco, es decir, que X es Geom(p).

Observación: Interpretación de la propiedad de la falta de memoria

La propiedad de la falta de memoria

$$P(X > k + j | X \ge j) = P(X > k),$$

significa que, aunque ya llevemos al menos j fracasos, la probabilidad de que fracasemos k veces más no disminuye, es la misma que era cuando empezamos el experimento.

A este efecto se le suele etiquetar con la frase el experimento carece de memoria o es un experimento sin memoria $(Memoryless\ Property)$.

Ejemplo falta de memoria

Un ejemplo muy sencillo nos aclarará el alcance de esta propiedad es el ejercicio siguiente:

Exercise 3.4. Ejercicio: la llave que abre la puerta

Tenemos un llavero con 10 llaves, sólo una de ellas abre una puerta. Cada vez que probamos una llave y falla olvidamos que llave hemos probado. \mathcal{L} uál es la probabilidad de que si ya lo hemos intentado 5 veces necesitemos más de 4 intentos adicionales para abrir la puerta?

Tomemos k=4, j=5, aplicando la propiedad de la falta de memoria

$$P(X > 4 + 5/X \ge 5) = P(X > 4)$$

Después de 5 fracasos no estamos "más cerca" de abrir la puerta. La propiedad de la falta de memoria nos dice que en después de cada intento es como si empezásemos de nuevo a abrir la puerta. Tras 5 fracasos la probabilidad de que fallemos más de 4 veces más es la misma que cuando lo intentamos la primera vez.

¿Cuál es el número esperado de fracasos hasta abrir la puerta?

$$E(X) = \frac{1-p}{p} = \frac{1-\frac{1}{10}}{\frac{1}{10}} = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{1}{10}} = 9.$$

La varianza es

$$Var(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-\frac{1}{10}}{\left(\frac{1}{10}\right)^2} = \frac{\frac{9}{10}}{\frac{1}{100}} = 90.$$

y el lado de izquierdo es:

$$\begin{array}{ll} P\left(X>k+j\big|X\geq j\right) & = & \frac{P(\{X>k+j\}\cap\{X\geq j\})}{P(X\geq j)} = \frac{P(X>k+j)}{P(X\geq j)} = \frac{1-P(X\leq k+j)}{1-P(X\leq j-1)} \\ & = & \frac{1-(1-1-p)^{k+j+1}}{1-(1-(1-p)^{k+j+1})} = \frac{(1-p)^{k+j+1}}{(1-p)^{j}} = (1-p)^{k+1}, \end{array}$$

lo que demuestra la igualdad.

Para demostrar el recíproco, tomemos j=1 y $k\geq 0.$ Entonces, por la propiedad de la pérdida de memoria:

$$P(X > k + 1 | X \ge 1) = P(X > k)$$

Como P(X=0)=p,tenemos que $P(X\geq 1)=1-P(X<1)=1-P(X=0)=1-p$

Combinado las igualdades, tenemos que:

$$P\left(X > k+1 \middle| X \geq 1\right) = \frac{P(X > k+1, X \geq 1)}{P(X \geq 1)} = \frac{P(X > k+1)}{P(X \geq 1)} = P(X > k).$$

Así podemos poner que

$$\begin{array}{lcl} P(X>k+1) & = & P(X\geq 1) \cdot P(X>k) = (1-P(X<1)) \cdot P(X>k) \\ & = & (1-P(X=0)) \cdot P(X>k) = (1-p) \cdot P(X>k). \end{array}$$

En general tenemos que:

Del mismo modo para j=2,

$$P(X > k + 2) = (1 - p) \cdot P(X > k + 1).$$

 $P(X > k + 1) = (1 - p) \cdot P(X > k)$

Restando la primera igualdad de la última obtenemos:

$$P(X > k + 1) - P(X > k + 2) = (1 - p) \cdot P(X > k) - (1 - p) \cdot P(X > k + 1),$$

de donde operando en cada lado de la igualdad obtenemos la recurrencia:

$$[1-P(X \le k+1)] - [1-P(X \le k+2)] = (1-p) \cdot [P(X > k) - P(X > k+1)]$$

Ahora operando,

$$\begin{array}{ll} P(X \leq k+2) - P(X \leq k+1) &= (1-p) \cdot [1-P(X \leq k) - (1-P(X \leq k+1))], \\ P(X = k+2) &= (1-p) \cdot [P(X \leq k+1) - P(X \leq k)], \\ P(X = k+2) &= (1-p) \cdot P(X = k+1). \end{array}$$

De forma similar, obtenemos

$$P(X = k + 1) = (1 - p) \cdot P(X = k).$$

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

La desviación típica es $\sqrt{90} = 9.486833$.

viajes de Barcelona a Madrid.

Exercise 3.5. Ejemplo: partidos hasta que el Barça gana al Madrid

Los partidos Real Madrid v
s FC Barcelona de la liga española se suelen denominar El Clásico, sean en el Bernabeu (estadio del Real Madrid) o en el Camp Nou (estadio del Barça).

Sea X la variable que cuenta el número de veces consecutivas que en un partido de fútbol de la liga el Barça no gana al Madrid sea en el Camp Nou o el Bernabeu.

Nuestra amiga Aina es muy culé (hincha del Barça) y quiere averiguar cuántos partidos consecutivos de **El Clásico** tiene que ver hasta ver ganar al Barça por primera vez.

Le interesa estimar cuánto le va a costar este capricho. Tendrá que comprar las entradas y pagar los

En datos historicos de **El clásico** en la wikipedia están los datos hasta el 3 de marzo de 2019: se han jugado en total 178 **Clásicos** donde el Real Madrid ganó en 72 ocasiones, el Barça en 72 y empataron 34 veces.

La pregunta es: ¿Cuántos partidos se tienen que jugar de media para ver ganar al Barça por primera vec^2

Con los datos anteriores, podemos estimar que la probabilidad de que el Barça gane un clásico cualquiera es:

$$P(Barça) = \frac{72}{178} = 0.4045.$$

Por tanto, podemos modelar la variable X con una ley geométrica con probabilidad de éxito $p=P(\mathrm{Barça})=\frac{72}{178}.$

El número de partidos esperado para que el Barça gane por primera vez es:

$$E(X) = \frac{1-p}{p} = \frac{1-0.4045}{0.4045} = 1.4722,$$

con una varianza de:

$$Var(X) = \frac{1-p}{p^2} = \frac{1-0.4045}{0.4045^2} = 3.6397$$

y desviación típica:

$$\sqrt{3.6397} = 1.9078.$$

Cálculos con R

Veamos los cálculos básicos con R para la distribución geométrica Ge(p=0.25). R implementa la geométrica que cuenta el número de fracasos, $P(X=0)=(1-0.25)^0\cdot 0.25^1=0.25$: dgeom(0,prob=0.25)

[1] 0 25

$$P(X \leq 0) = 1 - (1 - 0.25)^{0+1} = 1 - 0.75 = 0.25:$$

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 84 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

pgeom(0,prob=0.25)

[1] 0.25

```
P(X \leq 4) = 1 - (1 - 0.25)^{4 + 1} = 1 - 0.75 = 1 - 0.75^5 = 0.7626953:
pgeom(4,prob=0.25)
```

Γ17 0.7626953

Una muestra aleatoria de tamaño 25 de una Ge(0.25):

rgeom(n=25,prob=0.25)

```
[1] 5 4 1 6 10 0 0 10 7 0 6 2 1 3 0 2 5 0 0 5 5 3 3 2 2
```

Gráficos con R

```
par(mfrow=c(1,2))
x=c(0:10)
plot(x=x,y=dgeom(x,prob=0.25),
   ylim=c(0,1),xlim=c(-1,11),xlab="x",
   main="Función de probabilidad\n Ge(p=0.25)")
lines(x=rep(0:10,each=2),y=aux, type = "h", lty = 2,col="blue")
aux0=dgeom(c(0:10),prob=0.25)
ceros=rep(0,21)
ceros
  ceros
  aux=ceros
  aux[2*(c(1:11))]<-aux0
aux[2*(c(1:11)]/-aux0
curve(pgeom(x,prob=0.25),
xlim=c(-1,10),col="blue",
main="Función de distribución\n Ge(p=0.25)")
par(mfrow=c(1,1))
```

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Cálculos con Python

})

Veamos los cálculos básicos con python para la distribución geométrica Ge(p=0.25). scipy.stats implementa la distribución geométrica que cuenta el número intentos, así que empieza en 1.

Cargamos la función de la librería

from scipy.stats import geom

 $La \ función \ de \ probabilidad \ es \ geom.pmf(x,p,loc=0) = geom.pmf(x,p). \ Es \ una \ geométrica \ que \ cuenta \ de \ probabilidad \ es \ geom.pmf(x,p,loc=0) = geom.pmf(x,p). \ Es \ una \ geométrica \ que \ cuenta \ probabilidad \ es \ pr$ el número de intentos para obtener el primer éxito y el valor por defecto del último parámetro es loc=0.

Si queremos la que cuenta el número de fracasos para obtener el primer éxito (la geométrica que empieza en 0) tenemos que usar geom.pmf(x,p,loc=-1).

 $\label{eq:compmf} \text{Es decir geom.pmf(x,p,loc=-1)=geom.pmf(x-1,p,loc=0)}$

Veamos pues los cálculos para la Ge(p) que empieza en 0.

 $P(X = 0) = (1 - 0.25)^{0} \cdot 0.25^{1} = 0.25$:

geom.pmf(0,p=0.25,loc=-1)

 $P(X \le 0) = 1 - (1 - 0.25)^{0+1} = 1 - 0.75 = 0.25$:

geom.cdf(0,p=0.25,loc=-1)

0.2499999999999997

 $P(X \le 4) = 1 - (1 - 0.25)^{4+1} = 1 - 0.75 = 1 - 0.75^5 = 0.7626953$

geom.cdf(4,p=0.25,loc=-1)

Una muestra aleatoria de tamaño 25 de una Ge(0.25):

geom.rvs(p=0.25, size=20, loc=-1)


array([2, 0, 2, 2, 8, 4, 0, 2, 3, 5, 0, 7, 3, 1, 2, 1, 0, 11, 4, 0])

Exercise 3.6. Ejercicio

 \Bar{i} Qué probabilidades son las que calcula el siguiente código y qué tipo de variables geométricas son? geom.cdf(range(5),p=0.3,loc=0)

```
array([0. , 0.3 , 0.51 , 0.657 , 0.7599])
geom.cdf(range(5),p=0.3,loc=-1)
```

$$\verb"array"([0.3 \quad , 0.51 \quad , 0.657 \quad , 0.7599 \ , 0.83193])$$



Gráficas interactivas de la distribución Geométrica

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
sliderInput("p_geom", label = "Probabilidad de éxito:",
    min = 0.01, max = 0.99, value =0.25 , step = 0.01)
renderPlot({
  enderPlot({
  par(mfrow=c(1,2))
  p=input$p_geom
  n=30
  aux=rep(0,(n+1)*2)
  lines(x=rep(0:n,each=2),y=aux, type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(pgeom(x,prob=p),
    xlim=c(-1,n+1),col="blue",
    main=paste0(c("Función de distribución\n Ge(p=",p,")"),collapse = ""))
   par(mfrow=c(1,1))
```

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Cálculos con Python de la esperanza y varianza

Con Python también podemos calcular directamente algunos parámetros asociados a una función de distribución predefinida

```
geom.stats(p=0.25, loc=0, moments='mv')
(array(4.), array(12.))
geom.stats(p=0.25, loc=-1, moments='mv')
(array(3.), array(12.))
```

Exercise 3.7. Ejercicio


Comprobad que las medias y las varianzas calculadas en el código anterior corresponden a una Ge(p=0.3) empezando en 1 y a una Ge(p=0.3) empezando en 0.

Gráficos con Python

```
Graficos con Python
p = 0.25
x = np.arange(geom.ppf(0.01, p),geom.ppf(0.99, p))
fig =plt.figure(figsize=(5, 2.7))
ax = fig,add_subplot(1,2,1)
ax.plot(x, geom.pmf(x, p), 'bo', ms=5, label='geom.pmf')
ax.vlines(x, 0, geom.pmf(x, p), colors='b', lw=2, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
ax = fig,add subplot(1,2,2)
tick.ladel.set_lontsize(s)
ax = fig, add_subplot(1,2,2)
ax.plot(x, geom.cdf(x, p), 'bo', ms=5, label='geom pmf')
ax.vlines(x, 0, geom.cdf(x, p), colors='b', lw=2, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
    tick.label.set_fontsize(5)
  fig.suptitle('Distribucion Geometrica')
  plt.show()
```

87

Distribucion Geometrica



3.1.4. Distribución binomial negativa

El problema de la puerta con dos cerraduras

Supongamos que disponemos de 10 llaves distintas y tenemos que abrir una puerta con ${f dos}$ cerraduras

Comenzamos por la primera cerradura, de tal forma que cada vez olvidamos qué llave hemos probado.

Una vez abierta la primera cerradura probamos de igual forma con la segunda hasta que también la

Sea X la v.a. que cuenta el número de fracasos hasta abrir la puerta.

Acertar una llave de la puerta es un experimento Bernoulli con probabilidad de éxito p=0.1. Lo repetiremos hasta obtener 2 éxitos.

En general, tendremos un experimento de Bernoulli con probabilidad de éxito 0 tal que:

- Repetimos el experimento hasta obtener el n-ésimo éxito ¡¡abrir la maldita puerta!!.
 Sea X la v.a. que cuenta el número fallos hasta abrir la puerta, es decir, hasta conseguir el n-ésimo éxito. Notemos que no contamos los éxitos, solo contamos los fracasos.

Si representamos como es habitual un suceso como una cadena de F's y E's, para n=2, algunos sucesos sucesos sucesos estados elementales serán:

 $\{EE, FEE, EFE, FFEE, FEFE, EFFE, FFFEE, FFFFE, FEFFE, EFFFE\}$

Calculemos algunas probabilidades para n = 2:

$$\begin{array}{ll} P(X=0) &= P(\{EE\}) = p^2, \\ P(X=1) &= P(\{FEE,EFE\}) = 2 \cdot (1-p) \cdot p^2, \\ P(X=2) &= P(\{FFEE,FFEE,EFFE\}) = 3 \cdot (1-p) 2 \cdot p^2, \\ P(X=3) &= P(\{FFFEE,FFEFE,EFFEE,EFFFE\}) = 4 \cdot (1-p)^3 \cdot p^2. \end{array}$$

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Esperanza de una BN(n, p)

Su esperanza es

$$E(X) = \sum_{k=0}^{+\infty} k \cdot {k+n-1 \choose n-1} \cdot (1-p)^k \cdot p^n = n \cdot \frac{1-p}{p}.$$

La esperanza de X^2 es:

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} k^2 \cdot {k+n-1 \choose n-1} \cdot (1-p)^k \cdot p^n = n \cdot \frac{1-p}{p^2} + \left(n \cdot \frac{1-p}{p}\right)^2.$$

Varianza de una BN(n, p)

Por último, la varianza es:

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2 = n \cdot \frac{1-p}{p^2} + \left(n \cdot \frac{1-p}{p}\right)^2 - \left(n \cdot \frac{1-p}{p}\right)^2 = n \cdot \frac{1-p}{p^2}$$

$$\sqrt{Var(X)} = \frac{\sqrt{n(1-p)}}{p}$$

Resumen Binomial Negativa BN(n,p)

X = BN(n, p)	Número de fracasos antes de conseguir el n -ésimo éxito. Probabilidad de éxito p
$D_X = P(Y - k) = P(X	$ \begin{cases} \{0,1,2,3\ldots\} \\ \left\{ \begin{array}{ll} \binom{k+n-1}{n-1} \cdot (1-p)^k \cdot p^n, & \text{si } k=0,1,\ldots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array} \right. \end{cases} $
$I_{X}(n) = I(X = n) =$	$ \begin{cases} 0, & \text{en otro caso.} \\ 0, & \text{si } x < 0 \end{cases} $
$F_X(x) = P(X \leq x) =$	$ \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ \sum_{i=0}^{k} P(X=i) & \text{si } \begin{cases} k \le x < k+1, \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{cases} $
	Calcular la suma o utilizar funciones de R o
	Python.
$E(X) = n \cdot \frac{1-p}{p}$	Python. $Var(X) = n \cdot \frac{1-p}{p^2}$

Exercise 3.8. Ejercicio: Puerta con dos cerraduras

Recordemos nuestra puerta con dos cerraduras que se abren secuencialmente. Tenemos un manojo de 10 llaves casi idénticas de manera que cada vez que probamos una llave olvidamos qué llave hemos

Sea X la v.a que nos da el número de intentos fallidos hasta abrir abrir la puerta.

Estamos interesado en modelar este problema. La preguntas son:

En general, su función de probabilidad es

$$P_X(k)=P(X=k)=\left\{\begin{array}{ll} \binom{k+n-1}{n-1}\cdot (1-p)^k\cdot p^n, & \text{si } k=0,1,\dots\\ 0, & \text{en otro caso}. \end{array}\right.$$

Una v.a. con este tipo de distribución recibe el nombre de **binomial negativa** y la denotaremos por BN(n, p)

Notemos que BN(1, p) = Ge(p).

Demostración

Justifiouemos el resultado. Sea Xuna BN(n,p)y sea $k=0,1,2,\dots$

 $P(X=k) = P(\operatorname{Todas}$ las cadenas de E's y F' con k F, con n E y acabadas en E)

$$k+n-1$$
 posiciones

 $n-1$ Éxitos.

 $EFFF...EEF$

De estas cadenas hay tantas como maneras de elegir de entre las k+n-1 primeras posiciones n-1 para colocar los éxitos. Esta cantidad es el número binomial $\binom{k+n-1}{n-1}$,

Números binomiales negativos

Dados dos enteros positivos $n \ge k,$ se define el número binomial negativo como:

$$\binom{-n}{k} = \frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-k+1)}{k!}.$$

Los números binomiales negativos generalizan la fórmula de Newton para exponentes negativos:

$$(t+1)^{-n} = \sum_{k=0}^{+\infty} {-n \choose k} t^k.$$

R usa la función choose para calcular números binomiales, sean negativos o no. Veámoslo con un ejemplo:

$${\binom{-6}{4}} = \frac{-6 \cdot (-6-1) \cdot \cdot (-6-2) \cdot (-6-3)}{4!} = \frac{-6 \cdot (-7) \cdot (-8) \cdot (-9)}{24} = \frac{3024}{24} = 126.$$

Si realizamos el cálculo con R obtenemos el mismo resultado:

[1] 126

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

- 1. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X la v.a que nos da el número fallos hasta abrir la
- puerta?
 2. ¿Cuál es la función de probabilidad y de distribución de X?
 3. ¿Cuál es la probabilidad de fallar exactamente 5 veces antes de abrir la puerta?
 4. ¿Cuál es la probabilidad de fallar más de 4?
 5. ¿Cuál es el número esperado de fallos? ¿Y su desviación típica?

Solución 1. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X la v.a que nos da el número fallos hasta

Bajo estados condiciones tenemos que la probabilidad de "éxito" de cada intento es $p=\frac{1}{10}=0.1$. Como cada vez *olvidamos* qué llave hemos probado, cada intento será independiente del anterior.

Así que la variable X que queremos modelar cuenta el número de fallos de repeticiones sucesivas e independientes de un experimento Ber(p=0.1) hasta conseguir 2 éxitos en un experimento.

Por lo tanto podemos asegurar que X sigue un distribución BN(n = 2, p = 0.1).

Solución 2. ¿Cuál es la función de probabilidad y de distribución de X?

En general la función de probabilidad de una BN(n, p) es

$$P_X(X=k) = \left\{ \begin{array}{ll} \binom{k+n-1}{n-1} \cdot (1-p)^k \cdot p^n, & \text{si } k=0,1,\dots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Si aplicamos la expresión anterior para n=2 y p=0.1, obtenemos

$$P_X(X=k) = \left\{ \begin{array}{ll} \binom{k+2-1}{2-1} \cdot 0.9^k \cdot 0.1^2, & \text{si } k = 0,1,2, \dots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Simplificando,

$$P_X(X=k) = P(X=k) = \left\{ \begin{array}{ll} 0.01 \cdot (k+1) \cdot 0.9^k, & \text{si } k = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

La función de distribución en general es

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ \sum_{i=0}^k \binom{i+n-1}{n-1} \cdot (1-p)^{i+n-1} \cdot p^n, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \leq x < k+1, \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Simplificando para n = 2, p = 0.1.

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ \sum_{i=0}^k 0.01 \cdot (i+1) \cdot 0.9^{i+1}, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \leq x < k+1, \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Solución 3. ; Cuál es la probabilidad de fallar exactamente 5 veces antes de abrir la puerta?

$$P(X = 5) = 0.01 \cdot (5 + 1) \cdot 0.9^5 = 0.06 \cdot 0.9^5 = 0.0354294$$

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 91 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Solución 4. ¿Cuál es la probabilidad de fallar más de 4?

Nos piden calcular $P(X>4)=1-P(X\leq 4).$

Calculemos primero $P(X \le 4)$:

$$\begin{array}{ll} P(X \leq 4) &= \sum_{x=0}^4 P(X=x) \\ &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) \\ &= 0.01 \cdot (0+1) \cdot 0.9^9 + 0.01 \cdot (1+1) \cdot 0.9^1 + 0.01 \cdot (2+1) \cdot 0.9^2 \\ &+ 0.01 \cdot (3+1) \cdot 0.9^3 + 0.01 \cdot (4+1) \cdot 0.9^4 \\ &= 0.01 + 0.018 + 0.0243 + 0.02916 + 0.032805 = 0.114265. \end{array}$$

Por lo tanto

$$P(X > 4) = 1 - P(X \le 4) = 1 - 0.114265 = 0.885735.$$

Solución 5. ¿Cuál es el número esperado de fallos? ¿Y su desviación típica?

Como X sigue una ley BN(n=2,p=0.1)

$$E(X) = n \cdot \frac{1-p}{p} = 2 \cdot \frac{1-0.1}{0.1} = 18.$$

El número de fallos esperado es 18.

La varianza será:

La varianza serà:
$$Var(X)=n\cdot\frac{1-p}{p^2}=2\cdot\frac{1-0.1}{0.1^2}=180.$$
 La varianza de X es 180 y su desviación típica $\sqrt{180}=13.41641.$

La función de R que calcula la función de probabilidad de la binomial negativa con sus parámetros

dnbinom(x, size, prob,...)

donde ${\tt size}\ (n)$ es el número de éxitos y ${\tt prob}\ (p),$ la probabilidad de éxito.

Así, en el ejemplo de la puerta con dos cerraduras, X es una BN(n=size=2, p=prob=0.1). Por ejemplo, P(X = 5) que hemos calculado en el ejemplo anterior, vale:

dnbinom(5,size=2,p=0.1)

[1] 0.0354294

De forma similar calculamos calculamos $P(X \leq 4), \ P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4)$ y P(X > 4).pnbinom(4,size=2,p=0.1)


[1] 0 114265

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Gráficas de la binomial negativa con R

El siguiente código de R dibuja las función de probabilidad y la de distribución de una BN(n=2,p=1)

```
par(mfrow=c(1.2))
    aux=rep(0,22)
aux[seq(2,22,2)]=dnbinom(c(0:10),size=2,prob=0.1)
aux[seq(2,22,2)]=dnbinom(c(0:10),size=2,prob=0.1)
plot(x=c(0:10),y=dnbinom(c(0:10),size=2,prob=0.1),
   ylim=c(0,1),xlim=c(-1,11),xlab="x",
   main="Función de probabilidad\n BN(n=2,p=0.1)")
lines(x=rep(0:10,ach=2),y=aux, type = "h", tty = 2,col="blue")
curve(pnbinom(x,size=2,prob=0,1),
   xlim=c(-1,11),col="blue",
   main="Función de distribución\n BN(n=2,p=0.1)")
par(mfrow=c(1,1))
```



Gráficas interactivas binomial negativa

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
1-pnbinom(4,size=2,p=0.1)
Γ13 0.885735
pnbinom(4,size=2,p=0.1,lower.tail=FALSE)
[1] 0.885735
Cálculos con Python
La función con Python es nbinom.pmf(k, n, p, loc). Hay que cargarla desde scpi.stats
from scipy.stats import nbinom
nbinom.pmf(k, n, p, loc) = nbinom.pmf(k-loc, n, p)
0.03542940000000002
nbinom.pmf(k=5,n=2,p=0.1,loc=0)
0.03542940000000002
nbinom.cdf(k=4,n=2,p=0.1)
0.114265000000000003
1-nbinom.cdf(k=4,n=2,p=0.1)
0.8857349999999999
Generemos 100 observaciones aleatorias de una BN(n=2,0.1). Es decir serán las veces que hemos
fallado hasta abrir la puerta 100 veces.
nbinom.rvs(n=2, p=0.1, size=100)
array([48, 35, 27, 17, 24, 49, 30, 19, 7, 8, 24, 2, 22, 8, 11, 8, 18, 9, 10, 14, 12, 9, 4, 2, 34, 2, 16, 6, 15, 29, 16, 18, 12, 11, 8, 17, 14, 54, 20, 31, 8, 5, 7, 16, 36, 12, 36, 14, 16, 8, 18, 5, 4, 36, 5, 10, 23, 23, 24, 12, 8, 26, 23, 8, 30, 6, 3, 25, 9, 8, 67, 39, 3, 13, 21, 11, 19, 12, 12, 28, 32, 41, 3, 53, 39, 11, 31, 5, 12, 13, 25, 7, 17, 21, 8, 7, 32, 28, 11, 7])
La esperanza y la varianzade una BN(n = 2, 0.1) valen:
n, p=2,0.1
params = nbinom.stats(n,p,moments='mv')
print("E(X)={m}".format(m=params[0]))
print("Var(X)={v}".format(v=params[1]))
Var(Y)=180 0
```

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
fluidPage(
   fluidRow
               column (6
                                                     sliderInput("n_nbinom", label = "Número de éxitos n:",

min = 1, max = 50, value =20 , step = 1)),
               column(6.
                                                            renderPlot({
               n=input.$n nbinom
              pr=input$p_nbinom
               par(mfrow=c(1,2))
              pat(min(***-(1,2))
aux=rep(0,(n+1)*2)
aux[seq(2,(n+1)*2,2)]=dnbinom(c(0:n),size=n,prob=pr)
plot(x=c(0:n),y=dnbinom(c(0:n),size=n,prob=pr),
                                         ylim=c(0,1),xlim=c(-1,n+1),xlab="x"
              main=paste0(c"\minción de probabilidad\n BN(n=",n,",p=",pr,")"),
collapse = ""))
lines(x=rep(0:n,each=2),y=aux, type = "h", lty = 2,col="blue")
               named trapeon.example = n , rey = 1, rey = 2, rev = 
par(mfrow=c(1,1))
})
```

Exercise 3.9. Ejercicio


Buscad en los manuales de Python cómo se dibuja la función de probabilidad y de distribución de una binomial. negativa

```
Necesitamos de nuevo más librerías
```

```
import numpy as np
from scipy.stats import nbinom
import matplotlib.pyplot as plt
n, p = 10, 0.25
     np.arange(0,nbinom.ppf(0.99, n, p))
fig =plt.figure(figsize=(5, 2.7))
ax = fig.add_subplot(1,2,1)
ax.plot(x, nbinom.pmf(x, n, p), 'bo', ms=5, label='nbinom pmf')
ax.vlines(x, 0, nbinom.pmf(x, n, p), colors='b', lw=2, alpha=0.5) for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
```



Distribucion Binomial Negativa



Exercise 3.10. Ejercicio: acceso aleatorio a un sistema con triple clave

Supongamos que tenemos un sistema informático que tiene un programa de seguridad que genera accesos con claves de 3 dígitos $000,001,\dots 999$. En total tenemos 1000 posibilidades.

Como una clave de tres dígitos es fácil de romper, proponemos considerar tres claves consecutivas de acceso al sistema, cada una de 3 dígitos.

Para acceder al sistema hay que dar las tres claves de forma consecutiva y por orden.

Es decir hasta que no averiguamos la primera clave no pasamos a la segunda clave.

Supongamos que cada vez que ponemos las dos claves olvidamos el resultado y seguimos poniendo claves al azar hasta adivinar la contraseña.

Así hasta conseguir entrar en el sistema.

Sea X la v.a que nos da el número de fallos antes de entrar en el sistema

Estamos interesados en modelar este problema. La preguntas son:

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

nbinom.pmf(150,n=3,p=0.001)

9.876743459670217e-06

Vemos que es muy improbable fallar 150 veces antes de acceder al sistema

Solución 4. ; Cuál es la probabilidad de fallar más de 150 veces antes de entrar en el sistema?

Nos piden calcular la probabilidad siguiente:

$$P(X > 150) = 1 - P(X \le 150).$$

Calculemos $P(X \le 150)$

$$\begin{array}{ll} P(X \leq 150) & = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + \ldots + P(X=150) \\ & = \sum\limits_{k=0}^{150} \binom{k+3-1}{3-1} \cdot (0.999)^k \cdot 0.001^3 = \ldots = 5.2320035 \times 10^{-4} \end{array}$$

Si hacemos el cálculo con R, obtenemos

pnbinom(150,3,0.001)

Si lo hacemos en Python, obtenemos el mismo resultado:

nbinom.cdf(150,n=3,p=0.001)

0.0005232003490824058

El valor pedido será pues:

$$P(X>150)=1-P(X\leq 150)=1-5.2320035\times 10^{-4}=0.9994768.$$

Vemos que es muy probable que fallemos más de 150 veces antes de entrar en el sistema.

Solución 5. ; Cuál es el número esperado de fallos antes de acceder al sistema? ; Y su varianza?

$$\begin{split} E(X) &= n \cdot \frac{1-p}{p} = 3 \cdot \frac{1-0.001}{0.001} = 2997. \\ Var(X) &= n \cdot \frac{1-p}{p^2} = 3 \cdot \frac{1-0.001^2}{0.001^2} = 2.997 \times 10^6. \end{split}$$

Con Python:

params = nbinom.stats(n=3,p=0.001,moments='mv') print("E(X) = {m}".format(m=params[0]))

E(X) = 2997.0

print("Var(X) = {v}".format(v=params[1]))

Var(X) = 2997000.0

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

1. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X, la v.a que nos da el número de fallos antes de ¿Unal es la distribución de probabilidad y de distribución del X?
 ¿Cuál es la función de probabilidad y de distribución del X?
 ¿Cuál es la probabilidad de fallar 150 veces antes de acceder en el sistema?
 ¿Cuál es la probabilidad de fallar más de 150 veces antes de entrar en el sistema?
 ¿Cuál es la probabilidad de fallar más de 150 veces antes de entrar en el sistema?
 ¿Cuál es el número esperado de fallos antes de acceder al sistema? ¿Y su varianza?

Solución 1. ¿Cuál es la distribución de probabilidad de X, la v.a que nos da el número de fallos antes

Bajo estas dos condiciones tenemos que la probabilidad de "éxito" de cada intento es $p=\frac{1}{1000}=0.001$. Y como cada vez *olvidamos* los dígitos cada intento será independiente del anterior.

Así que la variable X cuenta el mímero de fracasos independientes hasta conseguir 3 éxitos en un experimento Ber(p=0.001), por lo tanto X sigue un distribución BN(n=3,p=0.001).

Solución 2. ¿Cuál es la función de probabilidad y de distribución del X

En general la función de probabilidad de una BN(n,p) es:

$$P_X(X=x)=P(X=x)=\left\{\begin{array}{cc} \binom{x+n-1}{n-1}\cdot (1-p)^x\cdot p^n, & \text{si } x=0,1,\dots\\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array}\right.$$

En particular la función de probabilidad de una BN(n=3,p=0.001)es

$$P_X(X=x) = P(X=x) = \left\{ \begin{array}{ll} \binom{x+2}{2} \cdot 0.999^x \cdot 0.001^3 & \text{si } x = 0,1,2,\dots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Solución 3. ¿Cuál es la probabilidad de fallar 150 veces antes de acceder en el sistema?

Nos piden calcular la probabilidad siguiente:

$$P(X = 150) = {152 \choose 2} \cdot 0.999^{150} \cdot 0.001^3.$$

choose(152,2)*0.999^150*0.001^3

o, usando la función de R que nos calcula la función de probabilidad:

dnbinom(150,size=3,p=0.001)

Γ1] 9.876743e-06

Si queremos calcular la probabilidad anterior con Python, tenemos que hacer:

from scipy.special import binom binom(152,2)*0.999**150*0.001**3

9.876743459670526e-06

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Exercise 3.11. Ejercicio: ¿Tres claves de tres dígitos o una de 9 dígitos?

Supongamos que ponemos una sola clave de 9 dígitos. Estudiemos en este caso la variable aleatoria que da el número de fallos antes de entrar en el sistema y comparemos los resultados.

Si seguimos suponiendo que cada vez ponemos la contraseña al azar, pero esta vez con una clave de 9 dígitos. La probabilidad de éxito será ahora $p=\frac{1}{10^9}$.

Si llamamos X_9 a la variable aleatoria que nos da el número de fallos antes de entra en el sistema seguirá una distribución $Ge(p=\frac{1}{10^9}=0.00000001)$.

Su valor esperado es

$$E(X_9) = \frac{1 - p}{p} = \frac{1 - 0.000000001}{0.000000001} = 10 \times 10^8.$$

1000000000 son 1000 millones de fallos esperados hasta abrir la puerta.

Recordemos que con tres contraseñas de 3 dígitos el valor esperado de fallos era:

$$3 \cdot \frac{1 - 0.001}{0.001} = 2997.$$

Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, es mejor una clave larga de 9 dígitos que tres

3.1.5. Distribución de Poisson

Diremos que una v.a. discreta X con $X(\Omega)=\mathbb{N}$ tiene distribución de Poisson con parámetro $\lambda>0$, y lo denotaremos por $Po(\lambda)$ si su función de probabilidad es:

$$P_X(x) = P(X=x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, & \text{ si } x=0,1,\dots \\ 0, & \text{ en otro caso.} \end{array} \right.$$

Usando que el desarrollo en serie de Taylor de la función exponencial es

$$e^{\lambda} = \sum_{0}^{+\infty} \frac{\lambda^{x}}{x!}$$

es fácil comprobar que la suma de la función de probabilidad en todos los valores del dominio de X, o sea, los enteros positivos, vale 1.

Además, recordemos que dado $x \in \mathbb{R} - \{0\}$ se tiene que

$$\lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

Usando la expresión anterior para $x=-\lambda,$ tenemos:

$$\lim_{n\to\infty} \left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{-\lambda}{n}\right)^n = e^{-\lambda}.$$

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 100 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

La distribución de Poisson como "límite" de una binomial

La distribución de Poisson (Siméon Denis Poisson) aparece en el conteo de determinados eventos que se producen en un intervalo de tiempo o en el espacio.

Supongamos que nuestra variable de interés es X, el número de eventos en el intervalo de tiempo (0, t]. como por ejemplo el número de llamadas a un call center en una hora donde suponemos que se cumplen las siguientes condiciones:

- 1. El número promedio de eventos en el intervalo (0,t] es $\lambda>0$. 2. Es posible dividir el intervalo de tiempo en un gran número de subintervalos (denotemos por n al número de intervalos) de forma que:
 - La probabilidad de que se produzcan dos o más eventos en un subintervalo es despreciable.
 - El número de ocurrencias de eventos en un intervalo es independiente del número de ocurrencias en otro intervalo.

Bajo estas condiciones, podemos considerar que el número de eventos en el intervalo (0,t] será el número de "éxitos" en n repeticiones independientes de un proceso Bernoulli de parámetro \boldsymbol{p}_n

Entonces si $n \to \infty$ y $p_n \cdot n$ se mantiene igual a λ , resulta que la función de probabilidad de X_n se

$$\begin{split} P(X_n = k) &= \binom{n}{k} \cdot p_n^k \cdot (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}. \end{split}$$

Si hacemos tender n hacia ∞ , obtenemos

$$\lim_{n\to\infty}P(X_n=k)=\lim_{n\to\infty}\frac{\lambda^k}{k!}\cdot\frac{n!}{(n-k)!\cdot n^k}\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\cdot\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}.$$

Calculemos el límite de algunos de los factores de la expresión

$$\begin{array}{ll} \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n!}{(n-k)!^{-k}} &= \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\cdot(n-1)\cdot(n-k-1)}{n^k} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^k+\cdots}{n^k} = 1,\\ \lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n &= e^{-\lambda},\\ \lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k} &= \lim\limits_{n\to\infty}1^{-k} = \lim\limits_{n\to\infty}1 = 1,\\ \end{array}$$

donde en el último límite, hemos tenido en cuenta que k es constante.

Usando las expresiones halladas anteriormente, tenemos que el límite de la función de probabilidad de la variable X_n^1 tiende a la función de probabilidad de la variable de Poisson de parámetro λ

$$\lim_{n\to\infty}P(X_n=k)=\lim_{n\to\infty}\left(\begin{array}{c}n\\k\end{array}\right)\cdot p_n^k\cdot (1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot 1\cdot e^{-\lambda}\cdot 1=\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}.$$

Usando que las variables X_n tienen distribución $B(n,p_n=\frac{\lambda}{n})$, tenemos que el límite de binomiales de parámetros n y $p_n=\frac{\lambda}{n}$ es una distribución de Poisson de parámetro λ , $Po(\lambda)$.

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

Dada una variable aleatoria de distribución B(n,p), si n es grande y p es pequeño podemos aproximar la distribución anterior por una distribución Poisson de parámetro $\lambda=n\cdot p, \ Po(\lambda=n\cdot p)$

Un criterio para decidir que la aproximación anterior es buena es que $n \geq 20$, o mejor, $n \geq 30$, $n \cdot p < 10$ v p < 0.05

La aproximación de la función de probabilidad de una variable binomial a una variable de Poisson es óptima en los valores cercanos a $E(X)=\lambda.$

Gráficos de la aproximación binomial a la de Poisson

Suponemos que estamos en las condiciones anteriores: $n \geq 20, n \cdot p < 10, p \leq 0.05$

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidPage(
fluidRow(
 column(6
      column(6.
       5, sliderInput("p_binomP", label = "Probabilidad éxito p:", min = 0.001, max = 0.9, value = 0.05, step = 0.001)
 n=input$n_binomP
 pr=input$p_binomP
par(mfrow=c(1,2))
aux=rep(0,(n+1)*2)
aux=rep(0,(n+1)*2)
aux[seq(2,(n+1)*2,2)]=dpois(c(0:n),n*pr)
```

Procesos de Poisson

Lo interesante de las variables Poisson es que podemos modificar (si el modelo lo permite) el intervalo de tiempo (0,t] en el que contamos los eventos, siempre y cuando se cumplan las condiciones 1 y 2 enunciadas anteriormente en el nuevo intervalo de tiempo.

En general, podemos afirmar si la variable es Poisson en (0,t], también lo será en cualquier subintervalo (0,t'] para todo t' tal que 0 < t' < t.

De esta forma, podremos definir una serie de variables X_t de distribución $Po(\lambda \cdot t)$.

Definición de procesos de Poisson

Consideremos un experimento Poisson con λ igual al promedio de eventos en una unidad de tiempo (u.t.).

Si t es una cantidad de tiempo en u.t., la v.a. X_t definida como el número de eventos en el intervalo (0,t] es una $Po(\lambda \cdot t)$.

El conjunto de variables $\{X_t\}_{t>0}$ recibe el nombre de **proceso de Poisson**.

Resumen de la distribución de Poisson $X \equiv Po(\lambda)$

$$\begin{array}{ccc} X \ \text{Poisson} & \lambda \\ D_X & \{0,1,\ldots\} \\ P_X(x) = P(X=x) = & \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}, & \text{si } x=0,1,\ldots \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} \\ F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=0}^k P(X=i) = & \begin{cases} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}, & \text{si } \begin{cases} k \leq x < k+1, \\ k = 0,1,2,\ldots \end{cases} \\ \text{Calcular la suma o utilizar funciones de R o} \\ Python. \\ E(X) = \lambda & Var(X) = \lambda \\ \end{array}$$

Resumen proceso Poisson $X_t \equiv Po(\lambda \cdot t)$

$$\begin{array}{ccc} X_i \; Po(\lambda \cdot t) & \lambda \; \text{promedio por u.t.} \\ D_X &= & \{0,1,\ldots\} \\ P_X(x) = P(X=x) = & \left\{ \begin{array}{ccc} \frac{(\lambda t)^i}{x^2} e^{-\lambda t} & \text{si } x=0,1,\ldots \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{array} \right. \\ F_X(x) = P(X \leq X) = \sum_{i=0}^k P(X=i) = & \left\{ \begin{array}{ccc} 0, & \text{si } x < 0, \\ \sum_{i=0}^k \frac{(\lambda \cdot t)^i}{i!} \cdot e^{-\lambda t}, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ccc} k \leq x < k + 1, \\ k = 0,1,2,\ldots \end{array} \right. \\ \text{Calcular la suma o utilizar funciones de R o} \\ Python. \\ E(X) = \lambda \cdot t & Var(X) = \lambda \cdot t \end{array} \right. \end{array}$$

Aproximación de la distribución binomial por la Poisson

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
curve(ppois(x,n*pr),
    xlim=c(-1.n+1).col="red".add=TRUE)
par(mfrow=c(1,1))
})
```

Example 3.4. Ejemplo de una distribución de Poisson $Po(\lambda)$: trampa para insectos

La conocida lámpara antiinsectos o insecticida eléctrico atrae a los insectos voladores con una luz ultravioleta y los mata por electrocución.

Consideremos la v.a. X que cuenta el número de insectos caídos en la trampa en una hora. Supongamos que el número promedio de insectos que captura la trampa en una hora es E(X)=20 y que podemos admitir que X sigue una ley de probabilidad $Po(\lambda=20)$.

Nos piden

- 1. Comentar de forma breve si se cumplen intuitivamente las condiciones para tener una distribución

- Forsson.
 Escribir de forma explícita la función de probabilidad y de distribución de X.
 Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa exactamente 21 inse
 Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa al menos 6 insectos.
 ¿Cuál es el valor esperando, la varianza y la desviación típica de X?

Solución 1. Comentar de forma breve si se cumplen intuitivamente las condiciones para tener una distribución Poisson

- El número promedio de eventos en el intervalo (0, 1], una hora es λ = 20 > 0.
 Es posible dividir el intervalo de tiempo de una hora en un gran número de subintervalos (denotemos por n al número de intervalos) de forma que:
 - La probabilidad de que se produzcan dos o más electrocuciones un subintervalo es despreciable. No es posible que dos mosquitos se electrocuten al mismo tiempo.

 El número de ocurrencias, electrocuciones de insectos, en un intervalo es independiente del
 - número de electrocuciones en otro intervalo.
 - La probabilidad de que un evento ocurra en un subintervalo es $p_n=\frac{\lambda}{n}$. Podemos dividir los 20 insectos promedio entre los n intervalos (trozo de hora) de forma que $p_n=\frac{\lambda}{n}$.

 - Por ejemplo si n=60 tenemos que $p_n=\frac{20}{60}=\frac{1}{3}.$ La probabilidad de que en un minuto la trampa chisporrotee es $\frac{1}{2}$.

Solución 2. Escribid de forma explícita la función de probabilidad y de distribución de X

La distribución de probabilidad de un $Po(\lambda)$ es

$$P_X(x) = P(X=x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, & \text{ si } x=0,1,\dots \\ 0, & \text{ en otro caso.} \end{array} \right.$$

103

105

En nuestro caso, $\lambda = 20$:

$$P_X(x) = P(X=x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{20^x}{x!}e^{-20}, & \text{ si } x=0,1,\ldots \\ 0, & \text{ en otro caso.} \end{array} \right.$$

La función de distribución es:

$$F_X(x) = P(X \leq X) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ \sum_{i=0}^k P(X=i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \leq x < k+1, \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

En nuestro caso:

$$F_X(x) = P(X \leq X) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x < 0, \\ \sum_{i=0}^k P(X=i) = \sum_{i=0}^k \frac{20^i}{i!} \cdot e^{-20}, & \text{si } \left\{ \begin{array}{ll} k \leq x < k+1, \\ k = 0, 1, 2, \dots \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Solución 3. Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa exactamente 21 insectos. Nos piden la probabilidad siguiente:

$$P(X = 21) = \frac{20^{21}}{21!}e^{-20} = 0.0846051.$$

Para realizar el cálculo anterior, podemos usar $\tt R$ como calculadora o usar la función d $\tt pois$ que nos calcula la función de distribución de la variable de Poisson:

20^(21)/factorial(21)*exp(-20)

[1] 0.08460506

dpois(21,lambda = 20)

[1] 0.08460506

Solución 4. Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa al menos 6 insectos Nos piden la probabilidad siguiente:

Solución 5. ¿Cuál es el valor esperado, la varianza y la desviación típica de X?

El valor esperado del número de insectos caídos en la trampa en una hora es:

$$E(X) = \lambda = 20.$$

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

 $\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \ 2 \ 5 \ 3 \ 3 \ 2 \ 2 \ 5 \ 2 \ 4 \ 4 \ 2 \ 3 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 3 \ 3 \ 5 \ 3 \ 3 \ 2 \ 4 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 1 \ 3 \ 4 \ 6 \ 2 \ 5 \ 3 \ 4 \ 1 \\ \begin{bmatrix} 38 \end{bmatrix} \ 1 \ 6 \ 3 \ 4 \ 1 \ 4 \ 3 \ 4 \ 3 \ 0 \ 2 \ 1 \ 4 \ 3 \ 0 \ 2 \ 4 \ 2 \ 3 \ 5 \ 2 \ 1 \ 3 \ 3 \ 4 \ 2 \ 5 \ 0 \ 3 \ 1 \ 1 \ 4 \ 6 \ 4 \ 5 \ 0 \ 4 \\ \begin{bmatrix} 75 \end{bmatrix} \ 0 \ 3 \ 3 \ 3 \ 4 \ 1 \ 2 \ 6 \ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \ 1 \ 2 \ 5 \ 2 \ 5 \ 3 \ 7 \ 3 \ 5 \ 2 \ 3 \ 2 \ 1 \ 3 \ 3 \\ \end{bmatrix}$

Exercise 3.12. Ejercicio de la trampa para insectos (continuación)

En el ejercicio de la trampa para insectos teníamos que X es una Po(20). Responded con R a la preguntas 3 y 4 de este ejercicio

Pregunta 3. Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa exactamente 21 insectos.

Recordemos que la probabilidad pedida es P(X=21):

dpois(21,lambda=20) # P(X=21)

[1] 0.08460506

Pregunta 4. Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa al menos 6 insectos.

Recordemos que la probabilidad pedida es $P(X \ge 6) = 1 - P(X < 6) = 1 - P(X \le 5)$:

ppois(5,lambda=20)

[1] 7.190884e-05

1-ppois(5,lambda=20) # es 1-P(X<=5)=P(X>=6)

[1] 0.9999281

acumula hacia arriba P(X>5)=P(X>=6)=P(X=6)+P(X=7)+...ppois(5,lambda=20,lower.tail =FALSE)

[1] 0.9999281

Gráficos de la distribución Poisson con R

```
lambda=20
par(mfrow=c(1,2))
n=qpois(0.99,lambda=lambda)
 aux=rep(0,(n+1)*2)
aux=ep(0,(n+1)*2)
aux[seq(2,(n+1)*2,2)]=dpois(c(0:n),lambda=lambda)
ymax=max(ppois(0:n,lambda=lambda))
plot(x=c(0:n),y=dpois(c(0:n),lambda=lambda),
ylim=c(0,ymax),xlim=c(-1,n+1),xlab="x",
main=paste(0(c("Funcion de probabilidad\n Po(lambda=",lambda,")"),
collapse = ""))
lines(x=rep(0:n,each=2),y=aux,pch=21, type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(ppois(x,lambda=lambda),
    xlim=c(-1,n+1), col="blue",
    main=pasteO(c("Función de distribución \n Po(lambda=",lambda,")"),
    collapse = ""))
par(mfrow=c(1,1))
```

Su varianza es

104

$$Var(X) = \lambda = 20,$$

y su desviación típica vale:

$$\sqrt{Var(X)} = +\sqrt{\lambda} = +\sqrt{20} = 4.47214.$$

Cálculos con R

Consideremos por ejemplo una v.a. Xcon distribución $Po(\lambda=3).$ Calculemos $P_X(0)=P(X=0), P_X(1)=P(X=1)$ con R: dpois(0,lambda = 3)

[1] 0.04978707

dpois(1,lambda = 3)

[1] 0.1493612

Si quisiéramos hallar la función de distribución en los mismos valores anteriores, $F_X(0) = P(X \le 1)$ 0), $F_X(1) = P(X \le 1)$, haríamos lo siguiente:

ppois(0,lambda = 3)

Γ17 0.04978707

ppois(1,lambda = 3)

[1] 0.1991483

dpois(0,lambda = 3)+dpois(1,lambda = 3) # es igual a ppois(1,lambda=3)

Γ17 0.1991483

A continuación, comprobemos que $F_X(10) = \sum_{i=1}^{10} P_X(x)$:

dpois(0:10,3)

- [1] 0.0497870684 0.1493612051 0.2240418077 0.2240418077 0.1680313557 [6] 0.1008188134 0.0504094067 0.0216040315 0.0081015118 0.0027005039
- [11] 0.0008101512
- sum(dpois(0:10,3))

[1] 0.9997077


ppois(10,3) Γ17 0.9997077

106

Si quisiéramos generar una secuencia de 100 observaciones para una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 3$, Po(3), tendríamos que hacer:

rpois(n=100,lambda = 3)

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES



Gráficos interactivos con R

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los en las distribuciones variando los parámetros.

```
lambda=input$lambda
par(mfrow=c(1,2))
n=qpois(0.99,lambda=lambda)
  aux=rep(0,(n+1)*2)
aux[seq(2,(n+1)*2,2)]=dpois(c(0:n),lambda=lambda)
   plot(x=c(0:n),y=dpois(c(0:n),lambda=lambda),
         (x=c(v:n),y=upois(c(v:n),i=moda=lamoda),
ylim=c(0,ymax),xlim=c(-1,n+1),xlab="x",
main=paste0(c("Función de probabilidad\n Po(lambda=",lambda,")"),
collapse = ""))
  lines(x=rep(0:n,each=2),y=aux,pch=21, type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(ppois(x,lambda=lambda),
```

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 107 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
xlim=c(-1,n+1),col="blue",
        main=pasteO(c("Función de distribución \n Po(lambda=".lambda.")").
par(mfrow=c(1,1))
})
                      collapse = ""))
```

Cálculos con Python

Realicemos los mismos cálculos realizados con R
 pero ahora usando Python. Recordemos que considerábamos una v.a.
 X con distribución $Po(\lambda=3).$ Calculemos
 $P_X(0)=P(X=0),P_X(1)=P(X=1)$ con Python

```
from scipy.stats import poisson
poisson.pmf(0,mu = 3)
0.049787068367863944
```

poisson.pmf(1,mu = 3)

0.14936120510359185

Si quisiéramos hallar las funciones de distribución en los mismos valores anteriores, $F_X(0) = P(X \le$ $0), F_X(1) = P(X \le 1),$ tendríamos que hacer:

```
poisson.cdf(0,mu = 3)
```

0.04978706836786395

poisson.cdf(1.mu = 3)

poisson.pmf(0,mu = 3)+poisson.pmf(1,mu= 3) # es igual a poisson.cdf(1,lambda=3)

0 1991482734714558

La comprobación de que $F_X(10) = \sum P_X(x)$ en Python se realiza de la forma siguiente:

```
range(0,10)
range(0, 10)
poisson.pmf(range(0,10),mu=3)
array([0.04978707, 0.14936121, 0.22404181, 0.22404181, 0.16803136, 0.10081881, 0.05040941, 0.02160403, 0.00810151, 0.0027005])
sum(poisson.pmf(range(0,10),mu=3))
```


0.9988975118698846

poisson.cdf(10,mu=3)

0 9997076630493527

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

fig.suptitle('Distribucion de Poisson') plt.show()



Gráficos interactivos para un proceso de Poisson $Po(\lambda \cdot t)$

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidPage(
         column(6,
      sliderInput("lambdapp", label="Promedio eventos por unidad de tiempo",
min = 0.1, max = 50, value =10, step = 0.01)),
column(6,sliderInput("t", label = "Intervalo de tiempo (0,t]",
min = 1, max = 120, value =1, step = 0.5))
renderPlot({
    lambda1=input$lambdapp
    t=input$t
   lambda=lambda1*t ## es lambda* t
   par(mfrow=c(1,2))
n=qpois(0.99,lambda=lambda)
    aux=rep(0,(n+1)*2)
   aux[seq(2,(n+1)+2,2)]=dpois(c(0:n),lambda=lambda)
ymax=ppois(which.max(ppois(0:n,lambda))-1,lambda)*0.7
   plot(x=c(0:n),y=dpois(c(0:n),lambda=lambda),
           ylim=c(0,ymax),xlim=c(-1,n+1),xlab="x"
```

Exercise 3.13. Ejercicio de la trampa para insectos (continuación)

En el ejercicio de la trampa para insectos teníamos que X es una Po(20). Responded con Python a la preguntas 3 y 4 de este ejercicio

 $\textbf{Pregunta 3.} \ \text{Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa exactamente 21 insectos. }$

```
Recordemos que la probabilidad pedida es P(X = 21):
poisson.pmf(21,mu=20) # P(X=21)
```

0.08460506418293791

Pregunta 4. Calculad la probabilidad de que en una hora caigan en la trampa al menos 6 insectos

```
La probabilidad pedida es P(X \ge 6) = 1 - P(X \le 5):
1-poisson.cdf(5,mu=20) # es 1-P(X<=5)=P(X>=6)
```

0.9999280911594716

Como ya hemos visto con scipy. stats, podemos pedir los momentos de una variable aleatoria Po(3)poisson.stats(mu=3, moments='mv')

Y también generar secuencias de observaciones aleatorias de una población Po(3): poisson.rvs(mu=3,size=40)

```
array([3, 4, 1, 7, 3, 6, 7, 2, 6, 4, 6, 2, 2, 3, 6, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 0, 5, 7, 9, 4, 5, 4, 6, 2, 6, 2, 3, 1, 3, 2, 6, 4, 2])
```

Gráficos con Python

110

```
from scipy.stats import poisson
mu = 10 ## mu = \tamoua \tau \text{ amoua} \text{ mu} \text{ -rn} \text{ armage(poisson.ppf(0.01, mu), poisson.ppf(0.99, mu))} \text{ fig = plt.figure(figsize=(5, 2.7))} \text{ ax = fig.add_subplot(1,2,1)}
ax.plot(x, poisson.pmf(x, mu), 'bo', ms=5, label='Poisson pmf')
ax.vlines(x, 0, poisson.pmf(x, mu), colors='b', lw=2, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
ax = fig.add_subplot(1,2,2)
ax.plot(x, poisson.cdf(x, mu), 'bo', ms=5, label='Poisson cdf')
ax.vlines(x, 0, poisson.cdf(x, mu), colors='b', lw=2, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get.major_ticks():
    tick.label.set_fontsize(5)
for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
   tick.label.set_fontsize(5)
```

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
collapse = ""))
lines(x=rep(0:n,each=2),y=aux,pch=21, type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(ppois(x,lambda=lambda),
    xlim=c(-1,n+1),col="blue",
    par(mfrow=c(1,1))
})
```

Example 3.5. Ejemplo: Número de impactos de insectos en la visera de un casco

Un colega de trabajo, al que llamaremos JG, es muy aficionado a los grandes premios de velocidad tanto en coches como en motos.

Como es tan aficionado, está obsesionado con muchas de las más extravagantes estadísticas de estos deportes. En particular le propusimos que estudiara el número de insectos que chocan contra la visera de un casco de un motorista GP o de un conductor de fórmula 1 .

La idea es que el número de insectos está igualmente repartido por todo el circuito y de promedio impactan $\lambda>0$ insectos por minuto. También es razonable suponer que:

- podemos dividir la superficie de la visera en cuadrados suficientemente pequeños de forma que
- la probabilidad de que caigan dos insectos en la misma zona es prácticamente 0.

 la probabilidad de que un insecto impacte en un cuadrado cualquiera de la visera es independiente de cualquier otro cuadrado.

 si hemos dividido la visera en n cuadrados la probabilidad p_n de impacto de un cuadrado vale

Bajo estas condiciones, si denotamos por X_t como el número de insectos que ha impactado en la visera en el intervalo (0,t] (en t minutos), podemos afirmar que X_t es un proceso de Poisson $Po(\lambda \cdot t)$

Supongamos que nos dicen que $\lambda=3$ insectos por minuto. Entonces el proceso de Poisson X_t seguirá un lev $Po(3 \cdot t)$.

Nos piden las probabilidades siguientes:

- 1. χ Cuál es la probabilidad de que en 10 minutos impacten más de 25 insectos? 2. χ Cuál es la probabilidad de que tengamos que esperar más de 2 minutos para observar el primer impacto?

Solución de 1. ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 minutos impacten más de 25 insectos?

En este caso t=10 y X_{10} es la variable aleatoria que nos da el número de insectos que impactan en 10 minutos o durante el intervalo [0,10). La distribución de X_{10} será de Poisson de parámetro $\lambda = 3 \cdot 10 = 30$, Po(30).

Nos piden la probabilidad siguiente: $P(X>25)=1-P(X\leq 25),$ que calculamos con ayuda de R:

F17 1

Solución de 2. ¿Cuál es la probabilidad de que tengamos que esperar más de 2 minutos para observar el primer impacto?

Nos piden la probabilidad siguiente $P(X_2=0)$ ya que la variable X_2 nos dice el número de impactos en dos minutos. La distribución de X_2 será de Poisson de parámetro $\lambda=2\cdot 3=6,$ Po(6). Si hemos de esperar más de dos minutos para el primer impacto, significa que $X_2=0$:

$$P(X_2 = 0) = \frac{(6)^0}{0!} \cdot e^{-6} = e^{-6} = 0.002479$$

Si usamos R, obtenemos:

6^0/factorial(0)*exp(-6)

[1] 0 002478752

ppois(0,lambda=3*2)

[1] 0.002478752

$3.1.6. \quad {\rm Distribuci\'on\ hipergeom\'etrica}$

Supongamos que disponemos de una urna de sorteos que contiene m bolas blancas y n bolas rojas.

En total en esta urna hay m+n bolas, m blancas y n rojas. Si extraemos dos bolas de la urna lo podemos hacer de dos formas:

- $\bullet\,$ Extraer una, anotar su color y reponerla. Sacar otra y anotar su color. Hemos extraído la bola
- Extraer simultáneamente dos bolas (sin reposición) y contar el número de bolas blancas.

Sea X es la v.a. que cuenta el número de bolas blancas extraídas.

- \bullet En el primer caso, X es una $B(n=2,p=\frac{m}{m+n})$ ya que consiste en repetir dos veces el mismo experimento de Bernoulli.
- ullet En el segundo caso, X sigue una distribución hipergeométrica que estudiaremos en esta sección.

Distribución hipergeométrica

Sean $n, \, m \neq k$ tres número enteros positivos y tales que k < m+n.

Consideremos una urna que contiene m+n bolas de las que m son blancas y las restantes n no (son

El número total de bolas es m+n. Extraemos de forma aleatoria k bolas de la urna sin reemplazarlas.

Sea X la v.a. que cuenta el número de bolas blancas extraídas. Diremos que la distribución de X es hipergeométrica de parámetros $m,\,n$ y k y la denotaremos por H(m,n,k)

Su dominio es

$$D_X = \{x \in \mathbb{N} \mid \max\{0, k-n\} \leq x \leq \min\{m, k\}\}$$

Para explicarlo, veamos varios ejemplos:

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

- 1. Hallar la función de probabilidad de X.

- Probabilidad de sacar dos bolas blancas. Probabilidad de sacar más de una bola blanca. Esperanza, varianza y desviación típica de X.

Solución de 1. Hallar la función de probabilidad de X

La función de probabilidad de X es:

$$P_X(x)=P(X=x)=\left\{\begin{array}{ll} \frac{\binom{m}{x}\binom{k-n}{x}}{\binom{m+n}{k}}, & \text{si m\'ax}\{0,k-n\}\leq x\leq \min\{m,k\}, \text{ para } x\in\mathbb{N},\\ 0, & \text{en otro caso}. \end{array}\right.$$

Sustituyendo los parámetros m,ny k por $m=15,\,n=10$ y k=3, obtenemos:

$$P_X(x) = P(X = x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\binom{15}{x}\binom{10}{3-x}}{\binom{23}{3}} = \frac{\binom{15}{x}\binom{10}{3-x}}{2300}, & \text{si } 0 \leq x \leq 3, \text{ para } x \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Solución de 2. Probabilidad de sacar dos bolas blancas

La probabilidad de sacar 2 blancas será:

$$P(X = 2) = \frac{\binom{15}{2} \cdot \binom{10}{3-2}}{\binom{25}{3}}$$

Si calculamos con ayuda de R los números binomiales involucrados en la expresión anterior, obtenemos: c(choose(15,2), choose(10,1), choose(25,3))

[1] 105 10 2300

La probabilidad pedida, será, pues: $P(X=2) = \frac{105 \cdot 10}{2300} = 0.4565217$.

Solución de 3. Probabilidad de sacar más de una bola blanca

La probabilidad de que saquemos más de 1 bola blanca es:

$$\begin{array}{ll} P(X>1) &= 1 - P(X\leq 1) = 1 - (P(X=0) + P(X=1)) \\ &= 1 - \left(\frac{\binom{n_1}{2} \binom{n_1}{2}}{\binom{n_1}{2}} + \frac{\binom{n_1}{2} \binom{n_2}{2}}{\binom{n_1}{2}} \right) \\ &= 1 - \left(\frac{120}{2300} + \frac{15 + 45}{2300} - 1 - \frac{120 + 15 + 45}{2300} = 0.6543478. \end{array}$$

Solución de 4. Esperanza, varianza y desviación típica de X

El número esperado de bolas blancas extraídas para una v.a. X de distribución H(m=15,n=10,k=10)

$$E(X) = \frac{k \cdot m}{m+n} = \frac{3 \cdot 15}{15+10} = \frac{45}{35} = 1.285714.$$

- H(m=5, n=2, k=3). Tenemos m=5 bolas blancas, n=2 no blancas y sacamos k=3 bolas
- R(m-n,n-n,n-n,n-n,n-n) sin reposición.

 En este caso el mínimo de bolas blancas extraídas es 1=k-n=3-2, ya que sólo hay dos no blancas.
- no biancas. En cambio, el máximo sí es k=3, ya que tenemos bolas biancas de "sobra". H(m=2,n=5,k=3). Tenemos m=2 bolas biancas, n=5 no biancas y sacamos k=3 bolas
 - En este caso el mínimo de bolas blancas es 0 ya que puedo sacar 3 no blancas
- En cambio, el máximo sí es m=2, ya que aunque saquemos k=3 bolas, al llegar a 2 ya hemos extraído todas las bolas blancas de la urna. H(m=10,n=10,k=3). Tenemos m=10 bolas blancas, n=10 no blancas y sacamos k=3
- bolas sin reposición.
- En este caso podemos obtener desde 0 blancas hasta k=3 blancas.

Su función de probabilidad es:

$$P_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \frac{\binom{m}{x} \cdot \binom{n}{k} \cdot n}{\binom{m+n}{k}}, & \text{si } \max\{0,k-n\} \leq x \leq \min\{m,k\}, \text{ para } x \in \mathbb{N}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{array} \right.$$

Observación: otras parametrizaciones

En ocasiones se parametriza una v.a. hipergeométrica mediante N=m+n, número total de bolas, k, número de extracciones y p, probabilidad de extraer una bola blanca.

Así, podemos parametrizar alternativamente la distribución hipergeométrica como H(N, k, p) don-

Resumen hipergeométrica H(m, n, k)

X=H(m,n,k)	Número de bolas blancas en k extracciones sin reposición de una urna con m bolas blancas y n no blancas
$D_X =$	$\{x \in \mathbb{N} \mid \max\{0, k - n\} \le x \le \min\{m, k\}\}\$
$P_X(x) = P(X = x) =$	$ \begin{cases} x \in \mathbb{N} \mid \min\{0, k-n\} \leq x \leq \min\{m, k\}\} \\ \begin{cases} \frac{\binom{m}{k} \cdot \binom{k-n}{k}}{\binom{m}{k}}, & \text{si } x \in [\max\{0, k-n\}, \min\{m, k\}] \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases} $
$F_{-}(x) = P(Y \le x)$	Hay que sumarla. Utilizad funciones de R o de
$\Gamma_X(x) = \Gamma(X \leq x)$	Python.
$E(X) = \frac{k \cdot m}{m + n}$	$Var(X) = k \cdot \frac{m}{m+n} \cdot \left(1 - \frac{m}{m+n}\right) \cdot \frac{m+n-k}{m+n-1}$

Example 3.6. Ejemplo: urna con m=15 blancas, n=10 rojas y k=3 extracciones sin reposición

Tenemos una urna con 15 bolas blancas y 10 bolas rojas. Extraemos al azar tres bolas de la urna sin reposición. Sea X el número de bolas **blancas** extraídas. Bajo estas condiciones, la v.a. X sigue una ley de distribución H(m=15,n=10,k=3).

Nos piden:

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

La varianza vale

114

113

$$\begin{array}{lll} Var(X) & = k \cdot \frac{m}{m+n} \cdot \left(1 - \frac{m}{m+n}\right) \cdot \frac{m+n-k}{m+1} \\ & = 3 \cdot \frac{15}{1510} \cdot \left(1 - \frac{13}{15120}\right) \cdot \frac{15+10-3}{15120-3} \\ & = 3 \cdot \frac{15}{25} \cdot \left(1 - \frac{15}{25}\right) \cdot \frac{21}{24} = 3 \cdot \frac{25}{25} \cdot \frac{25-15}{25} \cdot \frac{22}{24} \\ & = 3 \cdot \frac{35}{25} \cdot \frac{35}{25} \cdot \frac{20}{25} \cdot \frac{20}{25} \end{array}$$

Y por lo tanto, su desviación típica es

$$+\sqrt{Var(X)} = +\sqrt{0.66} = 0.812404.$$

Sea X una v.a. H(m,n,k). La función de R para calcular la función de probabilidad en un valor x, P(X=x), es dhyper $(\mathbf{x},\mathbf{m},\mathbf{n},\mathbf{k})$ y para calcular la función de distribución en un valor q, $P(X\leq q)$, es phyper $(\mathbf{q},\mathbf{m},\mathbf{n},\mathbf{k})$. Para generar una muestra de valores que siga la distribución H(m,n,k), hay que usar la función rhyper $(\mathbf{m},\mathbf{m},\mathbf{n},\mathbf{k})$ donde nn es el número de observaciones aleatorias deseado de la muestra.

Por ejemplo, si X es una H(m=15,n=10,k=3), los valores de P(X=2) y que P(X>1)1 - P(X < 1) son:

dhyper(x=2,m=15,10,k=3)

[1] 0.4565217

phyper(q=1,m=15,n=10,k=3)## sí, le han puesto q ya veremos el porqué

Γ17 0.3456522

1-phyper(q=1,m=15,n=10,k=3)

[1] 0.6543478

Una muestra aleatoria de este experimento de tamaño 200 sería:

rhyper(nn=200,m=15,n=10,k=3)

```
[112] 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 3
```

Gráficas con R


Los gráficos de la función de probabilidad y de la función de distribución en R se realizan de la forma siguiente:

```
par(mfrow=c(1,2))
n=10
k=3
```

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS 115 116 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
a=max(c(0,k-n))
b=min(c(m,k))
1=b-a+1
aux[seq(2,2*1,2)]=dhyper(c(a:b),m=m,n=n,k=k)
N=a.ou
plot(x,y=dhyper(x,m=m,n=n,k=k),
ylim=c(0,0.6),xlim=c(a=1,b=1),xlab="x",
main=paste0("Funcion de probabilidad\n H(m=",m,", n=",n,", k=",k,")"))
lines(x=rep(a:b,each=2),y=aux, type = "h", lty = 2,col="blue")
curve(phyper(x,m=m,n=n,k=k),
xlim=c(a-1,b+1),col="blue"
    main=paste0("Función de distribución\n H(m=",m,", n=",n,", k=",k,")"))
par(mfrow=c(1.1))
```

Función de probabilidad H(m=15, n=10, k=3) 9.0 m = m, n = n, k = k0.5 0 0.4 0.3 0.2 dhyper(x, Q 0.1 0.0 2 0 3



Gráficos interactivos H(m, n, k)

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

3.1. DISTRIBUCIONES DISCRETAS

```
min = 1, max = 50, value =15, step = 1)),
  column(4.
           sliderInput("nh2", label = "Número de bolas rojas n",
min = 1, max = 50, value =10 , step = 1)),
  column(4,
            4,

sliderInput("kh2", label = "Número bolas extraídas k",

min = 1, max=25, value = 3, step = 1)
renderPlot({
 m=input$mh2
  n=input.$nh2
  k=input$kh2
  #n=10
#k=3
  #m=15
  pr=round(m/(n+m),4)
  a=max(c(0,k-n))
  b=min(c(m,k))
  l=b-a+1
aux=rep(0,times=2*1)
  auxB=rep(0,times=2*(k+1))
aux[seq(2,2*1,2)]=dhyper(c(a:b),m=m,n=n,k=k)
  auxB[seq(2,2*(k+1),2)]=dbinom(0:k,k,pr)
  par(mfrow=c(1,2))
 par(mfrow=(1,2/)
plot(x=(0:k),y=dbinom(c(0:k),size=k,prob=pr),
ylim=c(0,0.6),xiin=c(-1,k+1),xlab="x",
main=paste0("Functiones de probabilidadh B(n=",n,"p=",pr,")
H(m=",m,"n=",n,"k=",k,")"))
  \label{lines} $$\lim(x=rep(0:k,each=2),y=aux,pch=21,\ type="h",\ lty=2,col="blue")$
  #aux=rep(0,(n+1)*2)
#aux[seq(2,(n+1)*2,2)]=dpois(c(0:n),n*pr)
```

```
fluidPage(
fluidRow
   column (4
            4, sliderInput("mh", label = "Número de bolas blancas m", min = 1, max = 50, value =15, step = 1)),
   column(4.
            sliderInput("nh", label = "Número de bolas rojas n",
min = 1, max = 50, value =10 , step = 1)),
   column(4,
            sliderInput("kh", label = "Número bolas extraídas k",
min = 1, max=25, value = 3, step = 1)
renderPlot({
   m=input$mh
   n=input$nh
k=input$kh
   #n=10
   #k=3
   par(mfrow=c(1,2))
   a=max(c(0,k-n))
   b=min(c(m,k))
   b=min(c(m,x))

l=b-a+1

aux=rep(0,times=2*1)

aux[seq(2,2*1,2)]=dhyper(c(a:b),m=m,n=n,k=k)
   main=paste0
par(mfrow=c(1,1))
})
          main=pasteO("Función de distribución\n H(m=".m.", n=".n.", k=".k.")"))
```

Comparación H(m,n,k) y $B\left(k,\frac{m}{n+m}\right)$

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidRow
  column(4
         sliderInput("mh2", label = "Número de bolas blancas m",
```

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Cálculos con Python

Sea X una H(m,n,k). Las funciones de scipy.stats cambian los parámetros de la forma siguiente:

- \bullet Mes el número total de bolas. Con nuestra parametrización M=m+n
-
• n es el número de bolas blancas. Con nuestra parametrización n=m
• N es el número de extracciones. Con nuestra parametrización N=k.

from scipy.stats import hypergeom

Los cálculos realizados anteriormente en $\tt R$ serían:

hypergeom.pmf(1,M=15+10,n=15,N=3)

0.29347826086956585

hypergeom.cdf(1,M=15+10,n=15,N=3)

0.3456521739130442

1-hypergeom.cdf(1,M=15+10,n=15,N=3)

0.6543478260869557

```
hypergeom.rvs(M=15+10,n=15,N=3,size=100)
```

```
array([2, 2, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 0, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 1])
```

Los gráficos de la función de probabilidad y de la función de distribución en python se realizan de la forma siguiente:

```
torma siguente:
from scipy.stats import hypergeom
[M, n, N] = [20, 7, 12] ##20 elementos, 7 del tipo, extraemos 12
x = np.arange(max(0, N-M+n),min(n, N))
fig =plt.figure(figsize=(5, 2.7))
=ax = fig. add_subplot(1,2,1)
=ax.plot(x, hypergeom.pmf(x, M, n, N), 'bo', ms=5, label='hypergeom pmf')
=ax.vlines(x, 0, hypergeom.pmf(x, M, n, N), colors='b', lw=2, alpha=0.5)
=ax.set_ylim([0, max(hypergeom.pmf(x, M, n, N))=1.1])
for tick in ax.xaxis.get_major_ticks():
=tick_label_set_fontsize_(5)
              =tick.label.set fontsize(5)
  for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
```


```
=tick.label.set_fontsize(5)
"tick.label.set_fontsize(b)
ax = fig.add_subplot(1,2,2)

"ax.plot(x, hypergeom.cdf(x, M, n, N), 'bo', ms=5, label='hypergeom.cdf')

"ax.vlines(x, 0, hypergeom.cdf(x, M, n, N), colors='b', lw=2, alpha=0.5)
for tick in ax.xaxis.get major_ticks():

"tick.label.set_fontsize(5)
for tick in ax.yaxis.get_major_ticks():
    =tick.label.set_fontsize(5)
    =fig.suptitle('Distribucion Hipergeometrica')
   =plt.show()
```

Distribucion Hipergeometrica



3.2. Cuantiles de distribuciones notables discretas

Example 3.7. Ejemplo

Consideremos una v.a. X de distribución B(5,0.5).

Los cuantiles $x_{0.3},\,x_{0.6}$ y $x_{0.8}$ son los siguientes:

qbinom(c(0.3,0.6,0.8),5,0.5)

[1] 2 3 3

Calculemos a mano, el valor $x_{0.3}$ y verifiquemos que da el mismo resultado que nos ha dado $\tt R$

La función de distribución de \boldsymbol{X} es:

$$F_x(x) = P(X \le x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.03125, & \sin 0 \le x < 1, \\ 0.18750, & \sin 1 \le x < 2, \\ 0.5000, & \sin 2 \le x < 3, \\ 0.81250, & \sin 3 \le x < 4, \\ 0.96875, & \sin 4 \le x < 5, \\ 1.00000, & \sin 5 \le x. \end{cases}$$

3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS

ytick=c(0.0,q,1)
axis(side=2, at=ytick, labels = TRUE)
axis(side=1, at=qbinom(q,n,p), labels = TRUE)
curve(ppois(x,lambda),xlim=c(0-0.25,2.5=lambda),ylim=c(0,1+0.1),
cul=blue=",nain=paste0("Función distribución \n Po(lambda=",lambda,")"),
ylab=paste0("dpois(x, lambda),ylambda,")"),yaxt="n")
segments(x0 = qpois(q,lambda),y0 = 0,x1 = qpois(q,lambda),y1 = q,lty=2,col="red")
segments(x0 = qpois(q,lambda),y0 = q,x1 = -0.25,y1 = q,lty=2,col="red")
ytick=c(0.0,q,1) ytick=c(0.0,q,1)ytick=c(0.0,q,1)

axis(side=2, at=ytick, labels = TRUE)

axis(side=1, at=qpois(q,lambda), labels = TRUE)

par(afrow=c(1,1))

))

3.3. Distribuciones continuas

3.3.1. Distribución uniforme

Una v.a. continua X tiene una distribución uniforme sobre el intervalo real (a,b) ,con a < b, si su función de densidad es

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{si } a < x < b, \\ 0, & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Exercise 3.15. Eiercicio

Comprobar que el área comprendida entre f_X y la horizontal vale 1.

El área pedida vale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x) \cdot dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} \cdot dx = \frac{x}{b-a} \bigg]_{x=a}^{x=b} = \frac{b}{b-a} - \frac{a}{b-a} = \frac{b-a}{b-a} = 1.$$

$$J_{-\infty} \qquad \qquad J_a \quad b-a \qquad \qquad b-a \mathbf{1}_{x=a} \quad b-a$$
 Su función de distribución es:
$$F_X(x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{si } a < x < b, \\ 1, & \text{si } b \leq x. \end{array} \right.$$

Efectivamente:

Si x ≤ a, entonces

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t) \cdot dt = \int_{-\infty}^{x} 0 \cdot dt.$$

• Si a < x < b entonces .

$$\begin{array}{ll} F_X(x) & = \int_{-\infty}^x f(t) \cdot dt = \int_{-\infty}^a 0 \cdot dt + \int_a^x \frac{1}{b-a} \cdot dt \\ & = 0 + \frac{t}{b-a} \Big|_{t-a}^{t=x} = \frac{x}{b-a} - \frac{a}{b-a} = \frac{x-a}{b-a}. \end{array}$$

El cuantil q=0.3 es el primer valor $x\in D_X$ tal que $F_X(x)=P(X\le x_{0.3})\ge 0.3$. Mirando la expresión anterior, comprobamos que $x_{0.3}=2$ ya que $F_X(2)=P(X\le 2)=0.5\ge 0.3$.

Exercise 3.14. Ejercicio

120

Calcular los cuantiles de 0.6 y 0.8 de una B(5,0.5).

Gráfico interactivo que muestra los cuantiles de las distribuciones B(n,p) y $Po(\lambda)$

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidPage(
fluidRow(
  column(3
         column(3, sliderInput("pq", label = "Par. p B(n,p)", min = 0.01, max = 0.99, value = 0.5, step = 0.1)
  ),
column(3,
sliderInput("qq", label=" Cuantil q", value=0.75, min = 0.01, max = 0.99,
                      step = 0.01)
 ),
column(3,
sliderInput("lq", label="Par. lambda Po(lambda)", value=5, min = 1, max = 20,
step = 1)
renderPlot({
  n=input$nq
  p=input$pq
q=input$qq
  q=inputSqq
lambda=inputS1q
par(mfrow=c(1,2))
#==10;p=0.5;q=0.75;lambda=5
#xz=c(seq(min(a,x),min(b,x),by=0.001))
probsB=pbinom(0:n,n,p)
```

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Por último si x > b entonces,

122

$$\begin{split} F_X(x) &= \int_{-\frac{\infty}{b}}^x f(t)dt = \int_a^b \frac{1}{b-a}dt = \left.\frac{t}{b-a}\right|_{t=a}^{t=b} \\ &= \frac{b}{b-a} - \frac{a}{b-a} = \frac{b-a}{b-a} = 1. \end{split}$$

Denotaremos a la v.a. X uniforme en el intervalo (a,b) por U(a,b).

Esperanza y varianza para una v.a. $X\ U(a,b)$

Calculemos la esperanza de X:

$$\begin{split} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{x^2}{2 \cdot (b-a)} \bigg|_{x=a}^{x=b} \\ &= \frac{b^2}{2 \cdot (b-a)} - \frac{a^2}{2 \cdot (b-a)} = \frac{b^2 - a^2}{2 \cdot (b-a)} = \frac{(b+a) \cdot (b-a)}{2 \cdot (b-a)} = \frac{b+a}{2}. \end{split}$$

De cara a calcular su varianza, calculemos primero la esperanza de $X^2\colon$

$$\begin{array}{ll} E(X^2) & = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = \frac{x^3}{3 \cdot (b-a)} \bigg]_{x=a}^{x=b} \\ & = \frac{b^3 - a^3}{2 \cdot (b-a)} = \frac{b^2 + ab + a^2}{2}. \end{array}$$

- \bullet Demostrad que la igualdad $b^3-a^3=(b-a)\cdot(b^2+ab+a^2)$ es cierta.
- $\, \bullet \,$ Utilizad
la para el cálculo final del valor de $E(X^2).$

Calculemos Var(X).

$$\begin{split} Var(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{b + a}{2}\right)^2 \\ &= \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{3} \\ &= \frac{4 \cdot (b^2 + ab + a^2) - 3 \cdot (b^2 + 2ab + a^2)}{2} \\ &= \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b \cdot 3)^2}{12}. \end{split}$$

Gráficas U(0, 1)


El código en R para dibujar la función de densidad y la función de distribución de una distribución U(0,1) es el siguiente


3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS 123 124 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
par(mfrow=c(1,2))
a=0:b=1
 \begin{array}{l} curve (punif(x,a,b),xlim=c(a-1,b+1),ylim=c(0,1.1),\\ col="blue",main=paste0("Función de distribución U(",a,",",b,")"),\\ ylab=paste0("punif(x,",a,", ",b,")",cex.axis=0.8) \end{array} 
par(mfrow=c(1,1))
```

Función densidad U(0,1)

Función de distribución U(0,1)





Gráficas interactivas U(a, b)

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

fluidPage(fluidRow(column(4,

3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS

125

Demostración

Supongamos que Xsigue una le
yU(a,b), que scale>0y que $T=scale\cdot X+loc.$ De
jamos el caso scale<0como ejercicio.

La función de distribución de X es:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1, & \text{si } b \leq x. \end{array} \right.$$

Si T vale $T = scale \cdot X + loc,$ su función de distribución será:

$$\begin{split} F_T(t) &= P(T \leq t) = P(scale \cdot X + loc \leq t) = P\left(X \leq \frac{t - loc}{scale}\right) = F_X\left(\frac{t - loc}{scale}\right) \\ &= \begin{cases} 0, &\text{is } \frac{t - loc}{scale} \leq a \\ \frac{t - loc}{scale} - a, &\text{is } a \leq \frac{t - loc}{scale} \leq b, \\ 1, &\text{is } b \leq \frac{t - loc}{scale} \end{cases} \\ 1, &\text{is } b \leq \frac{t - loc}{scale} \\ &= \begin{cases} 0, &\text{is } t \leq scale \cdot a + loc, \\ \frac{t - (scalea + loc)}{scale \cdot (b - a)}, &\text{is } scale \cdot a + loc, \\ 1, &\text{is } t \leq scale \cdot a + loc, \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0, &\text{is } t \leq scale \cdot a + loc, \\ \frac{t - (scalea + loc)}{scale \cdot b + loc \leq t}, &\text{is } t \leq scale \cdot a + loc, \\ \frac{t - (scalea + loc)}{scale \cdot b + loc - (scalea + loc)}, &\text{is } scale \cdot a + loc \leq t \leq scale \cdot b + loc, \\ 1, &\text{is } scale \cdot b + loc \leq t, \end{cases} \end{split}$$

función que corresponde a la función de distribución de una v.a. $U(scale \cdot a + loc, scale \cdot b + loc)$, como queríamos demostrar

Exercise 3.17. Ejercicio

Sea X una variable U(0,1) y sea $T = scale \cdot X + loc$:

- Si T es U(-5,5) ¿qué valores toman scale y loc?
- $\bullet\,$ Si loc=-10 y scale=10 ¿qué distribución de probabilidad sigue T?
- Si loc = 0 y scale = -1 ¿qué distribución probabilidad sigue T?

Resumen v.a con distribución uniforme, U(a,b)

Distribución uniforme
$$U(a,b)$$

$$D_X = (a,b)$$

$$f_X(x) \begin{cases} \int \frac{1}{b-a}, & \text{si } a < x < b, \\ \text{for en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

$$F_X(x) = P(X \le X) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le a \\ \frac{1}{b-a}, & \text{si } a \le x \le b, \\ 1, & \text{si } b \le x. \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \quad Var(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Cálculos con R

```
sliderInput("a1", label = "Parámetro a",
                                           min = -5, max = 9, value = 0, step = 0.1)
                                sliderInput("b1", label = "Parámetro b",
min = 10, max = 15, value = 5, step = 0.1)
                              sliderInput("x1", label="x", value=9, min = -5, max = 15, step = 0.1)
    renderPlot({
   a=input$a1
          b=input$b1
          x=input$x1
par(mfrow=c(1,2))
           xx=c(seq(min(a,x),min(b,x),by=0.001))
          xx=c(seq(min(a,x),min(b,x),by=0.001))
curve(dunif(x,a,b),xlim=c(a-0.25,b+0.25),ylim=c(0,max(1/(b-a)+0.05,0.1)),
col="blue",main=pasteO("punción densidad U(",a,",b,")"),
ylab=pasteO("dunif(x,",a,",",b,"),y.axt="n")
axia(side=1, at-c(a,x,b), labels = TRUE)
polygon(x=c(a,xx,min(x,b)),ye=(0,dunif(x,a,b),0),
density=20,col="skyblue")
curve(punif(x,a,b),xlim=c(a-1,b+1),ylim=c(0,1.1),col="blue",
mainumasteO("Eburión de distribución U(",a",",b","))
curve(punif(x,a,b),xlim=(ca-1,b+1),ylim=c(0,1.1),col="blue",
    main=paste0("Funcion de distribucion U(",a,",",b,")"),
    ylab=paste0("punif(x,",a,", ",b,")"),xaxt="n",yaxt="n")
    segments(x0=x,y0=0,xl=x,y1=punif(x,a,b),col="red",lty=2)
    segments(x0=x,10,1,y0=punif(x,a,b),xl=x,y1=punif(x,a,b),col="red",lty=2)
    aris(sid=2, at=c(0,round(punif(x,a,b),1),2), labels = TRUE)
    axis(sid=1, at=c(a,x,b), labels = TRUE)
    par(mfrow=c(1,1))
})
```

Transformación lineal de la v.a. uniforme

Si X sigue una distribución U(a,b) entonces $Z=\frac{X-a}{b-a}$ sigue una distribución U(0,1).

Propiedad: Transformación lineal de la v.a. uniforme

Sea X una v.a U(a, b).

Si $scale \neq 0$ v loc son dos constantes reales, entonces

- $\bullet \ \ {\rm si} \ scale > 0, \, T = scale \cdot X + loc$ sigue una ley $U(scale \cdot a + loc, scale \cdot b + loc)$
- si scale < 0, $T = scale \cdot X + loc$ sigue una ley $U(scale \cdot b + loc, scale \cdot a + loc)$

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Sea X una v.a. U(a,b). Las funciones dunif(x,a,b) y punif(x,a,b) calcular la función de densidad de distribución de X en el valor X. Por ejemplo, para $a=-1,\,b=1$ y x=0.5, los valores $f_X(x)$ y $F_X(x)$ valen:

```
dunif(x=0.5, min=-1,max=1)
```

[1] 0.5 punif(q=0.5,min=-1,max=1)

[1] 0.75

La función $\operatorname{runif}(\mathtt{n},\mathtt{a},\mathtt{b})$ calcula una muestra de observaciones de tamaño n que sigan la distribución U(a,b):

runif(n=5,min=-1,max=1)

[1] -0.5502232 -0.4271506 -0.0515360 0.8052209 0.8983523

Por defecto, el valor de los parámetros a y b son 0 y 1, respectivamente:

dunif(x=0.5)

[1] 1

punif(q=0.5)[1] 0.5

runif(n=5)

[1] 0.382302539 0.009313886 0.351767001 0.294007361 0.071581515

Cálculos con Python

Sea X una v.a. U(-1,1). Tomando como "base" la v.a. U(0,1), los parámetros loc y scale valen: loc= -1 y scale= 2, ya que como hemos visto X=2*U(0,1)-1=U(-1,1).

 $En \ {\tt Python}, \ hay \ que \ usar \ dichos \ parámetros \ para \ calcular \ la \ función \ de \ densidad \ y \ de \ distribución .$

from scipy.stats import uniform
uniform.pdf(0.5,loc=-1,scale=2)

uniform.ppf(0.5,loc=-1,scale=2)

0.5

Para generar una muestra de valores aleatorios, hay que usar la función uniform.rvs:

uniform.rvs(size=30,loc=-1,scale=2)

```
array([-4.27598541e-01. -8.93484488e-01. -5.43744816e-01. 4.93637775e-01.
            6.68487804e-01, 3.54843426e-01, 3.43752001e-01, 5.95017687e-01, 1.76726237e-01, 9.66420726e-01, 8.39622053e-01, 9.86753955e-01, 2.81556762e-01, -9.07377914e-02, -1.02140495e-01, -4.77437995e-01,
            2.94610534e-01, -6.78855056e-01, 6.48833178e-01, 4.14468405e-01,
```

3.22543638e-01, -2.23141364e-01, -5.10498250e-01, -2.85145094e-01, -2.44759622e-01, 1.50852131e-02, 7.65112353e-01, -5.13416906e-02, -7.06925865e-04, -8.95734519e-01])

Los valores de los parámetros por defecto son loc=0, scale=1:

uniform.pdf(0.5)

1.0

uniform.ppf(0.5)

uniform.rvs(size=5)

array([0.57819341, 0.06536339, 0.63316321, 0.77069648, 0.622381])

$3.3.2. \quad {\bf Distribuci\'on\ exponencial}$

Distribución del tiempo entre dos eventos Poisson

Supongamos que tenemos un proceso Poisson con parámetro λ en una unidad de tiempo

Dado un tiempo t, definimos N_t como el número de eventos en el intervalo de tiempo (0,t]. La distribución de N(t) es una $Po(\lambda \cdot t)$. Consideremos la v.a. T como el tiempo transcurrido entre dos eventos Poisson consecutivos.

Sea t > 0, entonces

$$\begin{array}{ll} P(T>t) &= P(\text{Cero eventos en el intervalo}(0,t]) \\ &= P(N_t=0) = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t}. \end{array}$$

Tomando complementarios, la función de distribución de T será:

$$F_T(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t) = \left\{ \begin{array}{ll} 0, & \text{si } t \leq 0, \\ 1 - e^{-\lambda t}, & \text{si } t > 0. \end{array} \right.$$

Para hallar la función de densidad de T, basta derivar la expresión anterior:

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda t}, & \text{si } t > 0, \\ 0, & \text{si } t \leq 0. \end{cases}$$

Llamaremos a la variable T exponencial de parámetro λ y la denotaremos por $Exp(\lambda)$.

Propiedad de la falta de memoria

Sea X una v.a. $Exp(\lambda)$, entonces

$$P(X>s+t|X>s)=P(X>t)$$
 para todo $s,t\in\mathbb{R}$

Demostración

3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS

pexp(0.5,rate=3,lower.tail = FALSE)

[1] 0.2231302

Cálculos con R

Las funciones de densidad y de distribución de una variable exponencial de parámetro λ en un valor x se pueden obtener en R usando las funciones dexp(x,1ambda) y pexp(x,1ambda), respectivamente. Para generar n valores aleatorios de una variable exponencial de parámetro λ , hay que usar la función rexp(n,lambda). Veamos un ejemplo de aplicación de las tres funciones anteriore

dexp(0.001,rate=3) # Alerta! No es una probabilidad, es una densidad y puede ser > 1

[1] 2.991013

pexp(0.5,rate=3) # P(X<0.5)

[1] 0.7768698

rexp(10,3) # Diez tiempos de una exponencial con lambda = 3

- [1] 0.32072389 0.57998323 0.26019628 0.48896233 0.31041354 0.11871455 [7] 0.10798351 0.18699902 0.10023100 0.03619832

Cálculos con Python

Las funciones de densidad y de distribución de una variable exponencial de parámetro λ en un valor x se pueden obtener en Python usando las funciones expon.pdf(x,scale=1/lambda) y expon.cdf(x,scale=1/lambda), respectivamente. Para generar n valores aleatorios de una variable exponencial de parámetro λ , hay que usar la función expon.rvs(scale=1/lambda,size=n). Veamos un ejemplo de aplicación de las tres funciones anteriores:

from scipy.stats import expon
expon.pdf(0.0001,scale= 1./3)

2.9991001349865014

expon.cdf(0.5,scale= 1./3)

0.7768698398515702

expon.rvs(scale=1./3,size=10)

array([0.26028702, 0.06614737, 0.03771628, 0.29421012, 0.06265574, 0.01010432, 1.0126632, 0.03497538, 0.88027, 0.27838208]

Resumen v.a con distribución exponencial, $Exp(\lambda)$

$$\begin{array}{ccc} X & Exp(\lambda) \\ D_X & = & (0, +\infty) \\ f_X(x) & = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{si } x \leq 0, \\ 0, & \text{si } x \leq 0, \end{cases} \\ F_X(x) = P(X \leq X) & = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{si } x > 0. \end{cases} \end{array}$$

Si X es una v.a. $Exp(\lambda)$ tenemos que $P(X>x)=1-P(X\leq x)=1-(1-e^{-\lambda \cdot x})=e^{-\lambda \cdot x}$ para todo

Por tanto,

128

$$\begin{array}{ll} P(X>s+t|X>s) & = \frac{P(\{X>s+t\}\cap\{X>s\})}{P(X>s)} = \frac{P(X>s+t)}{P(X>s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} \\ & = e^{-\lambda\cdot t} = P(X>t). \end{array}$$

Example 3.8. Ejemplo: el clásico problema del peluquero.

Una pequeña peluquería es regentada por un único peluquero. El peluquero está esperando al próximo cliente mientras lee el periódico.

Supongamos que la v.a. N_T , que representa el número de clientes que llegan en el intervalo [0,t), es una $Po(\lambda \cdot t)$ entonces la variable T, tiempo entre dos clientes consecutivos, sigue una ley $Exp(\lambda)$.

Supongamos que t se mide en horas y que $\lambda=4$ es el promedio de clientes por hora.

Se pide:

- 1. El tiempo esperado (en horas) y la varianza hasta el siguiente cliente. 2. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestro peluquero esté sin clientes (leyendo el periódico) más de 30 minutos (0.5 horas)?

En este ejemplo, la propiedad de la pérdida de memoria significa que por ejemplo, si el peluquero lleva ya esperando más de s>0.25 (un cuarto de hora), la probabilidad de que espere t=1/6 de hora más (10 minutos) no cambia, sigue siendo P(T>0.25+1/6|T>0.25)=P(T>1/6).

Solución de 1. El tiempo esperado (en horas) y la varianza hasta el siguiente cliente.

El tiempo esperado (en horas) hasta el siguiente cliente es

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} = 0.25,$$

y la varianza es

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{4^2} = 0.0625$$

Solución de 2. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestro peluquero esté sin clientes (leyendo el periódico) más de 30 minutos (0.5 horas)?

La probabilidad pedida vale:

$$P(X > 0.5) = 1 - P(X \le 0.5) = 1 - (1 - e^{-4 \cdot 0.5}) = e^{-2} = 0.1353353.$$

Usando $\mathtt{R},$ la probabilidad anterior puede ser calculada de la forma siguiente:

pexp(0.5, rate=3)

1-pexp(0.5,rate=3)

Γ17 0.2231302

130

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES


X	$Exp(\lambda)$
$E(X) = \frac{1}{5}$	$Var(X) = \frac{1}{\sqrt{2}}$


Gráficas de las funciones de densidad y de distribución de la variable aleatoria $Exp(\lambda = 10)$

```
lambda=10
lamoda=10
par(mfrow=(1,2))
curve(dexp(x,rate=lambda),xlim=c(-0.05,round(qexp(0.99,rate=lambda,2),2)+0.25),
ylim=c(0,dexp(0,lambda)+0.1),col="blue",
main=paste0("Función densidad Exp(",lambda,")"),
ylab=paste0("dexp(x,rate=",lambda,")"))
curve(pexp(x,rate=lambda),xlim=c(-0.05,qexp(0.999,10)),ylim=c(0,1.1),col="blue",
main=paste0("función de distribución Exp(",lambda,")"),
ylab=paste0("función de distribución Exp(",lambda,")"),
                     ylab=paste0("pexp(x,rate=",lambda,")"))
par(mfrow=c(1,1))
```

Función densidad Exp(10)

Función distribución Exp(10)





Exercise 3.18. Ejercicio

Consultad en el manual de Python scipy.stats.

Dibujad la función de densidad y de distribución de una $Exp(\lambda = 10)$.

3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS 131 132 CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

Gráficas interactivas de una variable $Exp(\lambda)$

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los cambios en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidPage(
 fluidRow(
                                sliderInput("le", label = "lambda",
    min = 0.1, max = 3, value =1 , step = 0.1)
                                  sliderInput("xe", label = "X=x",
min = 0, max = 5, value = 5, step = 0.1)
                                ).
                                  sliderInput("pe", label = "Cuantil p",


min = 0.01, max = 1, value = 0.75, step = 0.01)
 renderPlot({
   lambda=input$le
      p=input$pe
x=input$pe
#lambda=!O;p=0.75;z=0.4
xx=seq(0,x,by=0.001)
par(mfrow=c(1,2))
curve(dexp(x,rate=lambda),xlim=c(-0.05,round(qexp(0.999,rate=lambda),2)),
    ylim=c(0,dexp(0,lambda)+0.1),col="blue",
    main=paste0("función densidad Exp(",lambda,")"),
ylab=paste0("dexp(x,",lambda,")"),xaxt="m")
axis(side=1, at=c(0,x,round(qexp(0.999,rate=lambda),2)),cex.axis=0.8)
polygon(x=c(0,xx,max(x,xx)),y=c(0,dexp(xx, rate=lambda),0),
    density=20,col="skyblue")
curve(pexp(x,rate=lambda),xlim=c(0.01,dexp(0.999,rate=lambda)+0.1).
        p=input$pe
      density=20,col="skyblue")
curve(pexp(x,rate=lambda),xlim=c(0.01,qexp(0.999,rate=lambda)+0.1),
    ylim=c(0,1.1),col="blue",
    main=paste0("Función de distribución Exp(",lambda,")"),
    ylab=paste0("pexp(x,",lambda,")"),xaxt="n",yaxt="n")
segments(x0=0-0.05,y0=p,xi=qexp(p,lambda),y0=0,yi=p,col="red",lty=2)
axis(sid=2, at=seq(0,1,0.1), labels = TRUE)
axis(sid=1, at=seq(0,round(qexp(0.999,rate=lambda),2),by=0.1), labels = TRUE)
par(mfrow=c(1,1))
par(mfrow=c(1,1))
})
```

Exercise 3.19. Ejercicio: las bombillas que no envejecen.

3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS

Función de densidad de una normal estándar

133



Propiedades de la función de densidad de la distribución normal

Sea X una v.a. $N(\mu, \sigma)$ y sean f_X su función de densidad y $F_X(x) = \int_0^\infty f_X(t) dt$ su función de distribución. Entonces:

- 1. La función f_X verifica todas las propiedades de las funciones de densidad: $f_X(x)>0$, para todo $x \in \mathbb{R} \text{ y } \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1.$
- 2. La función $f_X(x)$ es simétrica respecto de la recta $x=\mu$: $f_X(\mu-x)=f_X(\mu+x)$, para todo
- $x\in\mathbb{R}$. S. f_X tiene un único máximo absoluto en $x=\mu$ que vale $f_X(\mu)=\frac{1}{\sqrt{2\pi x^2}}$. S. F_X es la función de distribución de X, entonces $F_X(\mu+x)=1-F_X(\mu-x)$, para todo $x\in\mathbb{R}$. S. En particular, si Z es una N(0,1), entonces $F_Z(-x)=1-F_Z(x)$ para todo $x\in\mathbb{R}$. S. E0. E1 E2 E3 es una E3. E4 es una E4. E5 es una E6. E7 es una E7. E8 es una E9. E9 es una E9 es una E9 es una E9. E9 es una E9. E9 es una E9. E9 es una
- 6. Z = [∞]/_{-∞} & suna va. N(0,1) γ A = σ · Z + μ es una x(μ, σ) sonac Z · ω ω ποιωπο.
 7. La función f_X es continua.
 8. lim_x f(x) = lim_x f(x) = 0 es decir tiene asíntota horizontal a derecha e izquierda.
 9. f es estrictamente creciente si x < μ y decreciente si x > μ.
 10. Tiene dos puntos de inflexión en x = μ + σ y en x = μ σ.

Supongamos que compramos una bombilla led que promete un valor esperado de duración de 10000 (1.14 años) horas de funcionamiento continuo. Además, nos aseguran que la distribución de X, el número de horas de funcionamiento continuo de una bombilla led, sigue una ley exponencial.

- Si X es Exp(λ) ¿cuál es el valor del parámetro λ?.
 ¿Cuál es la probabilidad de que una bombilla led ilumine más de 2 años?
 Supongamos que ya tengo una bombilla led funcionando 1 año ¿Cuál es la probabilidad de que dure dos años más?
 ¿Cuál es la probabilidad de que dure dos años más?
- ¿Cuál es la varianza de la duración en horas de este tipo de bombillas?

3.3.3. Distribución normal o Gaussiana

Una de las variables aleatorias continua más populares es la llamada distribución normal o Gaussiana.

Distribución normal o de Gauss Diremos que una v.a. X sigue una ley normal de parámetros μ y σ y la denotaremos por $N(\mu, \sigma)$ si tiene por función de densidad:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi \cdot \sigma^2}} e^{-\frac{1}{2} \cdot (\frac{x-\mu}{\sigma})^2},$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.


134


La gráfica de esta función de densidad es conocida como campana de Gauss.

La v.a. normal con $\mu=0$ y $\sigma=1$ recibe el nombre de normal estándar y se suele denotar por la letra $Z\sim N(0,1).$

curve(dnorm(x),main="Función de densidad de una normal estándar",xlim=c(-3.9,3.9))







Función de distribución de la N(0,1)

Su función de distribución es, como sabemos

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dt.$$

La función F(x) no tiene ninguna expresión algebraica "decente". Es por esta razón, y por comodidad, que esta función está tabulada o hay que calcularla usando un software estadístico.

Resumen v.a con distribución normal, $N(\mu, \sigma)$

$$\begin{array}{ccc} X & N(\mu,\sigma) \\ D_X = & \mathbb{R} = (-\infty,+\infty) \\ f_X(x) & = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{\frac{-2\pi\sigma^2}{2\sigma^2}} \text{ para todo } x \in \mathbb{R}. \\ F_X(x) = P(X \leq X) & \text{Utilized la función de R pnorm}(\mathbf{x},\text{mean*mu,sd**sigma}) \text{ o} \\ & \text{In función correspondiente en Python} \\ E(X) = \mu. & Var(X) = \sigma^2. \end{array}$$

Cálculos con R

3.3. DISTRIBUCIONES CONTINUAS norm.rvs(loc=1,scale=2,size=5)

137

```
array([-0.39510943, 4.43826187, 0.3330737, 1.92824044, 0.77307309])
```

Exercise 3.20. Ejercicio

Consultad SciPy.org para dibujar las funciones de densidad y de distribución con Python.

Gráficas interactivas usando los parámetros de la distribución normal

Para ejecutar el siguiente gráfico interactivo, solamente tienes que cargar el paquete shiny en tu ordenador y luego copiar/pegar las siguientes instrucciones. De este modo podrás observar los en las distribuciones variando los parámetros.

```
fluidPage(
fluidRow(
 column(3
       column(3.
        sliderInput("s1", label = "sigma1",

min =0.1, max = 5, value = 1, step = 0.1)
       ),
 column(3.
       SidderInput("m2", label="mu2", value=4, min = -10, max = 10, step = 0.05)
),
 column(3,
        renderPlot({
 m1=input$m1
m2=input$m2
 s1=input$s1
s2=input$s2
mins2=min(c(s1^2,s2^2))
m=min(c(qnorm(0.01,m1,s1),qnorm(0.01,m2,s2)))
M=max(c(qnorm(0.99,m1,s1),qnorm(0.99,m2,s2)))
expression(N(mu[2],sigma[2]))),
   col=c("red", "blue"), lty=c(1,2))
```

Las funciones que calculan la función de densidad y de distribución de una variable $N(\mu, \sigma)$ en un valor x son dnorm(x,mean=mu,sd=sigma) y pnorm(x,mean=mu,sd=sigma), respectivamente. Por ejemplo, para una variable $X \sim N(\mu=1,\sigma=2)$, la función de densidad $f_X(2)$ se puede calcular de la forma

dnorm(2,mean=1,sd=2)

Γ17 0.1760327

siguiente:

y la función de distribución $F_X(2) = P(X \leq 2)$ de la forma siguiente

pnorm(2,mean=1,sd=2)

[1] 0.6914625

Si queremos calcular el cuantil x_q de una distribución normal $N(\mu,\sigma)$ que, recordemos es el valor que cumple que $P(X \le x_q) = q$, tenemos que usar la función qnorm(q,mean=mu,sd=sigma):

qnorm(0.95,mean=1,sd=2)

Γ17 4.289707

Para generar ${\tt n}$ valores aleatorios de una distribución normal $N(\mu,\sigma),$ hay que usar la función rnorm(n,mean=mu,sd=sigma):

rnorm(n=5,mean=1,sd=2)

[1] -1.7813382 0.7320555 2.7209162 2.9098518 2.5098235

Cálculos con Python

Para poder trabajar con una distribución normal $N(\mu,\sigma)$ en Python, tenemos que importar norm de scipy.stas. Los parámetros μ y σ son loc y scale, respectivamente

from scipy.stats import norm

Por ejemplo, para una variable $X \sim N(\mu=1,\sigma=2)$, la función de densidad $f_X(2)$ se puede calcular de la forma siguiente:

norm.pdf(2,loc=1,scale=2)

0.17603266338214976

y la función de distribución $F_X(2) = P(X \le 2)$, de la forma siguiente:

norm.cdf(2.loc=1.scale=2)

0.6914624612740131

Si queremos calcular el cuantil x_q de una distribución normal $N(\mu,\sigma)$, tenemos que usar la función norm.ppf(q,loc=mu,scale=sigma):

norm.ppf(0.95,loc=1,scale=2)

4.289707253902945

Para generar n valores aleatorios de una distribución normal $N(u, \sigma)$, hav que usar la función norm.rvs(loc=mu,scale=sigma,size=n):

CAPÍTULO 3. DISTRIBUCIONES NOTABLES

```
curve(dnorm(x,m2,s2),add=TRUE,col="blue",lty=2)
```

Transformaciones lineales de variables aleatorias normales

Propiedad: transformación lineal la distribución normal

Sea X una variable $N(\mu, \sigma)$ entonces la variable Y = aX + b con $a \neq 0, b \in \mathbb{R}$ tiene distribución $N(a\mu + b, |a| \cdot \sigma)$

En el caso particular en que $a=\frac{1}{\sigma}$ y $b=\frac{-\mu}{\sigma}$ obtenemos la v.a. $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$, que se distribuye según una normal estándar N(0,1), es decir E(X)=0 y Var(X)=1. Dicha operación se denomina estandarización de la distribución normal.

La propiedad anterior nos permite calcular la función de distribución de cualquier v.a. $N(\mu, \sigma)$ a partir de la función de distribución de la distribución Z = N(0, 1):

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = F_Z\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

Entonces, basta conocer la manera de calcular F_Z para poder calcular F_X , para $X=N(\mu,\sigma)$, para cualquier μ y cualquier $\sigma > 0$.

Propiedades de la distribución normal estándar

En este caso, $\mu=0$ y $\sigma=1$. Podemos escribir algunas de las propiedades vistas para una distribución normal cualquiera de la forma siguiente:

- La propiedad f_X(\(\mu x\)) = f_X(\(\mu + x\)) se traduce a f_Z(-x) = f_Z(x)
 La propiedad F_X(\(\mu x\)) = 1 F_X(\(\mu + x\)) se traduce a F_Z(-x) = 1 F(x).
- Dado δ > 0,

$$P(-\delta \leq Z \leq \delta) = F_Z(\delta) - F_Z(-\delta) = F_Z(\delta) - (1 - F_Z(\delta)) = 2 \cdot F_Z(\delta) - 1.$$

Exercise 3.21. Ejercicio: cálculos con la distribución normal estándar

Sea ${\cal Z}$ una distribución N(0,1). Calcular las siguientes probabilidades en función de ${\cal F}_{\cal Z}$

- $P(-4 \le Z \le 4)$. $P(-2 \le Z \le 2)$.

- $P(-Z \le Z \le P(Z \le -2))$. $P(Z \le -2)$. $P(Z \le 2)$. $P(Z \ge 2)$. P(Z > 2).
- $P(Z \ge -2)$.

Resolución:

- $\begin{array}{ll} \bullet & P(-4 \leq Z \leq 4) = F_Z(4) F_Z(-4) = 2 \cdot F_Z(4) 1. \\ \bullet & P(-2 \leq Z \leq 2) = F_Z(2) F_Z(-2) = 2 \cdot F_Z(2) 1. \\ \bullet & P(Z \leq -2) = F_Z(-2) = 1 F_Z(2). \end{array}$
- $P(Z \le 2) = F_Z(2)$.