

SCHEDA INFORMATIVA

RAGNO VIOLINO



specie



RAGNO VIOLINO
(*Loxosceles rufescens*)

descrizione

- Dimensione maschio: 7 mm
- Dimensione femmina: 9 mm
- Colorazione: marrone giallastro, presenta due strisce scure longitudinali sul dorso.

caratteristiche del morso

Il morso è inizialmente indolore e la cute senza alterazioni. Nelle ore successive al morso: lesione arrossata, prurito e formicolii. Entro le 48-72 ore successive: può diventare necrotica e ulcerarsi. Il morso può veicolare batteri che proliferano e complicano il decorso della lesione. Nelle situazioni più gravi si verificano febbre, rush cutaneo, danni ai muscoli, ai reni ed emorragie.



Dove si possono trovare?

- Dietro a mobili e battiscopa.
- All'interno delle abitazioni preferisce zone poco frequentate (cantine, garage, sgabuzzini, soffitte ecc.) Può nascondersi anche dentro mobili e capi di vestiario.



Cos'è possibile fare autonomamente?

- In caso di puntura lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se accidentalmente presente nel luogo in cui si sta soggiornando, l'animale va, con le cautele del caso, rimosso o neutralizzato. Conservarlo per l'identificazione.
- Non sottovalutare il morso. Chiamare il centro antiveleni.

Cosa può fare ATS Milano?

ATS Milano svolge un ruolo di indirizzo e informativo rivolto a cittadini ed altri enti rispetto alle diverse tipologie di infestanti animali e vegetali. ATS Milano non esegue alcun intervento di disinfestazione.

Tel. 0266101029

Chiamare soprattutto se nelle ore successive al morso i sintomi si aggravano.



Riferimenti utili

Il morso del ragno violino

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
(ospedaleniguarda.it)

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

**ATS Milano
Città Metropolitana**