

CS446: Machine Learning, Fall 2017, Homework 1

Name: Yiming Gao (yimingg2)

Worked individually

Multivariate Poisson Naive Bayes

Problem 1

Solution:

$$P(y = A) = \frac{3}{7}, \quad P(y = B) = \frac{4}{7}$$

Using MLE to compute λ 's:

$$\begin{aligned} P(x_1 = x|y = A) &= \frac{e^{-\lambda_1^A} (\lambda_1^A)^x}{x!} \\ \Rightarrow P(D_n|y = A) &= \prod_{i=1}^3 P(x_i = x_i|y = A) = \frac{e^{-3\lambda_1^A} (\lambda_1^A)^{\sum x_{1i}}}{x_{11}! \cdot \dots \cdot x_{13}!} \\ \Rightarrow \log P(D_n|y = A) &= -3\lambda_1^A + \sum x_{1i} \log(\lambda_1^A) - \log(\prod x_{1i}!) \\ \Rightarrow \frac{\partial \log P(D_n|y = A)}{\partial \lambda_1^A} &= -3 + \frac{\sum x_{1i}}{\lambda_1^A} \\ \Rightarrow \lambda_1^A &= \frac{\sum x_{1i}}{3} = \frac{1+5+3}{3} = 3 \end{aligned}$$

Similarly, $\lambda_1^B = 5$, $\lambda_2^A = 6$, $\lambda_2^B = 4$.

Problem 2

Solution:

We have

$$\begin{aligned} P[x_1 = x|y = A] &= \frac{e^{-3} \cdot 3^x}{x!}, \quad P[x_1 = x|y = B] = \frac{e^{-5} \cdot 5^x}{x!}, \\ P[x_2 = x|y = A] &= \frac{e^{-6} \cdot 6^x}{x!}, \quad P[x_2 = x|y = B] = \frac{e^{-4} \cdot 4^x}{x!} \end{aligned}$$

Then

$$P[x_1 = 2|y = A] = 0.61, \quad P[x_2 = 3|y = A] = 0.09$$

$$P[x_1 = 2|y = B] = 0.08, \quad P[x_2 = 3|y = B] = 0.20$$

Thus,

$$\frac{P(x_1 = 2, x_2 = 3|y = A)}{P(x_1 = 2, x_2 = 3|y = B)} = 1.215$$

Problem 3

Derive an algebraic expression for the Poisson Naive Bayes predictor for Y in terms of the parameters estimated from the data.

Solution:

$$\begin{aligned} P(y = A|x_1, x_2) &= \frac{P(y = A) \cdot P(x_1, x_2|y = A)}{P(x_1, x_2)} \\ &\propto P(y = A) \cdot P(x_1|y = A) \cdot P(x_2|y = A) \\ &\propto \frac{3}{7} \frac{e^{-3} \cdot 3^{x_1}}{x_1!} \cdot \frac{e^{-6} \cdot 6^{x_2}}{x_2!} \end{aligned}$$

Similarly,

$$\begin{aligned} P(y = B|x_1, x_2) &= \frac{P(y = B) \cdot P(x_1, x_2|y = B)}{P(x_1, x_2)} \\ &\propto P(y = B) \cdot P(x_1|y = B) \cdot P(x_2|y = B) \\ &\propto \frac{4}{7} \frac{e^{-6} \cdot 6^{x_1}}{x_1!} \cdot \frac{e^{-4} \cdot 4^{x_2}}{x_2!} \end{aligned}$$

Thus

$$\frac{P(y = A|\mathbf{x})}{P(y = B|\mathbf{x})} = \frac{3}{4} \left(\frac{3}{5}\right)^{x_1} \left(\frac{3}{2}\right)^{x_2}$$

Problem 4

Solution:

For $\mathbf{x} = [x_1, x_2] = [2, 3]$, we have

$$\frac{P(y = A|\mathbf{x})}{P(y = B|\mathbf{x})} = \frac{3}{4} \left(\frac{3}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 0.91125 < 1,$$

So we have $y_{pred} = B$.