

傷寒金匱思維導圖

(修改版)

主要引用书目：

解读张仲景医学-经方六经类方证 /冯世伦 张长恩 著/人民军医出版社/2011. 04

腹证奇览 /（日）稻叶克 和久田寅 原著/中国书店出版部出版/1988. 10

胡希恕经方用药心得十讲 /冯世纶 主编/学苑出版社/2011. 08

康平本伤寒论讲稿 /李冠杰 讲述/ 经方医学委员会

古本康平本伤寒论 /李冠杰 整理

金匱要略方论（邓珍本） /李冠杰 整理

中国汤液经方（下部） 金匱要略传真 / 冯世纶·张长恩 主编 /人民军医出版社/2010. 03

中医与汉方腹诊 /刘文臣 周超凡 编著/江西科学技术出版社/1985. 08

胡希恕讲仲景脉学/段治钧 编著/中国中医药出版社/2011. 01

说明：

组成：数字后无单位的均以“两”计；

方解：主要引用《解读张仲景医学-经方六经类方证》/冯世伦 张长恩 著/人民军医出版社/2011.04

腹证：主要引用《腹证奇览》/（日）稻叶克 和久田寅 原著/中国书店出版部出版/1988.10

病理：引用《经方病理序号版》/经方医学委员会 整理

辨证要点：主要引用《解读张仲景医学-经方六经类方证》/冯世伦 张长恩 著/人民军医出版社/2011.04

相关条文：引用《古本康平本伤寒论》/李冠杰 整理

《解读张仲景医学-经方六经类方证》/冯世伦 张长恩 著/人民军医出版社/2011.04

条文说明：条文前数字1为康平本顶格条文，2为降一格条文，3为降两格条文；条文后数字为对应宋本条文位置。

2022.10.31

订正联系：jzzjhph

B

白虎加桂枝汤 121
白虎加人参汤 120
白虎汤 119
白散 116
白术散 263
白通加猪胆汁汤 129
白通汤 128
白头翁加甘草阿胶汤 100
白头翁汤 99
百合地黄汤 223
百合滑石散 224
百合鸡子汤 225
百合洗方 226
百合知母汤 227
柏叶汤 229
半夏干姜散 162
半夏厚朴汤 159
半夏苦酒汤 165
半夏麻黄丸 70
半夏散及汤 44
半夏泻心汤 107
奔豚汤 230
鳖甲煎丸 91

C

柴胡桂枝干姜汤 151
柴胡桂枝汤 152
柴胡加龙骨牡蛎汤 154
柴胡加芒硝汤 149
柴胡去半夏加瓜蒌汤 150
赤石脂禹余粮汤 147
赤丸 144
赤小豆当归散 196

D

大半夏汤 164
大柴胡汤 155
大承气汤 81
大黄蟪虫丸 89
大黄附子汤 143
大黄甘草汤 83
大黄甘遂汤 96
大黄黄连泻心汤 112
大黄牡丹汤 88
大黄硝石汤 114
大建中汤 135
大青龙汤 60
大陷胸汤 92
大陷胸丸 94
当归贝母苦参丸 221
当归建中汤 16
当归散 195

当归芍药散 194
当归生姜羊肉汤 197
当归四逆加吴茱萸生姜汤 19
当归四逆汤 18
抵挡汤 85
抵挡丸 86

F

矾石汤 231
矾石丸 232
防己地黄汤 208
防己茯苓汤 209
防己黄芪汤 210
风引汤 30
茯苓甘草汤 33
茯苓戎盐汤 214
茯苓四逆汤 125
茯苓杏仁甘草汤 222
茯苓饮 170
茯苓泽泻汤 34
附子粳米汤 136
附子汤 137
附子泻心汤 113

G

甘草粉蜜汤 186
甘草附子汤 43

甘草干姜茯苓白术汤 133
甘草干姜汤 131
甘草麻黄汤 62
甘草汤 179
甘草泻心汤 108
甘麦大枣汤 183
甘遂半夏汤 95
干姜附子汤 130
干姜黄芩黄连人参汤 111
干姜人参半夏丸 163
葛根黄芩黄连汤 104
葛根加半夏汤 12
葛根汤 11
瓜蒂散 122
瓜蒌桂枝汤 3
瓜蒌牡蛎散 233
瓜蒌瞿麦丸 203
瓜蒌薤白白酒汤 190
瓜蒌薤白半夏汤 191
桂苓五味甘草汤 38
桂枝二麻黄一汤 48
桂枝二越婢一汤 49
桂枝茯苓丸 50
桂枝附子汤 24
桂枝甘草龙骨牡蛎汤 29
桂枝甘草汤 32
桂枝加大黄汤 17
桂枝加附子汤 2

桂枝加葛根汤 10
桂枝加桂汤 4
桂枝加厚朴杏子汤 7
桂枝加黄芪汤 8
桂枝加龙骨牡蛎汤 5
桂枝加芍药汤 13
桂枝救逆汤 28
桂枝麻黄各半汤 47
桂枝去桂加茯苓白术汤 21
桂枝去芍药加附子汤 23
桂枝去芍药加麻辛附子汤 26
桂枝去芍药加皂荚汤 27
桂枝去芍药汤 22
桂枝人参汤 35
桂枝芍药知母汤 51
桂枝生姜枳实汤 52
桂枝汤 1
桂枝新加汤 6

H

诃梨勒散 234
红蓝花酒 235
侯氏黑散 236
厚朴麻黄汤 69
厚朴七物汤 79
厚朴三物汤 78
厚朴生姜半夏甘草人参汤 161

滑石白鱼散 215
滑石代赭汤 228
黄连阿胶汤 105
黄连粉(失) 269
黄连汤 110
黄芪桂枝五物汤 20
黄芪建中汤 15
黄芪芍药桂枝苦酒汤 9
黄芩加半夏生姜汤 102
黄芩汤 101
黄土汤 198

J

鸡屎白散 237
己椒苈黄丸 97
胶艾汤 199
胶姜汤(失) 270
近效术附子汤 264
九痛丸 265
桔梗汤 180
橘皮汤 167
橘皮竹茹汤 168
橘枳姜汤 169

K

苦参汤 238
葵子茯苓散 216

L

狼牙汤 239
藜芦甘草汤(失) 271
理中丸 132
苓甘五味姜辛汤 39
苓甘五味姜辛夏汤 40
苓甘五味姜辛夏杏汤 41
苓甘五味姜辛夏杏汤大黄汤 42
苓桂术甘汤 36
苓桂枣甘汤 37

M

麻黄醇酒汤 71
麻黄附子甘草汤 63
麻黄附子汤 64
麻黄加术汤 54
麻黄连轺赤小豆汤 72
麻黄升麻汤 73
麻黄汤 53
麻黄细辛附子汤 65
麻杏石甘汤 56
麻杏苡甘汤 55
麻子仁丸 80
麦门冬汤 204
蜜煎 240
牡蛎汤 66

牡蛎泽泻散 217
木防己去石膏加茯苓芒硝汤 207
木防己汤 206

P

排脓散 189
排脓汤 184
蒲灰散 213

Q

千金三黄汤 74
千金苇茎汤 241
去桂加白术汤 25

S

三物备急丸 117
三物黄芩汤 106
烧裤散 242
芍药甘草附子汤 182
芍药甘草汤 181
蛇床子散 243
射干麻黄汤 75
肾气丸 202
升麻鳖甲汤 244
升麻鳖甲汤去雄黄蜀椒汤 245
生姜半夏汤 160

生姜甘草汤 185
生姜泻心汤 109
十枣汤 98
蜀漆散 246
薯蓣丸 247
四逆加人参汤 124
四逆散 156
四逆汤 123
酸枣仁汤 201

T

桃核承气汤 84
桃花汤 146
天雄散 145
调胃承气汤 82
葶苈大枣泻肺汤 93
通脉四逆加猪胆汁汤 127
通脉四逆汤 126
头风摩散 248
土瓜根导(失) 272
土瓜根散 90

W

外台黄芩汤 103
王不留行散 249
温经汤 200
文蛤散 250

文蛤汤 61
乌梅丸 251
乌头赤石脂丸 142
乌头桂枝汤 140
乌头煎 139
乌头汤 141
吴茱萸汤 134
五苓散 45

X

下瘀血汤 87
硝石矾石散 252
小半夏加茯苓汤 158
小半夏汤 157
小柴胡汤 148
小承气汤 77
小儿疳虫蚀齿方 268
小建中汤 14
小青龙加石膏汤 68
小青龙汤 67
小陷胸汤 193
雄黄熏方 253
续命汤 76
旋复代赭汤 166
旋复花汤 254

Y

一物瓜蒂汤 255
薏苡附子败酱散 212
薏苡附子散 211
茵陈蒿汤 115
茵陈五苓散 46
禹余粮丸(失) 273
越婢加半夏汤 59
越婢加术汤 58
越婢汤 57

Z

皂荚丸 256
泽漆汤 153
泽泻汤 218
真武汤 138
栀子豉汤 171
栀子大黄汤 175
栀子甘草豉汤 172
栀子干姜汤 176
栀子厚朴汤 177
栀子蘖皮汤 178
栀子生姜豉汤 173
蜘蛛散 257
枳实芍药散 188
枳实薤白桂枝汤 192
枳实栀子豉汤 174
枳术汤 187

炙甘草汤 31
肘后獭肝散 258
猪胆汁方 259
猪肤汤 260
猪膏发煎 261
猪苓散 219
猪苓汤 220
竹皮大丸 262
竹叶石膏汤 205
竹叶汤 266
紫参汤 267
走马汤 118

附 1 方剂加减地图 275


麻黄类 275
桂枝类 276
承气类 277
桃核承气类 278
陷胸类 279
四逆类 280
半夏类 281
柴胡类 282
甘草类 283
泻心类 284
栀子类 285

附 2 腹诊图 287

附 3 胡希恕用药心得 289


附 4 胡希恕脉诊 307


附 5 汉今计量换算 309





①	太阳中风，阳浮而阴弱。 阳浮者，热自发，阴弱者，汗自出。 啻啻恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣，干呕者，桂枝汤主之。12
①	太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。13
①	太阳病下之后，其气上冲者， 方用前法，可与桂枝汤。 （注）若不上冲者，不得与之。15
②	桂枝本为解肌，若其人脉浮紧，发热汗不出者，不可与之也。常须识此，勿令误也。16.2
③	若酒客病、不可与桂枝汤、得汤则呕、以酒客不喜甘故也、17
①	大阳病、初服桂枝汤、反烦不解者、先刺、 风池风府 • 却与桂枝汤则愈、24
①	服桂枝汤、大汗出、脉洪大者、与桂枝汤、如前法、若形如疟、一日再发者、汗出必解、宜桂枝二麻黄一汤、25
①	太阳病，外证未解，脉浮弱者，当以汗解，宜桂枝汤、42
①	太阳病，外证未解，不可下也， 下之为逆，欲外解者，宜桂枝汤、44
③	太阳病先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈。浮为在外，而反下之，故令不愈，今脉浮故在外，当须解外则愈，宜桂枝汤、45
②	病常自汗出者，此为荣气和，荣气和者，外不谐，以卫气不共荣气谐和故尔，以荣行脉中，卫行脉外，复发其汗，荣卫和则愈，宜桂枝汤、53
③	病人脏无他病，时发热，自汗出而不愈者，此卫气不和也，先其时，发汗则愈，宜桂枝汤、54
③	伤寒不大便六七日，头痛有热者，与承气汤，其小便清者，知不在里，仍在表也，当须发汗，若头痛者必衄，宜桂枝汤、56
②	伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤、57
①	伤寒医下之、续得下利、清谷不止、身疼痛者、急当救里、后身疼痛、清便自调者、急当可救表、救里宜回逆汤、救表宜桂枝汤、91
③	太阳病，发热汗出者，此为荣弱卫强，故使汗出，欲救邪风者，宜桂枝汤、95
③	阳明病、脉迟、汗出多、微恶寒者、表未解也、可发汗、宜桂枝汤、234
②	病人不大便五六日、绕脐痛、烦燥、发作有时者、此有燥屎、故使不大便也（239）病人烦热、汗出则解、又如疟状、日晡所发热者、属阳明也、脉实者、宜下之、脉浮虚者、宜发汗、下之与大承气汤、发汗宜桂枝汤、240
②	太阴病，脉浮者，少可发汗宜桂枝汤（276）自利不渴者、属太阴、其脏有寒故也、当温之、 （注）宜服回逆辈 • 277
③	下利、腹胀满、身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤、372
	吐利头痛发热、 霍乱 • 身疼痛、热多欲饮水者、五苓散主之、寒多不用水者、理中丸主之、（386） 若脐上筑者、肾气动也、去术、加桂四两、吐多者、去术、加生姜三两、下多者、还用术、悸者、加茯苓二两、渴欲得水者、加术、足前成四两半、腹中痛者、加人参、足前成四两半、寒者加干姜、足前成四两半、 腹满者、去术、加附子一枚、服汤后、如食顷、饮热粥一升许、微自温、勿发揭衣被、吐利止、而身痛不休者、当消息和解其外、宜桂枝汤吐利止，而身痛不休者，当消息和解其外，宜桂枝汤，小和利之、387
	《金匮-呕吐啰下利》：下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆汤，攻表宜桂枝汤。
	《金匮-妇人妊娠》：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝汤主之。于法六十日当有此证，设有医治逆者，却一月，加吐下者，则绝之。
	《金匮-妇人产后》：产后风，续之数十日不解，头微痛，恶寒，时时有热，心下闷，干呕汗出，虽久，阳旦证续在耳，可与阳旦汤。


- (1)太阳病，发热、汗出、恶风、脉浮缓、浮弱者。
- (2)病常自汗出，或时发热汗出者。
- (3)发汗或下之，而表未解者。
- (4)太阳阳明并病，汗多，脉迟表未罢者。
- (5)病下利而脉浮弱、或自汗出者。
- (6)霍乱吐利止，而身痛不休者。














桂枝加黄芪汤

组成

桂枝3、芍药3、甘草2、生姜3、大枣12枚、黄芪2

方解

黄芪，味甘微温，《神农本草经》谓：“主痈疽久败疮，排脓止痛，大风癰疾……补虚。”从所主来看，均属肌肤间病，也可知补虚主要是补表气的不足，故若表气虚衰、邪留肌肤不去，为湿、为水、为黄汗以及上述诸病，均有用本药的机会。加于桂枝汤中，更治表气虚弱。故本方用于桂枝汤证更见表虚明显者。

腹证

冲逆、头项强急，胸前缺盆处亦有凝结者，水气从胸上聚于头项，肌肤不润而失于淖泽，甚则肌肤甲错，腠理不固。此乃阳气未盛，正气未达皮肤，升降失司，表虚下衰，属桂枝加黄芪汤证。

病理

表虚 里虚

辨证要点


桂枝汤方证更见恶风或出黄汗者，为太阳病证。


仲景书中用于治黄汗，但临床本方用于表虚的痹痛更为多见。凡不论是风湿、类风湿、强直性脊柱炎、产后风、骨质疏松等症，但必见有本方证者，方可用之。


相关条文


《金匱要略·水气病》：黄汗之病，两胫自冷；假令发热，此属历节。食已汗出，又身常暮盗汗出者，此劳气也，若汗出已，反发热者，久久其身必甲错；发热不止者，必生恶疮。若身重，汗出已辄轻者，久久必身瞤。瞤即胸中痛，又从腰以上必汗出，下无汗，腰髀弛痛，如有物在皮中状，剧者不能食，身疼重，烦躁，小便不利，此为黄汗，桂枝加黄芪汤主之。


《金匱要略·黄疸病》：诸病黄家，但利其小便，假令脉浮，当以汗解之，宜桂枝加黄芪汤主之。



























































































苓甘五味姜辛夏杏汤

组成

茯苓4、甘草、干姜、细辛各3、五味、杏仁、半夏各半升

方解

本方是由苓甘五味姜辛夏汤加杏仁而成。杏仁温化寒饮、降逆止咳，这里主要用其逐水气，故本方的适应证是苓甘五味姜辛夏汤证而有浮肿者。

病理

半虚 里寒 里虚 水实

辨证要点


苓甘五味姜辛夏汤证兼见头面、四肢浮肿者，属太阴病证。


本方应用与苓甘五味姜辛夏汤相似，而以见头面、四肢浮肿为辨证要点。

常见于急、慢性咳喘。

相关条文

《金匮要略·痰饮咳嗽病》：水去呕止，其人形肿者，加杏仁主之。其证应内麻黄，以其人遂痹，故不内之。若逆而内之者，必厥。所以然者，以其人血虚，麻黄发其阳故也。







猪苓18铢、泽泻1两6铢、白术18铢、茯苓18铢、桂枝半两

组成

本方集猪苓、茯苓、泽泻、白术诸利尿药，重在逐内饮，泽泻用昼独重，取其甘寒为方中的主药，以解其烦渴。复用桂枝不但解外，而且能降气冲，使水不上犯而下行，五味配伍，解外利水，故治脉浮有热、气冲水逆、渴而小便不利者。

方解

表虚、水实

病理

心下痞，其痞按无力而散，腹中有水气，按之痛，小便不利，微热，消渴。或渴欲饮水，水入则吐者，为五苓散证。

或下利、渴欲饮水，小便不利，或腹微满，按之濡，郁冒，颜面微肿。

又小儿疳证，颜面青白，微肿，耳轮透亮，腹满按之濡，口渴，小便不利等，亦可以五苓散治之。

腹证

太阳表虚证兼见心下停饮、小便不利而见眩晕、口渴者，本方证为外邪内饮，饮停化热，因成太阳太阴阳明合病证。


本方证在临床应用很广，不但应用急性病，而且用于慢性病，还用于急性传染病如霍乱。


辨证要点


五苓散


相关条文


- ① 太阳病，发汗后，大汗出，胃中干，烦躁不得眠，欲得饮水者，少少与饮之，令胃气和则愈。若脉浮，小便不利，微热消渴者，五苓散主之、71
- ① 发汗已，脉浮数，烦渴者，五苓散主之、72
- ① 伤寒汗出而渴者，五苓散主之；小渴者，茯苓甘草汤主之、73
- ① 中风发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，五苓散主之、名曰水逆、74
- 病在阳，应以汗解之，反以水噤之，若灌之，其热被劫不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服文蛤散；若不差者，与五苓散，文蛤散、若不差者、与五苓散、寒实结胸、无热证者、与三物小陷胸汤、（注）白散亦可服·141
- ① 大阳病、医发汗、遂发热恶寒、因复下之、心下痞、（注）表里但虚·无阳则阴独·阴阳气并竭·（经）复加烧针、因胸烦、（注）面色青黄、肤瞤者难治、今色微黄、手足温者易愈、（153）（经）心下痞、按之濡、其脉浮者、关上·大黄黄连泻心汤主之、（154）心下痞、而复恶寒、汗出者、附子泻心汤主之、（155）心下痞、与泻心汤、痞不解、其人渴而口燥者、小便不利者、五苓散主之、（注）一方云·忍之一日乃愈·（156）
- ② 太阳病，脉缓浮弱、寸关尺，其人发热、汗出、复恶寒、不呕、但心下痞者，此以医下之也；如其不下者，病人不恶寒而渴，渴者此转属阳明也。小便数者，大便必硬，不更衣十日，无所苦也。渴欲饮水，少少与之，但以法救之。渴者，宜五苓散、244
- ① 吐利头痛发热、霍乱、身疼痛、热多欲饮水者，五苓散主之；寒多不用水者，理中丸主之、386
- 《金匱-痰饮咳嗽》：假令瘦人，脐下有悸，吐涎沫而癫眩，此水也。五苓散主之。
- 《金匱-消渴小便不利淋病》：脉浮，小便不利，微热消渴者，宜利小便、发汗，五苓散主之。
- 《金匱-消渴小便不利淋病》：渴欲饮水，水入则吐者，名曰水逆，五苓散主之。


























































































































































































































































































































胡老引自《唐本伤寒论·太阳病用柴胡法第四》，强调发汗多伤津液，出现谵语，很似阳明内实热引起的谵语，这里强调不可下，是阐明无阳明里实证，故用柴胡桂枝汤和其荣卫，以通津液。柴胡桂枝汤治疗谵语，其他版本中皆无，特从唐本中引得。





























































































































































防己地黄汤

组成

防己1分、桂枝3分、防风3分、甘草2分、生地黄2斤

四味，以酒一杯，浸之一宿，绞取汁，生地黄二斤，咬咀，蒸之如斗米饭久，以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

方解

桂枝、防风、甘草辛温解表，防己苦辛平，治“寒热诸瘤”。生地黄量独重，用于养血清热止妄行独语不休。可知本方用于血虚里热重而表热轻者，即太阳阳明合病兼血虚血瘀证。

病理


里热 里虚 水实 血虚 血实


辨证要点


用小量桂枝、防风、甘草解外，重用生地黄解烦行淤以治癫痫、惊狂之疾，属太阳阳明合病证。


相关条文


《金匱要略·中风历节病》附方：防己地黄汤 治病如狂状，妄行独语不休，无寒热，其脉浮。


















































































































































































胶姜汤（失）

相关条文


《金匱要略·妇人杂病》：妇人陷经，漏下，黑不解，
胶姜汤主之。

臣亿等校诸本无胶姜汤方，想是前妊娠中胶艾汤。

藜芦甘草汤（失）

相关条文

《金匱-跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病》：病人常以手指臂肿动，此人身体瞶瞶者，藜芦甘草汤主之。




禹余粮丸（失）

相关条文


② 亡血家、不可发汗、发汗则寒栗而振、（87）汗家重发汗、必恍惚心乱、小便已阴疼、与禹余粮丸、（88）


附1 经方加减地图





承气


小承气汤（里热 里实）











柴胡汤

小柴胡汤（半热 半虚 里虚）

加芒硝

柴胡加芒硝汤

半热 半虚 里热 里实

去半夏加天花粉

柴胡去半夏加瓜蒌汤

化裁

柴胡桂枝干姜汤

阴性 半热 半虚 里寒 里虚 水虚

半热 半虚 水虚

合桂枝汤

柴胡桂枝汤

去柴胡芍药大枣加泽漆紫参白前

泽漆汤

里热 里虚 水实

表虚 半热 半虚 里虚

去甘草加龙骨牡蛎大黄桂枝茯苓铅丹

柴胡加龙骨牡蛎汤


半热 半虚 里虚 水实

大柴胡汤（半热 里实）

去黄芩大黄生姜大枣半夏加甘草

四逆散

半热 里实 血虚 气实



泻心汤

大黄黄连泻心汤（半热 里热 里实）

└─ 加附子

└─ 附子泻心汤

└─ 阴性 半热 里热

半夏泻心汤（半热 里寒 里虚）

└─ 增量甘草

└─ 甘草泻心汤

└─ 半热 里寒 里虚

└─ 增量生姜

└─ 生姜泻心汤

└─ 半热 里寒 里虚 水实

└─ 去黄芩加桂枝


└─ 黄连汤

└─ 半热 里寒 里虚


└─ 去半夏甘草大枣

└─ 干姜黄连黄芩人参汤

└─ 半热 里寒 里虚



李老讲稿关于腹诊示意图



附3 胡希恕用药心得（简明版）

A

阿胶、甘，平。补血止血，生津清热。主治衄血，下血，咳血，吐血，月经不调，崩中，胎漏。6-15克。

艾叶、苦，辛，温。温中祛寒，止血，止利。主心腹冷痛，泄泻转筋，下血，吐衄，月经不调，崩漏，带下，痢疾，疥癣。

B

巴豆、辛，温。泻寒结积聚，通官窍，逐痰，行水，杀虫。0.3-3克。主治寒实结胸，中恶，客忤卒死，心腹胀满，大便不通，气急口噤或急性胸腹胀满痛，血瘕，痰癖，泻痢。

白粉、辛，寒。内服外用杀虫。主治皮肤疮疡，虫菌感染。慎用于内服杀虫。铅粉研末干撒或调敷或熬膏贴。内服0.3-0.6克。

白蔹、苦，平。清热解毒敛疮，消痈散结止痛。多用于疮痈肿痛，瘰癧，或溃久不敛或水火烫伤。如痈疽发背初起或疮疡肿痛，以白蔹配赤小豆，共研细末，用鲜鸡蛋白调和外涂；水火烫伤，亦可用白蔹末外敷或与地榆共研末外敷。

白蜜、甘，平。黏滑滋润性，缓和滋润补中，缓急止痛，解毒药。主润燥，缓痛，通大便。可治脘腹虚痛，肺燥咳嗽，肠燥便秘，目赤，口疮，溃疡不敛，风疹瘙痒，水火烫伤，手足皲裂。

白前、甘，微温。降气化痰，宽胸理气。主治咳喘，胸满闷。

白术、苦，温。温中祛湿健胃利尿。主治里有停饮之心下痞满，眩冒，渴而小便不利，风寒湿痹，肌肤瞤动，便秘。白术偏

于治胃有停水，所以可治心下满，微痛，但白术健胃，并非遇到胃虚就可用，胃虚有停水用白术非常好，而胃非停水，白术要少用，白术性温，易刺激胃粘膜充血，所以若胃有炎性病变而且胃没有停水，用白术有害无益。此外，白术主要是利小便的，也可治小便自利，频数，尤其是老年人若膀胱失收，小便频数，可用附子配合茯苓白朮，如金匱肾气丸，真武汤。

白头翁、苦，温。清热凉血行血。主治热利腹痛，鼻衄，脓血。于热毒凝滞大肠而见下重，腹痛，便脓血时用之，亦可捣根取汁涂肿痛，秃疮。

白薇、苦，平。凉血清热。主治血虚里热，烦乱，产后虚烦血厥，汗出虚烦不得眠，惊狂。

白鱼、咸，温。利尿活血药。主去水气，消痞瘕，理血脉。治疗小便淋漓，尿血，涩痛。

百合、甘，平。润燥清虚热，微利二便。主治阳明里证的百合病。亦用于急慢性血虚内热者。近代因其具有润燥清热作用，多用于干咳，吐血，虚烦惊悸不寐。

柏子仁、甘，平。养血安神，滋养润肠。主治惊悸，失眠，遗精，盗汗，月经不调，便秘。

败酱草、苦，平。清热解毒，祛瘀排脓生肌。配伍苡仁祛湿排脓，再合附子有助排脓，祛湿作用。主治肠痈，痈脓，湿疹。

半夏、辛，平。降逆性化饮祛痰药。温中化饮，降逆止呕，并疗寒热，咽痛。凡有停饮而呕，咳，悸，头晕，腹中雷鸣者，胃气不振，胃有停饮而呕者，均加半夏。

贝母、辛，平。祛痰，利尿，清热。治肺痈，喉痹，小便不利。

鳖甲、咸，平。活血化瘀，软坚散结消癥。主治心腹癥瘕，劳疟疟母，肝脾肿大。10-30 克。

C

侧柏叶、苦，寒。凉血，清热，止血。主治吐衄，血痢，崩中，咳嗽，风湿痹，皮肤疥疮，烫伤。

柴胡、苦，平。清热疏气，推陈致新。主治半表半里的寒热结气，胸胁苦满，寒热往来。多用于凡心腹胃肠中结气或积食，或脑、心、肺、胆、肝及生殖器、血管等部因水、热、食、血之毒而发炎或凝聚等证。

陈皮、辛，温。宽中下气，除满增饮食，止咳逆。

赤石脂、温，涩。理血，固脱，止利。主治虚寒下利，便脓血而腹痛者。

赤小豆、甘，平。下水利湿药。下水消肿，利小便，排脓血。适用于体表黄肿，痈肿，脓血，痔疮下血。

川椒目、花椒的种子。苦，平。祛饮逐水，下气定喘。主治胸腹水，咳喘。

川芎、辛，温。温性强壮活血补血药。主治胸腹寒痛，寒痹筋挛，月经不调，经闭，头痛眩晕，产后腹痛，痈疽疮疡。

葱白、辛，温。温中发汗解表。主治伤寒，寒热，出汗，中风，面目肿。

D

大豆黄卷、甘，平。祛湿利关节。用于暑温，湿温，暑湿等湿温初起，湿热不化，发热汗少，胸痞等症。

大黄、苦，寒。攻下阳明里实热，破积滞，行瘀血，荡涤肠胃，推陈致新。主治阳明里实热，谵语，发狂，痢疾便秘，癥瘕积聚，时行热疫，食积痞满，痈肿疮毒，吐衄，瘀停经闭，阳黄，热淋，烫火伤。合厚朴，枳实治胸腹满，合黄连治心下痞。合甘遂，阿胶治水与血，合水蛭，虻虫，桃仁治瘀血。

大戟、苦，寒。强有力利水清热。 0.5-6 克。主治里实热的胸腹水，腹满急痛，癥瘕，积聚，皮肤疼痛。

大麦、咸，微寒。和胃宽肠，益气生津，止渴，利水。主治腹胀，食滞泄泻，消渴，水胀。

大枣、甘，平。安中健胃，生津血，益气，缓急迫。主治在太阴，而扶正驱邪，应用于各经证，且配伍泻下药能保护胃气。常用于治疗发热，心动悸，脏躁，水肿，呕逆，奔豚。

代赭石、苦，寒。降逆和胃收摄药。主治胃气上逆，下利，白带。9-30 克。

丹皮、辛，寒。凉血，活血，清热。主治阳明里热，半表半里热之瘀血证，中风，癰瘕，癥坚，经闭，肿痛，跌打损伤。

淡豆豉、苦，寒。解热，去烦满，护胃和中。主食毒郁结，烦满，懊恼。

当归、甘，温。温性补血、活血、润燥滑肠药。主治虚寒胃腹疼痛，痛经，月经不调，崩漏，癥瘕，积聚，痿痹，痈疽疮疡，跌扑损伤，虚寒性便秘。

冬瓜子、甘，平。健中益气，祛湿排脓。主治肠痈，肺痈，咳喘吐浊痰，皮肤暗斑。

冬葵、甘，寒。强壮利尿通淋。主治淋证或有虚热者。

独活、苦，平。解表祛风湿。主治风湿痹痛。

F

矾石、酸，寒。收涩燥湿，止泻，止血，解毒，杀虫。主治癫痫，黄疸，肝病，白带，阴蚀恶疮，疥癣，虫伤。入丸散 1-3 克。白带，阴蚀恶疮，疥癣，虫伤。入丸散 1-3 克。

防风、甘，温。发表，祛风，胜湿，止痛，止痒。主治风湿痹痛，头痛，痒疹

防己、辛，平。利水逐饮清热。主治膈间支饮，肠间水气，喘满，癫痫。胡希恕：防己、川椒目有利肠间水气作用。

蜂房、苦，平。解毒散结，清热。主治惊痫，癥瘕，风痹，瘙痒，乳痈，疗毒。

茯苓、甘，平。利饮祛湿，祛胃内停水，安神。主治心下悸动或结痛，小便不利，湿痹疼痛。茯苓与白术都是利饮祛湿药，但白术以治头晕眩及肌肤湿痹或肌肤 动为特长；而茯苓以治心下悸动及安神定志为特长。

附子、乌头旁生的块根（子根）。辛，温。祛阴寒，起沉衰，亢奋代谢功能。据六经配伍适证用药，而治心脏衰弱，瘀血厥冷，下利体痛，倦怠脱力，寒湿痹痛，历节痛，可用于一切阴证而腹壁软弱无力，无热恶寒，手足厥冷，大便滑或溏，口中和，脉微弱者。

G

甘草、甘，平。益气安中，缓急滋润，清热解毒。主治五脏六腑寒热邪气，腹痛或筋肉急剧紧缩性疼痛及其他诸般急迫。本药亦可减缓或防止毒药吸收，故与毒药调剂时常配用甘草。胡希恕：甘草，是甘味的一种粘滑药，有护胃的作用，尚有补益作用，主中气虚，可缓和证与药的急迫，如调胃承气汤加甘草攻中有补；苓桂枣甘汤中针对脐下悸，欲作奔豚或有小腹挛疼等急迫证，故用甘草。甘草缓急止痛，凡痛而急迫者，均可用。故可用治少阴传少阳病之咽痛轻证，如甘草汤。甘草安中养液，缓急迫，有碍利小便，小便数用甘草是对的，若有浮肿则不宜用，小便少亦不用，多用则水肿。芍药，甘草，大枣均有缓和作用，治挛芍药优于大枣，止痛大枣优于芍药，缓急迫，二者皆不如甘草。

甘李根白皮、苦，寒。清半表半里之热。善治奔豚气上冲。

甘遂、苦，寒。峻通利二便，利水清热。0.5-6 克。主治阳明里实，见胸腹胀满，水结或水与血互结者。无论煎服或散服，皆要配伍大枣，甘草，蜂蜜，缓其急，解其毒。

干姜、辛，温。温中，温下祛寒，回阳救逆，和胃降逆止呕。主治胸满，咳喘不得卧，干呕，吐涎沫而不渴，风寒湿痹，四肢厥冷，肠澼下利。主在太阴，常与附子同用，治疗脉微欲绝的心衰，垂危证。又常与黄芩，黄连，柏叶等合治上热下寒的阳明太阴合病，厥阴病。

干漆、辛，温。活血祛瘀，通脉杀虫。主治瘀血癥瘕，虫积腹痛，妇女经闭，色素沉着。入丸散内服。

葛根、甘，平。解肌清热药。主治太阳表热，有治项背强几几，解痉的作用。

瓜蒂、苦，寒。利湿清热，催吐。2-10 克。主治身重浮肿，黄疸，胸满温温欲吐者。

瓜蒌、苦，寒。除痰清热，理气宽胸。主治胸痹，心痛，短气，痰饮咳喘。

桂枝、辛，温。温中健胃，调和营卫，解外，解热，降冲，治痹药。主治表证寒热，上气咳逆，痹痛，眩晕，胸满，气上撞心，奔豚。

H

海藻、苦，寒。散结化痰，解凝性利尿药。治水毒凝结，颈下硬核痛，痈肿，癥瘕积聚，瘰疬，疝气下坠，脚气，浮肿。

寒水石、辛，寒。主清热泻火。其作用与石膏相近，，内服多与石膏相配，治热在气分壮热烦渴。外用消肿止痛，治丹毒，烫伤。

诃子、又名诃黎勒。苦，酸，涩，温。涩肠止泻，敛肺利咽。常用于久泻，喘咳痰嗽，久咳失音者。利咽宜生用，涩肠止泻宜煨用。

红花、辛，温。活血祛瘀通经。主治瘀血作痛，经闭，癥瘕，产后恶露不行，痈肿，跌扑损伤。

厚朴、苦，温。温中化饮，理气消胀止咳。主一切寒湿或热结腹痛胀满（湿毒水毒而致之胸腹满），痰结气壅之咳喘。

滑石、甘，寒。缓和性清热利尿。通六腑九窍津液，利涩结，下垢腻，逐实热。主治小便黄赤，膀胱、尿道炎，暑热，烦渴。

黄柏、苦，寒。清热除烦，止利，祛黄药。主治清里热，清上热。配伍黄连，黄芩，大黄，用于阳明里热证，显示其清热除烦，止利，祛黄作用。配伍干姜，附子用于厥阴证，显示其清上热，止利作用。

黄连、苦，寒。以清热除烦，止利，治吐衄，皮肤肿疡为特能。

黄芪、甘，微温。益卫，固表，解表，生肌，利湿。主治汗出恶风明显，久病表不解，及在表的水肿，关节疼痛，皮肤黄染，黄肿，痈疽，疮口不收。用于表虚，勿用于表实。

黄芩、苦，平。清热除烦。主治烦躁，出血，痞满，下利，呕逆。

J

鸡屎白、微寒。清热利水生津。主治消渴，伤寒，寒热，转筋，腹水。

鸡子黄、甘，平。养血，清热，除烦，安神。主治心烦不得眠，热病痉厥，虚劳吐血，呕逆，下利，胎漏下血，烫伤，热疮，湿疹，小儿消化不良。

胶饴、软者称胶饴，硬者称饴糖。甘，温。滋养强壮药。缓急迫，温中健胃，益气力，补虚冷，止腹鸣。适用于中虚有寒之腹中急痛，里急，肠鸣。胶饴与甘草性味相仿，甘草宜于阴阳表里虚实，胶饴专于里虚寒。

粳米、甘，平。安中补胃，益气生津，甘温除热强壮药。主治热病口干咽燥，泻痢，呕吐，诸虚百损，施用大凉药时合用之防泻剂。

酒、苦，甘，辛，大热，有毒。温通行药。主宣达药力，佐制药性，温通血脉。

桔梗、苦，辛，微温。排脓，利咽，宽胸。治胸痛如刺，浊唾，脓血痰，或咽中肿痛。

菊花、苦，平。清上热。主治口干，目赤肿痛，眩晕上热。

K

苦参、苦，寒。清热，燥湿，解毒。主治痈肿，黄疸，狐惑，阴蚀，皮肤疮疡。

苦酒、酸。酸敛清热。主治咽痛，黄汗，皮肤痈肿。

款冬花、辛，温。润肺消痰，止咳定喘。主治里饮及外邪里饮咳喘。紫苑和款冬花都是温性止咳化痰药，一般共同使用，但也略有不同，凡吐脓血，失音者，及风寒水气盛者，多不用款冬花，但用紫苑，款冬花则每同湿剂补剂用者为多。汤本求真谓两药为温性之镇咳祛痰药，紫苑尚有和血作用。

L

连翘、苦，平。清热，祛湿，退黄。主治寒热，消疮痈肿毒，除烦躁，祛湿，黄疸。

龙骨、甘，平。强壮性收敛药。镇惊安神，收敛固脱（敛汗固精，止血涩肠）。治疗烦惊，不眠，多梦等心神症，尤有治胸腹动悸的特能，另有生肌敛疮，收敛浮越之气的作用。广泛用于治疗惊痫癫狂，怔忡健忘，自汗，盗汗，遗精崩漏，吐血便血，泻利脱肛，疮溃不敛。

乱发、苦，温。养血润燥，通利二便，通淋，消瘀，祛黄，止血。主治淋证，吐衄，崩漏。6-10 克。

M

麻黄、苦，温。发汗解表，祛湿化饮。主治伤寒。发汗，解表，祛湿，祛黄。

麻子仁、甘，平。润燥缓下。主治里津血虚的大便不通，皮肤疮痍。

麦门冬、甘，平。清凉性滋润药。养胃生津，润肺止咳，清心除烦。主烦渴，口干燥渴，虚劳热咳。本药黏滑，泄而不收，寒多者禁服。

芒硝、苦，寒。清热软坚散结。2-15 克。主治胸腹痞硬满，阳明里实热结，癥瘕积聚，疮疡。

虻虫、苦，微寒。逐瘀，破积，通经。主治癥瘕积聚，少腹硬满蓄血，血滞经闭，扑损瘀血。1-3 克入煎剂。0.3-0.6 研末。

牡蛎、咸，平。收敛强壮药。善软坚化痰散结，兼有收涩镇静作用。安神补虚，敛汗固脱，涩肠止泻，清热镇气，止嗽涩精。可治伤寒寒热，温疟，惊悸怒气，惊狂，烦躁，失眠，鼠痿，带下，盗汗，咳嗽，遗精，口渴，胸腹动者。

P

蒲黄、甘，平。活血祛瘀，止血，通淋。主治小便不利，淋漓，吐衄，崩漏，外伤出血，经闭，痛经，腕腹刺痛，跌扑肿痛。6-10 克。

Q

蛭蟪、咸，微温。祛瘀，散结，消癥。主治折损瘀痛，痛风，破伤风，喉痹，目翳，丹毒，痈疽，痔漏。3-6 克。

铅丹、辛，微寒。镇静安神，解热。主治热性惊痫，癫狂，外治金疮，疗毒。本药有毒，内服者少，0.3-0.6 克。

蛻螂、咸，寒。祛瘀破积聚，清里热，攻毒。主治惊痫，癫狂，疟疾，癥瘕，噎膈，反胃，腹胀便结，淋病，疝积，血痢，痔漏，疗肿，恶疮。1-3 克入煎剂。

秦皮、苦，微寒。清热消炎，收敛止利。收敛津液，止下利崩带，治目疾。适用于肠炎下利或目赤肿痛炎症。本药收涩力强，消炎力弱，常与白头翁相辅，治津损之热利。

瞿麦、苦，寒。利尿通淋，破血通经。主治小便淋漓不通，瘀血水结。

R

人参、野生者名山参，晒干称生晒山参，栽培者称园参，晒干或烘干称生晒参，园参经蒸制后的干燥品称红参。甘，微寒。补中益气，健胃生津血止渴，强壮机能。主治在太阴而见心下痞满，兼呕吐不食，心痛腹胀，烦悸诸血，下利及因胃虚弱而致的一切虚证。亦主治少阳病，如小柴胡汤证。适证配伍兼治合并证，如太阳太阴合病的桂枝人参汤证，太阳少阳合病的柴胡桂枝汤证，厥阴病的半夏泻心汤证，乌梅丸证。

人尿、童便。咸，凉。清热活血，止血，强心。主治劳伤咳嗽，吐血，衄血，产后血瘀，晕厥，跌打损伤，血瘀作痛。50-100ml。

戎盐、咸，寒。利小便，解热，壮筋骨。内服利尿清热，外用明目，坚筋骨，除心腹痛。

S

桑白皮、甘，寒。清热化痰利水。主治咳喘浮肿。烧灰止血，可治崩中脉绝。

山药、甘，温。为补中益胃之常品。补虚羸，除寒热邪气，补中益气，又能固精止带。对于虚羸少气，泄泻，咳嗽，遗精，带下，消渴均可配伍使用。可以山药代粳米用于白虎汤。

山萸肉、酸，平。收敛固脱强壮药。补敛并俱，适用于腰膝酸软，头晕目眩，耳鸣耳聋，阳痿，遗精，滑精，遗尿尿频，月经过多，虚汗不止，崩漏等虚劳之证。

商陆、辛，平。利水消坚通塞。5-10 克。主治疝瘕，痹，熨除痈肿。

芍药、苦，平。养血，活血，清热凉血，缓挛急。主治腹满痛，癥瘕积聚，筋肌拘挛。

蛇床子、苦，平。燥湿杀虫，温子脏，逐寒湿，疗阴中肿痛。主治阳虚阳痿，皮肤或阴中湿痒。

射干、苦，平。泻热清咽化痰。善利咽解毒，散结消痰，降火止痛，为疗咽痛之要药，散结气之良品。主治太阳阳明合病的咳逆上气，咽痛喉痹，亦辅助治疗癥瘕疟母。

神曲、甘，温。消导，健胃，祛湿。主治霍乱，胀满，呕吐，泻痢，伤食积滞。消食和胃炒用，入丸剂生用。

升麻、甘，辛。解毒解热。主解百毒，辟瘟疫，瘴邪，风肿诸毒，头痛寒热，治咽喉要药。

生地、甘，寒。养血、活血、清热止血。主治阳明里热，或半表半里热，消渴，吐衄，下血，血崩，月经不调，胎动不安，癫狂，血痹，虚劳。胡希恕先生由经方方证认识本药，认为生地为凉性养血活血药，故认为生地有清阳明里热作用，更据防己地黄汤治“病如狂状，妄行独语不休”，重用生地解烦行瘀，以治癫狂等疾，说明生地治癫狂不惟养血活血，更重要在清阳明里热，试看神昏，谵语，癫狂多为阳明实热，可知，是经方治精神证着眼点。当归、芍药、川芎、生地四者皆养血活血，当归、川芎性温，而主治在太阴；芍药、生地性凉而治在阳明，是经方用药的主要区别点。各药又有其特点：当归补血温经力显，川芎活血力宏，生地养血活血清热突出，芍药养血清热养肌筋而有缓挛急作用。

生姜、辛，温。温中化饮，健胃解表，降逆止呕。主治呕吐，逐风湿痹，胃腹满痛，胸满寒热，咳逆上气，肠澼下利。

生梓白皮、苦，寒。善清热除湿，解毒止痒。主驱虫，解毒，目疾，吐逆，一切疮疥，皮肤瘙痒；若见时病发热，湿热黄疸亦可应用。

石膏、辛，微寒。寒性解热，解凝。善清里热，镇潜上逆。主除热烦躁，谵妄，牙痛，咽痛，里热呕逆，胃实腹坚之疼痛及口舌干燥。

石韦、苦，平。利水清热。长于利水通淋常用于淋痛，尿血，尿路结石，肺热咳嗽。

蜀椒、辛，温。温中祛寒，发汗解表。花椒的果皮。主治虚寒腹痛。

蜀漆、辛，平。祛饮逐痰，安神，截疟。6-10 克。主治寒热疟，咳喘，惊狂，胸腹及脐下悸动。

鼠妇、酸，温。祛瘀利水，软坚消癥主治经闭，癥瘕，小便不利，口齿疼痛，鹅口诸疮，久疟疟母。3-6 克。

水蛭、咸，平。祛瘀活血通经。主治蓄血，癥瘕积聚，经闭，心脑血管病，干血成癆，跌扑损伤，目赤痛，云翳。6-10 克入煎剂。1-3 克入丸散。

蒺藜细叶、苦，寒。活血祛瘀，行气，清上热。主治风湿疼痛，跌打损伤，骨折，水肿，风疹瘙痒，丹毒，疮肿。

苏叶、辛，微温。解表，降气化痰。主治表证寒热，咳逆，胸胁胀满。苏梗、苏子皆辛温，苏叶长于解表，苏梗善理气安胎，苏子主以温中降气化痰。

酸枣仁、酸，平。养血安神敛汗。主治血虚不眠，自汗，盗汗，惊悸不安。胡希恕：酸枣仁适用于血虚不眠者，湿热寒饮者用之效不佳。

T

桃仁、苦，平。活血化瘀，润燥滑肠。主治热病蓄血，经闭，腹痛，癥瘕，瘀血肿痛，跌打损伤，血燥便秘。6-15 克。

天花粉、苦，寒。滋润强壮药。生津止渴，缓强直痉挛，润燥下火，镇咳。适用于组织枯燥，身体强直性痉挛，口燥渴（虚热）。本药热者可清，邪热盛而津伤者最宜。胡希恕：天花粉，有滋阴补虚，解热润燥，解渴缓下的作用，常用治消渴，久病虚衰无力，但量少则力薄，至少用三四两。天花粉合牡蛎解渴力量较强，同时散微结，天花粉有润下作用，再加上咸寒的牡蛎，

尚有通大便的作用。天花粉祛痰作用不如栝蒌实，所以祛痰宽胸用栝蒌实，去热解渴用天花粉。天花粉补虚安中，滋枯润燥，虽似麦冬，但麦冬以治咳为主，止渴为客；而天花粉以治渴为主，镇咳为客。天花粉治渴清热虽似石膏，但石膏治实热，天花粉治虚热。天花粉治虚热虽似生地，但生地以治血证为主，而天花粉不能治血证。

天门冬、苦，平。清凉性滋养药。清虚热，润燥痰，生津止渴，滑肠。主暴风湿痹，虚热，口干舌燥，咯痰难出，大便难。适用于咳逆，消渴，咳血。

天雄、种附子生出或变出，其形长而不生子，故曰天雄。辛，温。3-6 克。功用大略同附子，逐风寒湿，温经通络。主治风寒湿痹，寒凝气滞。

葶苈子、辛，寒。逐痰利饮，清热消积。主治壅塞上气，水饮咳喘，身体面目肿胀。

通草、辛，平。利湿通络。主通利血脉，利关节，并治痈疽，恶疮。

土瓜根、苦，寒。祛瘀清热，散结消痈。主治消渴，内痹，瘀血，妇人带下，月闭，男性阴囊肿大。

W

王不留行、苦，平。活血止血，通经消肿。主治血瘀经闭，难产，产后乳汁不下，血淋，痈肿，金疮出血。

苇茎、甘，寒。清热排脓，养胃生津除烦。常与苡仁，桃仁，冬瓜仁，桔梗配伍治疗各种化脓，炎症。

文蛤、苦，平。清热，化痰，收敛。主用于阳明里热咳逆，烦满胸痹，亦适用于恶疮，五痔，女子崩漏。外用敛疮：煅。

乌梅、酸，平。敛津止渴固脱。主治久咳，泻痢，消渴。外用杀虫，腐赘肉，死肌。

乌头、野生为草乌，栽培品为川乌。3-9 克。辛，温。祛风除湿，散寒止痛，通行经络之力甚捷。用于阴寒证之痹痛，积聚，

主治寒疝腹中痛，关节痛，心背剧痛，手足厥冷，自汗出，脉沉弦。

吴茱萸、辛，温。温中祛寒，下气止痛，除湿血痹，杀虫，通关节。主治心腹诸冷绞痛，亦适用于太阳太阴合病及厥阴病。

五味子、酸，温。滋补收敛祛痰药。酸敛降逆，固精止汗。适用于寒饮咳嗽，咳逆而冒者。五味子与泽泻主治证均有“冒”，但两者适应证不同。泽泻治浮肿而冒且眩，伴有小便不利；五味子治气逆头昏而冒，伴有汗出心慌失眠。

X

细辛、辛，温。温中化饮，祛湿通络。主治里虚寒饮，常用于太阴证，适证配伍亦可用于六经各证。咳逆上气，头痛，胁痛，风湿痹痛，逆满。

仙鹤草、苦，寒。收敛消炎。善治疮疡及杀虫，适用于外阴，阴道溃烂者。

小麦、甘，凉。益胃养正，养血安神，除热止血。主治脏躁，咳喘，自汗，失眠。胡希恕：小麦在厚朴麻黄汤中起营养作用，养正补虚，以治咳喘；在甘麦大枣汤中补心血，补心气，以治脏躁。

薤白、辛，温。散结化痰止痛，行气导滞。

新绛、茜草。苦，寒。活血祛瘀，通经止血。主治吐衄下血，血崩，经闭，风湿痹痛，跌打损伤，瘀滞肿痛，黄疸，咳喘。

杏仁、甘，温。发表利水润下。主治咳逆上气，结胸，形体浮肿，润肠通便。

雄黄、生用切忌火煅。苦，平，寒。燥湿解毒。主治恶疮肿毒，白血病；外用可杀虫利湿，止痛，治皮肤肿疡，痔瘻。内服入丸散 0.3-1 克。

旋覆花、咸，温。温中化饮，降逆散结，健胃消胀满。主噫气呕吐，胃脘痞塞，咳逆。

Y

羊肉、甘，温。温中暖下，养血止痛，益气补虚。主治虚劳羸瘦，腰膝酸软，产后虚冷，腹痛寒疝，反胃。

薏苡仁、甘，微寒。清热利湿，排脓，解凝，利小便。主治疮疡痈肿，利淋，风湿痹痛。

茵陈、苦，平。利湿清热祛黄。主治里实热黄疸，外邪里饮黄疸。

禹余粮、甘，平。固涩止利。主治下利赤白，漏下，血痹。

玉竹、甘，平。清凉性滋养药。生津润燥，滋阴养血，补不足，润颜。主中风暴热，诸不足，肌肉萎缩，可治邪热头痛，腰痛，身痛，干咳，痰稠，津伤烦渴。适用于风热，风湿入肌作痛，心腹气结，虚热湿毒，，近人认为其有强心作用。

芫花、辛，温。温性攻痰利水。0.5-3 克。主治胸腹寒饮，及痰饮引起的咳喘，短气，蛊毒。

云母、甘，平。利气，消积，除痰，补虚益精，助孕。主治五劳七伤，虚损少气，眩晕，癫痫，寒疟，止白带，下利，疮毒。

Z

皂荚、辛，咸，温。温化寒饮，通窍，除湿杀虫，消肿止痒。主治顽痰壅盛，喘急胀满，中风口噤，癫痫痰盛，关窍阻闭。入煎剂 2-6 克，焙焦研末服 1-1.5 克。

灶心土、辛，微温。温中燥湿，止呕，止血。主治吐衄，便血，尿血，呕吐反胃，腹痛，泄泻，妊娠，恶阻，崩漏，带下痈肿，溃疡。15-50 克。

泽漆、苦，微寒。利水消肿较大戟温和之药。常用于腹水，咳喘，见四肢面目浮肿者。

泽泻、甘，寒。寒性利尿药。祛湿邪而生新水，祛湿热消渴。主治头眩，耳虚鸣，泻利。适用于眩冒而渴，小便频数或不利者。泽泻、白术、茯苓利尿方面之比较：泽泻性寒能祛湿热及止渴，即有祛湿邪而生新水之作用，虽与茯苓同为利尿药，但适于热证，而白术适于寒证，茯苓则适于寒热虚实各证。胡希恕：泽泻有通大便作用，故大便干时用量大，大便溏时用量少或不用。

廔虫、土鳖虫，土元。咸，寒。主治癥瘕积聚，血痹虚劳，血滞经闭，产后瘀血腹痛，跌打损伤，皮肤黯黑，瘀斑。3-6 克。

知母、辛，苦，寒。清热解烦，消肢体肿胀。主治烦热消渴，骨蒸癆热，肢体肿胀痹痛，大便秘结。

梔子、苦，寒。善清三焦之火，尤善清心，为治热病烦闷之要药。其性清利导湿热之邪从小便而出，又为湿热黄疸所常用。既入气分而泻火解毒，又入血分能凉血止血，以治热毒疮疡，血热出血。外用消肿止痛，可治跌打损伤之肿痛。

蜘蛛、苦，微寒。破结通利，祛瘀消肿。主治小儿疝气，中风，口渴，蜂、蜈蚣、蝎蜇伤。散剂服用，1 枚（1-3 克），入丸散。

枳实、苦，寒。理气散结药。祛逐结实之毒（食、水毒），治胸腹满而痹痛，腹筋拘急。枳实治心下痞满，类似柴胡证之胸胁苦满，但较之为强。枳实治腹直肌拘挛类似芍药，但结实之度，甚于芍药，而拘挛之度为轻。枳实治胸胁满又似厚朴，但枳实以结实为主，胀满为客，厚朴以胀满为主，结实为客。

朱砂、甘，微寒。安神，定惊，明目，解毒。主治癫狂，惊悸，心烦，失眠，眩晕，目昏。外用治肿毒，疮疡，疥癣。内服入丸散 0.1-0.5 克。

猪胆汁、苦，寒。清热解毒，强心，明目。主治咽喉肿痛，疮痈肿痛，目赤目翳，小儿五疳。临证用其急救强心，必加于有大剂附子如通脉四逆汤中方起救逆回阳作用。敷恶疮，入汤沐发，去腻光辉。

猪肤、甘，寒。滋润解热药。适用于少阳阳明合病的下利，咽痛。

猪膏、甘，凉。润燥解热，通利二便，利血脉行瘀。

猪苓、甘，平。解热祛湿，去肿胀，消炎止渴，缓和凉性利尿药。可治热性淋证，小便不利，疟疾及结核性水气病，并用于腹满急痛，肿胀，淋浊。猪苓、泽泻、茯苓、白术都是利尿药，但同中有异：前三味分别为甘平，甘寒，甘平，而白术为甘温。且猪苓解热止渴作用尤强；泽泻则主头晕冒；茯苓治心悸及筋肉痉挛，以水毒为患的诸神经症状；白术主利水湿，而生津液，能通二便，更主肌肉风湿，头晕眩。

竹茹、甘，平。清热化痰，除烦止呕，下气止呃。生用清化痰热，姜汁炙用止呕。

竹叶、苦，平。清凉性解热药主治阳明里热，善疗胸中痰热，咳逆上气；清内热，去烦渴，利水。主身热口渴，五心烦热，小便不利。主治里虚寒饮，对寒邪痰浊停留胸中，阳气不得通畅的胸痹疼痛，痰饮胁痛等证有良效。亦兼治痢疾里急后重。

紫参、草河车，重楼。苦，辛，寒。清热化饮排脓。主治里热，咳喘，吐痰，脓血。

紫石英、甘，温。温中降逆，镇心安神，暖宫助孕。

紫葳、凌霄花。酸，微寒。凉血祛瘀，消癥瘕。主治血滞经闭，癥瘕，血热风痒，酒渣鼻。5-10 克。

紫苑、苦，温。温化寒饮。主治咳逆上气。

附4 胡希恕脉诊

1. 浮脉：主表；主虚；主热；人的抗病机能要把胃中不消化的食物涌吐出来的脉应；里实而脉浮者病有上越之机
2. 沉脉：主里；主虚；主寒；主水饮
3. 数脉：主热；主虚
4. 迟脉：主寒；主虚；主实
5. 实脉、虚脉：实脉主实；虚脉主虚
6. 动脉：主痛；主惊
7. 促脉：主表；主结胸
8. 结脉、代脉：主虚；主瘀血
9. 长脉、短脉：长脉主实；短脉主虚
10. 大脉：主实热；主虚
11. 细脉：主气虚、血不足
12. 紧脉：主寒、饮、邪盛；主病势紧张（若痛、若宿食等邪实冲逆）
13. 缓脉：主津血虚
14. 弦脉：主半表半里证；主筋脉拘急；主寒、主水
15. 弱脉：主虚
16. 滑脉：主实、主热盛
17. 涩脉：津虚血少；主湿；主亡血
18. 疾脉：主邪热盛；主虚
19. 伏脉：主里；主虚；主水
20. 洪脉：主大热、邪实
21. 微脉：主正衰、气血俱虚
22. 芤脉：主虚劳、血不足
23. 革脉：主亡血、妇人漏下、男子失精

附5 汉今计量换算

一斤=250 克
一两=15.625 克
一分=3.9 克
一铢=0.65 克
一斗=2000 毫升
一升=200 毫升
一合=20 毫升
一尺=23.1 厘米
一寸=2.31 厘米
一分=0.231 厘米
一方寸匕=1.5 克（半夏泻心汤粉剂）
一钱匕=?
梧桐子大=黄豆大
蜀椒一升=50 克（?）
葶苈子一升=145 克
吴茱萸一升=90 克
五味子一升=100 克
半夏一升=130 克
附子一枚大者一枚=20-30 克（?）
附子一枚=15 克（?）
乌头一枚大者=5-6 克（?）
乌头一枚=3 克（?）
杏仁一升=125 克
杏仁 70 个=19-26 克
桃仁一升=125 克
桃仁二十个约 18 克
麦门冬一升=125 克
粳米一升=180 克

豆豉一升=140 克
大枣十二枚=50 克
竹叶一握=12 克
火麻仁一升=125 克
瓜蒌一枚=46 克?（自测应为 130 克）
梔子十枚=15 克（自测 13 克）
枳实一枚=14.4 克（?）
石膏鸡子大=125 克
水蛭百枚 =160 克
水蛭大者 10 个 30 克
蟪虫一升 =53 克；二十枚=15 克
虻虫一升 =30 克
虻虫大者 10 个 1 克
蛭螬一升 =92 克
赤小豆一升=180 克（发芽后干品 100 克，近六两）
厚朴一尺=45 克（参照胡希恕注解麻子仁丸方与小承气汤方折算似 125 克?）
梓白皮一升 =60 克（自测）
薏苡仁一升 =160 克（自测）
芒硝一升=166 克（自测）
小麦一升=150 克（自测）
苇茎一升=30 克左右（自测）
甘李根白皮一升=?
橘皮一升=50 克
竹茹一升=15 克
瓜子一升=70 克
竹叶一把=12 克

薤白一升=120 克
皂荚一枚 30 克（左右）
苦参一升 80 克
酸枣仁一升=120 克
乌梅百枚=300 克

注：凡加（?）者即为未经准确复核。

500 克蜂蜜 314 毫升
通常浓度的饴糖，密度是 1.42g/ml
200ml 饴糖是 284 克。

