

Übung 4 Lösungen

Victor Minig

January 28, 2025

1

Gegeben:

Die Dichte einer hypergeometrischen Verteilung:

$$f(x; M, K, n) = \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} I_{\{0,1,\dots,n\}}(x)$$

Mit $M \in \mathbb{N}$, $K = 0, 1, \dots, M$ und $n = 1, 2, \dots, M$

Gesucht:

Erwartungswert $E(X)$ und Varianz $Var(X)$

Lösung:

Da X diskret ist:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in R(X)} x f(x) \\ &= \sum_{x=0}^n x \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var(X) &= \left(\sum_{x \in R(X)} x^2 f(x) \right) - E(X)^2 \\ &= \left(\sum_{x=0}^n x^2 \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} \right) - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\ &= \left(\sum_{x=1}^n x^2 \frac{\binom{K}{x} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} \right) - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\ &= \left(\sum_{x=1}^n x^2 \frac{\frac{K}{x} \binom{K-1}{x-1} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} \right) - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\ &= \left(K \sum_{x=1}^n x \frac{\binom{K-1}{x-1} \binom{M-K}{n-x}}{\binom{M}{n}} \right) - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Setze } y = x - 1 \quad &= \left(K \sum_{y=0}^{n-1} (y+1) \frac{\binom{K-1}{y} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} \right) - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left[K \left(\sum_{y=0}^{n-1} y \frac{\binom{K-1}{y} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} + \frac{\binom{K-1}{y} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} \right) \right] - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
&= \left[K \left(\sum_{y=1}^{n-1} y \frac{\frac{K-1}{y} \binom{K-2}{y-1} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} + \sum_{y=0}^{n-1} \frac{\binom{K-1}{y} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} \right) \right] - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
&= \left[K \left((K-1) \sum_{y=1}^{n-1} \frac{\binom{K-2}{y-1} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} + \sum_{y=0}^{n-1} \frac{\binom{K-1}{y} \binom{M-K}{n-(y+1)}}{\binom{M}{n}} \right) \right] - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
\text{Setze } z = y - 1 &= \left[K \left((K-1) \sum_{z=0}^{n-2} \frac{\binom{K-2}{z} \binom{M-2-K+2}{n-2-(z+2)+2}}{\frac{M}{n} \frac{M-1}{n-1} \binom{M-2}{n-2}} + \sum_{y=0}^{n-1} \frac{\binom{K-1}{y} \binom{M-1-K+1}{n-1-(y+1)+1}}{\frac{M}{n} \binom{M-1}{n-1}} \right) \right] - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
&= \left[K \left((K-1) \frac{n}{M} \frac{n-1}{M-1} \underbrace{\sum_{z=0}^{n-2} \frac{\binom{K-2}{z} \binom{(M-2)-(K-2)}{(n-2)-z}}{\binom{M-2}{n-2}}}_{=1, \text{ da } Z \sim \text{Hypergeom}(M-2, K-2, n-2)} + \frac{n}{M} \underbrace{\sum_{y=0}^{n-1} \frac{\binom{K-1}{y} \binom{(M-1)-(K-1)}{(n-1)-y+1}}{\binom{M-1}{n-1}}}_{=1, \text{ da } Y \sim \text{Hypergeom}(M-1, K-1, n-1)} \right) \right] \\
&\quad - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
&= K \left((K-1) \frac{n}{M} \frac{n-1}{M-1} + \frac{n}{M} \right) - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
&= (K-1) \frac{nK}{M} \frac{n-1}{M-1} + \frac{nK}{M} - \left(\frac{nK}{M} \right)^2 \\
&= \frac{nK}{M} \left((K-1) \frac{n-1}{M-1} + 1 - \frac{nK}{M} \right) \\
&= \frac{nK}{M} \left(\frac{(K-1)(n-1)M}{M(M-1)} + \frac{M(M-1)}{M(M-1)} - \frac{nK(M-1)}{M(M-1)} \right) \\
&= \frac{nK}{M} \left(\frac{KnM - nM - KM + M + M^2 - M - nKM + nK}{M(M-1)} \right) \\
&= \frac{nK}{M} \left(\frac{M^2 - nM - KM + nK}{M(M-1)} \right) \\
&= \frac{nK}{M} \left(\frac{(M-n)(M-k)}{M(M-1)} \right)
\end{aligned}$$

2

Gegeben:

Dichte einer Betaverteilung:

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} I_{(0,1)}(x), \quad \alpha, \beta > 0$$

Wobei B die Betafunktion ist:

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}, \quad \Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (\text{Gammafunktion})$$

Gesucht:

Erwartungswert $E(X)$ und Varianz $Var(X)$

Lösung:

$$\begin{aligned}
E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; \alpha, \beta) dx \\
&= \int_0^1 x \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx \\
&= \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \int_0^1 x^{\alpha} (1-x)^{\beta-1} dx \\
&= \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \int_0^1 \frac{B(\alpha+1, \beta)}{B(\alpha+1, \beta)} x^{(\alpha+1)-1} (1-x)^{\beta-1} dx \\
&= \frac{1}{B(\alpha, \beta)} B(\alpha+1, \beta) \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{B(\alpha+1, \beta)} x^{(\alpha+1)-1} (1-x)^{\beta-1} dx}_{=1 \text{ für } X \sim \text{Beta}(\alpha+1, \beta)} \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+1)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+1+\beta)} \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)\alpha\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)} \\
&= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \\
\text{Var}(X) &= \left(\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x; \alpha, \beta) dx \right) - E(X)^2 \\
&= \left(\int_0^1 x^2 \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx \right) - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right)^2 \\
&= \left(\frac{1}{B(\alpha, \beta)} \int_0^1 x^{\alpha+1} (1-x)^{\beta-1} dx \right) - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right)^2 \\
&= \left(\frac{1}{B(\alpha, \beta)} B(\alpha+2, \beta) \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{B(\alpha+2, \beta)} x^{(\alpha+2)-1} (1-x)^{\beta-1} dx}_{=1 \text{ für } X \sim \text{Beta}(\alpha+2, \beta)} \right) - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right)^2 \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \frac{\Gamma(\alpha+2)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+2+\beta)} - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right)^2 \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)(\alpha+1)\alpha\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)\Gamma(\alpha+\beta)} - \left(\frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right)^2 \\
&= \frac{\alpha^2 + \alpha}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)} \\
&= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \left(\frac{\alpha+1}{\alpha+\beta+1} - \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \right) \\
&= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \left(\frac{(\alpha+1)(\alpha+\beta) - \alpha(\alpha+\beta+1)}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} \right) \\
&= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \left(\frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \alpha + \beta - \alpha^2 - \alpha\beta - \alpha}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} \right) \\
&= \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \frac{\beta}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)} \\
&= \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta+1)(\alpha+\beta)^2}
\end{aligned}$$

3

Gegeben:

Die Dichte einer Poissonverteilung:

$$f(x; \Theta) = \frac{e^{-\Theta} \Theta^x}{x!} I_{\{0, 1, \dots\}}(x), \quad \Theta > 0$$

Wobei Θ einer Gammaverteilung mit der Dichte:

$$g(\Theta; r, \lambda) = \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \Theta^{r-1} e^{-\lambda \Theta} I_{0, \infty}(\Theta), \quad r, \lambda > 0$$

folgt.

Zu Zeigen:

Die Mischung von Poissonverteilungen

$$\int_0^\infty f(x; \Theta) \cdot g(\Theta; r, \lambda) d\Theta$$

folgt einer negativ Binomialverteilung mit den Parametern r und $p = \frac{\lambda}{\lambda+1}$

Lösung:

$$\begin{aligned} \int_0^\infty f(x; \Theta) \cdot g(\Theta; r, \lambda) d\Theta &= \int_0^\infty \frac{e^{-\Theta} \Theta^x}{x!} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \cdot \frac{\lambda^r}{\Gamma(r)} \Theta^{r-1} e^{-\lambda \Theta} d\Theta \\ &= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r) x!} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \int_0^\infty e^{-\Theta} \Theta^x \Theta^{r-1} e^{-\lambda \Theta} d\Theta \\ &= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r) x!} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \int_0^\infty \Theta^{(x+r)-1} e^{-(1+\lambda)\Theta} d\Theta \\ &= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r) x!} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \int_0^\infty \frac{\Gamma(r+x)}{(\lambda+1)^{r+x}} \frac{(\lambda+1)^{r+x}}{\Gamma(r+x)} \Theta^{(x+r)-1} e^{-(1+\lambda)\Theta} d\Theta \\ &= \frac{\lambda^r}{\Gamma(r) x!} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \frac{\Gamma(r+x)}{(\lambda+1)^{r+x}} \underbrace{\int_0^\infty \frac{(\lambda+1)^{r+x}}{\Gamma(r+x)} \Theta^{(x+r)-1} e^{-(1+\lambda)\Theta} d\Theta}_{\substack{\Theta \sim \Gamma(r+x, \lambda+1) \\ =1}} \\ &= \frac{\lambda^r \Gamma(r+x)}{\Gamma(r) x! (\lambda+1)^{r+x}} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \\ &= \frac{\lambda^r \Gamma(r+x)}{\Gamma(r) x! (\lambda+1)^r (\lambda+1)^x} I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \\ &= \frac{\Gamma(r+x)}{\Gamma(r) x! (\lambda+1)^x} \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} \right)^r I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \\ &= \frac{\Gamma(r+x)}{\Gamma(r) x! (\lambda+1)^x} \left(\frac{\lambda}{\lambda+1} \right)^r I_{\{0, 1, \dots\}}(x) \end{aligned}$$

4

a)

Gegeben:

Die Dichte der Normalverteilung ist:

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$$

Zu Zeigen:

$$A = \int_{-\infty}^{\infty} f(x; \mu, \sigma) dx = 1$$

Lösung:

Wir zeigen, dass $A^2 = 1$:

$$A^2 = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} dx$$

d)

Zu Zeigen:

Die momenterzeugende Funktion einer standardnormalverteilten ZV ist

$$M(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$$

Lösung:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 1} e^{(-\frac{1}{2})\left(\frac{x-0}{1}\right)^2} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{tx - \frac{x^2}{2}} dx \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-t)^2} dx \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

5

Gegeben:

Bivariate Normalverteilung mit:

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

a)

Gesucht:

Regressionsfunktion von X_1 auf X_2 sowie $E(X_1|x_2 = 9)$ **Lösung:**

Gesucht ist also zunächst:

$$\begin{aligned} E(X_1|X_2) &= \mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(x_2 - \mu_2) \\ &= 5 + (-1)\frac{1}{3}(x_2 - 8) \\ &= 5 - \frac{1}{3}x_2 + \frac{8}{3} \\ &= \frac{23}{3} - \frac{1}{3}x_2 \\ E(X_1|x_2 = 9) &= \frac{23}{3} - \frac{1}{3}9 \\ &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$

b)

Gesucht:

Bedingte Varianz von X_1 gegeben $x_2 = 9$

Lösung:

$$\begin{aligned} Var(X_1|x_2 = 9) &= \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21} \\ &= 2 - (-1)\frac{1}{3}(-1) \\ &= \frac{5}{3} \end{aligned}$$

c)

Gesucht:

Die Wahrscheinlichkeit $P(x_1 > 5)$ und die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(x_1 > 5|x_2 = 9)$

Lösung:

Da $E(X_1) = 5$ ist und aufgrund der Symmetrie der Normalverteilung um den Erwartungswert gilt $P(x_1 > 5) = \frac{1}{2}$

Wie in a und b gezeigt ist $X_1|x_2 = 9$ verteilt mit $\mathcal{N}(\frac{14}{3}, \frac{5}{3})$.

Wir Z -standartisieren zunächst (es gilt also $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$):

$$P(x_1 > 5|x_2 = 9) = P(Z > \frac{5 - \mu_{1|2}}{\sigma_{1|2}}) = P(Z > \frac{5 - \frac{14}{3}}{\frac{5}{3}}) = P(Z > 0.2)$$

6

Es folgen einige PDFs und es gilt zu überprüfen, ob es sich um Mitglieder der Exponentialfamilie handelt

Eine PDF $f(x; \Theta)$ gilt als Mitglied der Exponentialfamilie wenn:

$$f(x; \Theta) = \begin{cases} e^{\sum_{i=1}^k c_i(\Theta)g_i(x)+d(\Theta)+z(x)} & \text{for } x \in A \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Wobei $x = (x_1, \dots, x_n)'$, $\Theta = (\Theta_1, \dots, \Theta_k)'$; $c_i(\Theta)$, $i = 1, \dots, k$ und $d(\Theta)$ sind reelwertige Funktionen von Θ die unabhängig von x sind und $g_i(x)$, $i = 1, \dots, k$ und $z(x)$ sind reelwertige Funktionen die nicht abhängig von Θ sind. $A \in R^n$ ist eine Menge von n Tupeln im n -dimensionalen reellen Raum deren Definition unabhängig von Θ ist

a)

Gegeben:

Bernoulliverteilung

$$f(x; p) = p^x(1-p)^{1-x}I_{\{0,1\}}(x) \quad p \in [0, 1]$$

Lösung:

$$\begin{aligned} f(x; p) &= p^x(1-p)^{1-x}I_{\{0,1\}}(x) & a &= e^{\ln(a)} \\ &= e^{\ln(p^x(1-p)^{1-x}I_{\{0,1\}}(x))} & \ln(a \cdot b) &= \ln(a) + \ln(b) \\ &= e^{\ln(p^x) + \ln((1-p)^{1-x}) + \ln(I_{\{0,1\}}(x))} & \ln(a^b) &= b \cdot \ln(a) \\ &= e^{x \ln(p) + (1-x) \ln(1-p) + \ln(I_{\{0,1\}}(x))} \\ &= e^{x \ln(p) + \ln(1-p) + x \ln((1-p)^{-1}) + \ln(I_{\{0,1\}}(x))} \\ &= e^{x(\ln(p) + \ln((1-p)^{-1})) + \ln(1-p) + \ln(I_{\{0,1\}}(x))} & \ln(a) + \ln(b) &= \ln(a \cdot b) \\ &= e^{x \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) + \ln(1-p) + \ln(I_{\{0,1\}}(x))} \end{aligned}$$

\implies Ist in Exponentialfamilie mit:

$$c_i(\Theta) = \ln\left(\frac{\Theta}{1-\Theta}\right) \quad g_i(x) = x \quad d(\Theta) = \ln(1-\Theta) \quad z(x) = \ln(I_{\{0,1\}}(x))$$

b)

Gegeben:

Gammaverteilung

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha) x^{\alpha-1}} e^{-x/\beta} I_{(0,\infty)}(x), \quad \alpha, \beta > 0$$

Lösung:

$$\begin{aligned} f(x; \alpha, \beta) &= \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-x/\beta} I_{(0,\infty)}(x) \\ &= e^{\ln\left(\frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}\right) - x/\beta} e^{\ln(I_{(0,\infty)}(x))} \\ &= e^{\ln\left(\frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1}\right) - x/\beta + \ln(I_{(0,\infty)}(x))} \\ &= e^{\ln(\beta^{-\alpha}) + \ln(\Gamma(\alpha)^{-1}) + \ln(x^{\alpha-1}) - \frac{x}{\beta} + \ln(I_{(0,\infty)}(x))} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-\alpha \ln(\beta) - \ln(\Gamma(\alpha)) + (\alpha-1) \ln(x) - \frac{x}{\beta} + \ln(I_{(0,\infty)}(x))} \\
&= e^{(\alpha-1) \ln(x) - \frac{x}{\beta} - \ln(\Gamma(\alpha)) - \alpha \ln(\beta) + \ln(I_{(0,\infty)}(x))}
\end{aligned}$$

\implies Ist in Exponentialfamilie mit:

$$\begin{aligned}
c_1(\Theta) &= \Theta_1 - 1 & g_1(x) &= \ln(x) & c_2(\Theta) &= -\frac{1}{\Theta} & g_2(x) &= x \\
d(\Theta) &= -\ln(\Gamma(\Theta_1)) - \Theta_1 \ln(\Theta_2) & z(x) &= \ln(I_{(0,\infty)}(x))
\end{aligned}$$

c)

Gegeben:

Paretoverteilung

$$f(x, \beta) = \beta x^{-(\beta+1)} I_{(1,\infty)}(x), \quad \beta > 0$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
f(x, \beta) &= \beta x^{-(\beta+1)} I_{(1,\infty)}(x) \\
&= e^{\ln(\beta x^{-(\beta+1)}) I_{(1,\infty)}(x)} \\
&= e^{\ln(\beta) + \ln(x^{-(\beta+1)}) + \ln(I_{(1,\infty)}(x))} \\
&= e^{(\beta+1) \ln(\frac{1}{x}) + \ln(\beta) + \ln(I_{(1,\infty)}(x))}
\end{aligned}$$

\implies Ist in Exponentialfamilie mit:

$$c_1(\Theta) = \Theta + 1 \quad g_1(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right) \quad d(\Theta) = \ln(\Theta) \quad z(x) = \ln(I_{(1,\infty)}(x))$$

d)

Gegeben:

Lognormalverteilung

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}} e^{-[\ln(x) - \mu]^2 / (2\sigma^2)} I_{(0,\infty)}(x), \quad \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

Lösung:

$$\begin{aligned}
f(x; \mu, \sigma) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}} e^{-[\ln(x) - \mu]^2 / (2\sigma^2)} I_{(0,\infty)}(x) \\
&= e^{\ln(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}})} e^{-[\ln(x) - \mu]^2 / (2\sigma^2)} e^{\ln(I_{(0,\infty)}(x))} \\
&= e^{\ln(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}}) - [\ln(x) - \mu]^2 / (2\sigma^2) + \ln(I_{(0,\infty)}(x))} \\
&= e^{\ln(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma x}}) - [\ln(x)^2 + \mu^2 - 2\ln(x)\mu] / (2\sigma^2) + \ln(I_{(0,\infty)}(x))} \\
&= e^{\ln(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}) + \ln(\frac{1}{x}) - \frac{\ln(x)^2}{2\sigma^2} - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} + \frac{\ln(x)\mu}{\sigma^2} + \ln(I_{(0,\infty)}(x))}
\end{aligned}$$

\implies Ist in Exponentialfamilie mit:

$$\begin{aligned}
c_1(\Theta) &= \frac{-1}{2\Theta_2^2} & g_1(x) &= \ln(x)^2 & c_2 &= \frac{\Theta_1}{\Theta_2^2} & g_2 &= \ln(x) \\
d(\Theta) &= \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\Theta_2}}\right) - \frac{\mu^2}{2\sigma^2} & z(x) &= \ln(x) + \ln(I_{(0,\infty)}(x))
\end{aligned}$$