

## Numerische Mathematik

Sommersemester 2022

Übungsblatt 9

### Hausaufgaben (Abgabe bis 14.06.2022, 10<sup>00</sup> Uhr)

#### Hausaufgabe 9.1: Gram-Schmidt und QR-Zerlegung

Es sei  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  mit linear unabhängigen Spalten  $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}^m$ , d.h.  $\text{Rang}(A) = n \leq m$ . Das **modifizierte Gram-Schmidt-Verfahren** berechnet eine obere Dreiecksmatrix  $\hat{R} \in M_n(\mathbb{R})$  sowie eine Matrix  $\hat{Q} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  mit Spalten  $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{R}^m$  wie folgt (wobei die  $q_j$  im Laufe des Algorithmus mehrfach geändert werden). Für  $j$  von 1 bis  $n$ :

- Sei anfänglich jeweils  $q_j := a_j$ .
- Für  $i$  von 1 bis  $j - 1$  definiere  $R_{i,j} := \frac{q_i^\top q_j}{q_i^\top q_i}$  und ersetze  $q_j := q_j - R_{i,j} q_i$ .
- Setze  $R_{j,j} := 1$ .

(4 P.) Zeigen Sie:  $q_1, \dots, q_n$  ist ein Orthogonalsystem bzgl. Standardskalarprodukt, d.h.  $\hat{Q}^\top \hat{Q}$  ist eine invertierbare Diagonalmatrix, und zudem  $A = \hat{Q} \hat{R}$ .

#### Hausaufgabe 9.2: Vergleich von Lösungsmethoden

Sei  $A := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$ , wobei  $\varepsilon > 0$  so gewählt sei, dass  $1 \boxplus \varepsilon \neq 1$  und  $1 \boxplus \varepsilon^2 = 1$  (In double precision könnte man beispielsweise  $\varepsilon = 10^{-15}$  wählen). Ferner sei  $b := \begin{pmatrix} 1 \\ \varepsilon \\ -\varepsilon \\ \varepsilon \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4$ .

In dieser Aufgabe werden zwei Ansätze zur numerischen Lösung des linearen Ausgleichsproblems  $\|b - Ax\| \stackrel{!}{=} \min$  verglichen.

- (4 P.) Berechnen Sie  $A^\top \boxminus A$  und berechnen Sie  $\hat{Q}, \hat{R}$  mit dem Algorithmus aus HA 9.1. Rechnen Sie dabei gerundet, so dass  $\forall n \in \mathbb{N}^*: n \boxplus \varepsilon^2 = n$ .
- (4 P.) Fortsetzung der vorigen Teilaufgabe: Zeigen Sie, dass das lineare Ausgleichsproblem nicht numerisch mit den Normalgleichungen lösbar ist, und lösen Sie es numerisch mit der Zerlegung  $A \approx \hat{Q} \hat{R}$ . Wie das geht, ist Thema der Vorlesung vom 08.06.2022.

Bitte wenden

**Programmieraufgabe 9.3: Zur Vorlesung vom 08.06.2022**

Sei  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $x_0 < x_n$ ,  $\Delta := \frac{x_n - x_0}{n}$ . Für  $k \in \{1, \dots, n-1\}$  sei  $x_k := x_0 + k\Delta$  und  $b \in \mathbb{R}^{n+1}$  mit  $b_k := e^{x_k}$ . Für  $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$  sei  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $f(x) := c_1 + c_2x + c_3x^2$ . (4 P.) Schreiben Sie ein Programm, das zur Eingabe  $n, x_0, x_n$  die Parameter  $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$  so bestimmt, dass der quadratische Fehler bei Approximation von  $b$  durch  $(f(x_0), \dots, f(x_n))$  minimiert wird. Stellen Sie  $f(x)$  und  $e^x$  auf  $[a, b]$  zudem graphisch dar, und zwar einerseits für  $n = 10$ ,  $x_0 = -2$ ,  $x_{10} = 0$ , andererseits für  $n = 10$ ,  $x_0 = -2$ ,  $x_{10} = 2$ . Ihr Programm soll auf der Lösung der Normalgleichungen in double precision basieren. Für die Lösung linearer Gleichungssysteme sollen Sie Funktionen aus geeigneten numerischen Bibliotheken verwenden.

**Erreichbare Punktzahl:** 16