

# Numerische Mathematik Hausaufgaben

von Rico Kölling 192316 und Svaran Singh Chandla 193922

## Aufgabe 1

## Aufgabe 2

a)

$i$	0	1	2	3
$t_i$	0	1	3	4
$f_i$	4	5	7	-4

a)  $p(2) \quad t = 2$

$$P_{0,0} := 4$$

$$P_{1,0} := 5$$

$$P_{1,1} = 5 + \frac{2-1}{1-0}(5-4) = 6$$

$$P_{2,0} = 7$$

$$P_{2,1} = 7 + \frac{2-3}{3-1}(7-5) = 6$$

$$P_{2,2} = 6 + \frac{2-3}{3-0}(6-6) = 6$$

$$P_{3,0} = -4$$

$$P_{3,1} = -4 + \frac{2-4}{4-3}(-4-7) = 18$$

$$P_{3,2} = 18 + \frac{2-4}{4-1}(18-6) = 10$$

$$P_{3,3} = 10 + \frac{2-4}{4-0}(-6-6) = 8$$

$$\curvearrowright p(2) = 8$$

b)

$$t := (0, 1, 3, 4)$$

$$L_0(0) = -\frac{1}{12}(t-1)(t-3)(t-4)$$

$$L_1(1) = \frac{1}{6}(3-t)(4-t)t$$

$$L_2(3) = \frac{1}{6}(4-t)(t-1)t$$

$$L_3(4) = \frac{1}{12}t(t-1)(t-3)$$

$$p(t) = \left(\frac{t-1}{0-1} * \frac{t-3}{0-3} * \frac{t-4}{0-4}\right) * 4 + \left(\frac{t-0}{1-0} * \frac{t-3}{1-3} * \frac{t-4}{1-4}\right) * 5 + \left(\frac{t-0}{3-0} * \frac{t-1}{3-1} * \frac{t-4}{3-4}\right) * 7 + \left(\frac{t-0}{4-0} * \frac{t-1}{4-1} * \frac{t-3}{4-3}\right) * -4$$

$$p(t) = -t^3 + 4t^2 - 2t + 4$$

c)

$i$	$t_i$	$f_i$			
0	0	4			
1	1	5	$\frac{5-4}{1-0} = 1$		
2	3	7	$\frac{7-5}{3-1} = 1$	$\frac{1-1}{2-0} = 0$	
3	4	-4	$\frac{-4-7}{4-3} = -11$	$\frac{-11-1}{4-1} = -4$	$\frac{-4-0}{4-0} = -1$

$N_0 = 1$

$N_1 = t$

$N_2 = (t - 0) \cdot (t - 1) = t(t - 1)$

$N_3 = (t - 0) \cdot (t - 1) \cdot (t - 3) = t(t - 1)(t - 3)$

$p = 4 * 1 + 1 * t - 0 + (t(t - 1)(t - 3) * (-1)) = -t^3 + 4t^2 - 2t + 4$

Aufgabe 3

a)

b) siehe ZehnPunktDrei.py