

Цикл брошюр
«Библиотека
рассеянного
склероза»
БЕТАЛАЙФ

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

по терапии рассеянного
склероза лекарственным
препаратом терифлуномид



БЕТАЛАЙФ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ



БЕТАЛАЙФ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ

ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый пациент, Вам был назначен препарат, изменяющий течение рассеянного склероза – Терифлуномид.

В данной брошюре Вы найдете краткую информацию по препарату, показаниям и возможным нежелательным реакциям. Полную информацию Вы можете получить в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

Внимательно ознакомьтесь с данным материалом. Если Вы испытываете одну из нежелательных реакций, указанных в данной брошюре, обратитесь к своему лечащему врачу.

Для получения дополнительной информации и для сообщения о развитии нежелательной реакции Вы можете по телефону и адресу электронной почты, указанных на упаковке или в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.

БЕТАЛАЙФ — СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ



Интернет-портал BETALIFE.RU

Портал содержит общую информацию о различных аспектах заболевания: от типов течения рассеянного склероза до рекомендаций по ведению правильного образа жизни.

Вебинары для пациентов от ведущих специалистов.



Информационные материалы

«Библиотека рассеянного склероза» – цикл брошюр с общей информацией для пациентов с рассеянным склерозом и членов их семей.

Брошюры доступны на портале BETALIFE.RU.



Круглосуточная горячая линия 8 (800) 200 08 16

Специалисты горячей линии ответят на вопросы, касающиеся терапии рассеянного склероза препаратами BIOCAD.

При необходимости Вы можете получить консультацию менеджера по медицинской информации.



Мобильное приложение BETALIFE

Позволяет контролировать самочувствие, физическую активность, питание и отслеживать возникновение симптомов. Напомнит о приеме препарата.

Доступ к научным статьям и последним новостям из области рассеянного склероза.

Обращение в сервисную программу специализированной поддержки пациентов с рассеянным склерозом БЕТАЛАЙФ не может заменить очную консультацию лечащего врача.



ТЕРИФЛУНОМИД

Информация о препарате



Международное непатентованное или группировочное наименование:

терифлуномид



Лекарственная форма:

таблетки, покрытые пленочной оболочкой



Состав:

1 таблетка содержит –
терифлуномид 14,00 мг.



Показания к применению

Рецидивирующе-ремиттирующий рассеянный склероз.



Противопоказания

- Гиперчувствительность к действующему веществу или какому-либо из вспомогательных веществ препарата.
- Тяжелая почечная недостаточность
- Беременность
- Период грудного вскармливания
- Тяжелый иммунодефицит, например СПИД
- Тяжелые нарушения костномозгового кроветворения или анемия, значимое снижение лейкоцитов, нейтрофилов или тромбоцитов
- Тяжелая печеночная недостаточность
- Тяжелые активные инфекции до момента выздоровления
- Возраст до 18 лет
- Тяжелая гипопротеинемия
- Дефицит лактазы, непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Лекарственный препарат Терифлуномид не должен приниматься во время беременности или женщинами с сохраненным репродуктивным потенциалом, если они не используют эффективные методы контрацепции. Так как препарат Терифлуномид может вызвать серьёзные дефекты в развитие у плода.

- Не начинайте приём препарата Терифлуномид, если Вы беременны или предполагаете беременность. Ваш доктор должен попросить Вас сдать тест на беременность до назначения препарата.
- Используйте эффективную контрацепцию во время приёма препарата Терифлуномид. Если Вы решите забеременеть или решите сменить метод контрацепции после приёма препарата Терифлуномид, сообщите об этом своему лечащему врачу.
- Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы планируете кормить грудью.
- Если Вы предполагаете беременность во время приёма препарата Терифлуномид или в период двух лет после прекращения лечения, Вы должны незамедлительно сообщить своему лечащему врачу и сдать тест на беременность. Если беременность подтвердится, то Вам могут быть назначены лекарственные препараты для ускоренного выведения терифлуномида из организма. Это может снизить риск для плода.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата группы препаратов Терифлуномид (Абаджио®, Терифлуномид БИОКАД, Феморикс®, ТРЕИФЛУНОМИД-ХИМРАР), информация адаптирована.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

Рекомендуемая доза препарата – 14 мг в день. Таблетки следует принимать целиком, запивая водой, независимо от приёма пищи.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Наиболее часто могут возникать следующие нежелательные реакции: головная боль, диарея, тошнота и выпадение волос. Данные реакции проявляются в виде легкой и умеренной степени тяжести, преходящие и редко приводят к прекращению приёма лекарства.

Полный перечень нежелательных реакций указан в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата. **При развитии серьезных нежелательных реакций следует немедленно прекратить терапию и обратиться к лечащему врачу или вызвать скорую медицинскую помощь.**

BETALIFE.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

BIOCAD
Biotechnology Company

Программа BETALIFE создана при поддержке компании BIOCAD
198515, Санкт-Петербург, п.Стрельна, ул.Связи, 34-А
+7 (812) 380-49-33 \ Факс: +7 (812) 380-49-34

RU TER.00254.14.02.2021

Информация брошюры не может быть использована для самостоятельной диагностики или лечения. Перед применением препарата ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь со специалистом

Не для продажи. Распространяется для некоммерческого использования в качестве вспомогательной информационной литературы по различным медикаментозным аспектам заболевания. Не является рекламой.