

松村可換環論 11 章ノート

Riley @Na₂COOH_2

このノートは松村可換環論 [1] の第 11 章「完備局所環の応用」の内容をまとめたものである.




図 1: 松村 英之


https://opc.mfo.de/detail?photo_id=11895&would_like_to_publish=1 より

目次

§ 31 素イデアル鎖	3
§ 32 形式的ファイバー	8
参考文献	13

§ 31 素イデアル鎖

この章の目標は、主に次のネーター局所環に関する性質のヒエラルキーを知り、理解することである。下に行くほど強い性質であり、unmixed 以下はすでに 11 章以前に書いてある。ちなみにこの図で遊びたい場合は[ここ](#)にソースを置いたのでどうぞ。



本セクションではこのヒエラルキーの、主に unmixed から上のわちゃわちゃした部分を扱う。ただし、これらに触れることが目標であり、詳細な証明に立ち入ると内容が脱線するため、多くの証明は省略することにする。面倒な部分は適切に飛ばそうということで、テキトーに進むというわけではない。多分。

ちなみに、CM と Gor の間に挟まる環を探す試みが最近は主流である。Gor に関しては quasi-Gor, nearly-Gor, almost-Gor, weakly-Gor, approximately-Gor などが知られていた。しかし、完備化や多項式環との同値性が崩れたり、低次元ではほとんど意味のない概念だったりした。そこで最近 CTR 環が宮崎先生により発見された。これは結構うまくいっていると思う。

Th 31.1

A をネーター半局所環とする. (有限個の極大イデアルしか持たないものを半局所環という.) \mathfrak{p} を素イデアルとする. このとき, 次を満たすような素イデアル \mathfrak{p}' は高々有限個である.

$$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}', \quad \text{ht}(\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}) = 1, \quad \text{ht}(\mathfrak{p}') \neq \text{ht}(\mathfrak{p}) + 1$$

□

(proof)

omit

♠

catenary の場合は, この有限個というのが 0 個を意味することは自明である. catenary でなくともこのような, いじわる素イデアルは高々有限個しか存在しないということである.

Th 31.2: Ratliff の弱存在定理

A をネーター環とする. $\mathfrak{p} \subset P$ を素イデアルとする. $\text{ht}(\mathfrak{p}) = h$, $\text{ht}(P/\mathfrak{p}) = d > 1$ とおく. このとき, つぎのような素イデアル \mathfrak{p}' が無限に存在する.

$$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}' \subset P, \quad \text{ht}(\mathfrak{p}') = h + 1, \quad \text{ht}(P/\mathfrak{p}') = d - 1$$

□

(proof)

まず, $\text{ht}(P/\mathfrak{p}) = d$ なので, $P = \mathfrak{p}_0 \supsetneq \mathfrak{p}_1 \supsetneq \cdots \supsetneq \mathfrak{p}_d = \mathfrak{p}$ という列をとれる. ここで $\mathfrak{p}_{d-2} \supsetneq \mathfrak{p}' \supsetneq \mathfrak{p}$, $\text{ht}(\mathfrak{p}') = h + 1$ とすると, $\text{ht}(\mathfrak{p}_{d-2}) \geq h + 2$ だから $\mathfrak{p}_{d-2} \supsetneq \mathfrak{p}'$ が従い, $\text{ht}(\mathfrak{p}) = h$ なので

$$\mathfrak{p}_0 \supsetneq \mathfrak{p}_1 \supsetneq \cdots \supsetneq \mathfrak{p}_{d-2} \supsetneq \mathfrak{p}' \supsetneq \mathfrak{p}$$

は, もはや間に素イデアルを挟めないから, $\text{ht}(P/\mathfrak{p}') = d - 1$ が従う. ところで, \mathfrak{p}_{d-2} と \mathfrak{p} の真の間には $\text{ht}(\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}) = 1$ なる素イデアルが無限に存在する. これを示すため, 仮に有限個 $\mathfrak{p}'_1, \dots, \mathfrak{p}'_m$ で尽きるとする. $\mathfrak{p}_{d-2} \supsetneq \bigcup_{i=1}^m \mathfrak{p}'_i$ であるが, もしイコールなら prime avoidance によって $\mathfrak{p}_{d-2} = \mathfrak{p}_i$ となって矛盾する. よって $a \in \mathfrak{p}_{d-2} \setminus \bigcup_{i=1}^m \mathfrak{p}'_i$ をとれる. $\mathfrak{p} + (a)$ の極小素イデアル \mathfrak{p}'_{m+1} をとると, 明らかにどの \mathfrak{p}'_i とも異なる. 単項イデアル定理から $\text{ht}(\mathfrak{p}'_{m+1}/\mathfrak{p}) = 1$ となり, 矛盾である. このような \mathfrak{p}' は, [Th 31.1](#) によって, 有限個を除くほとんどが $\text{ht}(\mathfrak{p}') = \text{ht}(\mathfrak{p}) + 1$ を満たす. ♠

ところで, この定理を使うと次がわかる.

Cor

A を単位的可換環とする. $\text{Spec}(A)$ が有限集合で $\dim(A) \geq 2$ なら, A はネーター環ではない. □

(proof)

$\dim(A) \geq 2$ で $\text{Spec}(A)$ が有限集合だから, $\mathfrak{p} \subset P$ という素イデアルで $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 0$, $\text{ht}(P/\mathfrak{p}) = 2$ なるものがある. そこで, [Th 31.2](#) を適用すると, 無限に素イデアルが存在することになる. 矛盾. ♠

特に、2次元以上の付値環はネーター環ではないことがわかる。(無限次元の場合には、単に極大イデアルの高さがもはや有限ではないのだから、標高定理からネーター環ではないことがわかる。)

次の補題1は(私の観測史上では)使っていないので省略する。

また、次の定理は松村では整域を課しているが、証明を見る限り整域である必要はなさそうである。さらに、同じことを思ったのか[このPDF](#)でも整域という条件はしれっと外している。

Th 31.3: Ratliff の強存在定理

A をネーター環とする。 $\mathfrak{p} \subset P$ を素イデアルとして、 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = h > 0$, $\text{ht}(P/\mathfrak{p}) = d > 0$ とする。このとき $0 \leq i < d$ をみたす各 i に対し次の集合は無限集合である。

$$\{\mathfrak{p}' \in \text{Spec}(\mathfrak{p}') \mid \mathfrak{p}' \subset P, \text{ht}(P/\mathfrak{p}') = d - i, \text{ht } \mathfrak{p}' = h + i\}$$

□

(proof)

omit



Th 31.4

(A, \mathfrak{m}) をネーター局所整域とする。このとき A が catenary であることと、すべての素イデアル \mathfrak{p} に対し、 $\text{ht}(\mathfrak{p}) + \text{coht}(\mathfrak{p}) = \dim(A)$ を満たすことは同値である。

□

(proof)

omit



ちなみに上の定理で整域としているのは、 (0) がただ一つの極小素イデアルであることを使いたいからである。一般にネーター局所環では複数の極小素イデアルがあるが、どの極小素イデアルを選ぶかで coht が変わってしまうかもしれない。それがすべて一致していたらうれしいわけである。そこで次の定義が出てくる。

Def

$\dim(A) < \infty$ なる環 A に対して、すべての極小素イデアル \mathfrak{p} が $\dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A)$ をみたすとき、 A は **equidimensional** であるという。

□

次の補題2も使っていない気がするので省略する。

Th 31.5

A, B をネーター局所環。 $A \rightarrow B$ を局所環の射とする。 B が A 上 flat で equidimensional で catenary であれば、 A もそうである。さらに $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対して $B/\mathfrak{p}B$ も equidimensional である。

□

(proof)

omit



証明では同書籍の定理 15.1 を使うのでそちらも参照されたい.

ところで, 局所環の射が flat ならば自動的に faithfully flat である. (定理 7.3)したがって上の定理では faithfully flat を想定することになる. 一般に faithfully flat $A \rightarrow B$ において, B が持つ性質が A にも伝播するとき, その性質は descent するという. 例えばネーター性は忠実平坦降下, faithfully flat descent する. 上の定理は equidimensionality と catenary 性が faithfully flat descent することを言っている.

Cor

A は正則局所環 R の準同型像である局所環とする. このとき完備化 A^* が equidimensional ならば, A も equidimensional である. □

(proof)

omit



上の系でネーター性は勝手についてくるのでわざわざ述べていない. また, この系から次の定義が出てくる.

Def

ネーター局所環 A において, 完備化 A^* が equidimensional ならば, A は **quasi-unmixed** であるという. □

ちなみに quasi-unmixed は別名 formally equidimensional である. この名称からして unmixed ならば quasi-unmixed であることが期待される. unmixed というのは CM 環であることと同値なので (定理 17.6) CM 環は quasi-unmixed か? という話である. CM 環は完備化しても CM 環なので, CM 環が equidimensional であることを示せば, unmixed ならば quasi-unmixed であることが従う. これは定理 17.3 の(i)で述べられている.

冒頭のヒエラルキーの正当化に大きくかかわるのが次の定理である.

Th 31.6

(A, \mathfrak{m}) を quasi-unmixed なネーター局所環とする. このとき次が成り立つ.

- i) $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対して $A_{\mathfrak{p}}$ も quasi-unmixed である.
- ii) A のイデアル I に対して A/I が equidimensional であることと quasi-unmixed であることは同値である.
- iii) B が essentially of finite type over A である局所環で equidimensional であれば, B も quasi-unmixed である.
- iv) A は universally catenary である.

□

(proof)

omit



essentially of finite type over A とは, A 上有限生成な可換環の局所化であることを言う. 例えば明らかなことだが, 多項式環 $A[x_1, \dots, x_n]$ の任意の極大イデアルで局所化したものは essentially of finite type over A である.

ところで, EGA には quasi-unmixed を用いて, 次の formally catenary の概念が導入された.

Def

ネーター局所環 A に対して, すべての素イデアル \mathfrak{p} に対して A/\mathfrak{p} が quasi-unmixed ならば, A は **formally catenary** であるという. □

formally catenary ならば universally catenary であることは, 次のようにして示せる.



次を示せばいい.

$$\forall \mathfrak{p} \in \min(A), A/\mathfrak{p} : \text{universally catenary} \iff A : \text{universally catenary}$$

\Leftarrow は自明. \Rightarrow について示す. S を A 上有限生成な代数とする. 任意の S の極小素イデアル \mathfrak{q} に対して S/\mathfrak{q} が catenary なこと示せばいい. $\mathfrak{q} \cap A \supset \mathfrak{p}$ となる A の極小素イデアル \mathfrak{p} をとる. すると, 剰余環の普遍性により次の可換図式を得る.

$$\begin{array}{ccc} A[X] & \xrightarrow{\quad} & S/\mathfrak{q} \\ & \searrow & \nearrow \\ & A/\mathfrak{p}[X] & \end{array}$$

(図のソースは [こちら](#)) ゆえに S は catenary である.

しかし, EGA でこの概念を導入後, Ratliff がこの逆も成立することを示した. すなわち, 次が成り立つ.

Th 31.7

ネーター局所環 A が universally catenary であることと formally catenary であることは同値である. □

(proof)

omit



ここでいまいち [冒頭のヒエラルキー](#) に戻って鑑賞すると面白い.

§ 32 形式的ファイバー

本節では, geometrically regular や G-ring, Excellent ring の概念に触れる. これらは様々な可換環論的な性質が, 可換環論的な操作において, ほどよく遺伝することが明らかになる.

まず, 一般に環準同型 $\varphi: A \rightarrow B$ に対して, $\mathrm{Spec}(\varphi): \mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(A)$ が誘導される. このとき, $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ に対して, そのファイバー $\mathrm{Spec}(\varphi)^{-1}(\mathfrak{p})$ を考える. $\mathrm{Spec}(\varphi)^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathrm{Spec}(C)$ となるような環を構成できるだろうか? 答えは Yes であり, それは $C = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ である. ここで $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ で剰余体である. この C をファイバー環という. なぜ C をこのようにとるのか簡単に説明する.

🔗 次の同型変形ができる. ただし $S = \varphi(A \setminus \mathfrak{p})$ は B の積閉集合である.

$$\begin{aligned} C &= B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \\ &= B \otimes_A (A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}) \\ &= S^{-1}B/\mathfrak{p}S^{-1}B \\ &= S^{-1}B/\mathfrak{p}S^{-1}B \end{aligned}$$

ゆえに $P \in \mathrm{Spec}(C)$ は $\mathfrak{p}S^{-1}B \subset P$ なる $S^{-1}B$ の素イデアルに対応し, この P は $\mathfrak{p}B \subset P$ かつ $P \cap S = \emptyset$ なる B の素イデアルに対応する. このような B の素イデアルは A に引き戻すと $\mathfrak{p} \subset \varphi(P)$ かつ $\varphi^{-1}(P) \cap (A \setminus \mathfrak{p}) = \emptyset$ となる. これを整理すると, $\varphi^{-1}(P) = \mathfrak{p}$ となる. 逆にこのような B の素イデアルは, 逆をたどれば C の素イデアルに対応すると分かる. したがって, $\mathrm{Spec}(C)$ の素イデアルはちょうど $\mathrm{Spec}(\varphi)^{-1}(\mathfrak{p})$ なる素イデアルに対応する. 上の同型はすべて対応するアフィンスキームの位相同型をも与えるので, $\mathrm{Spec}(C) = \mathrm{Spec}(\varphi)^{-1}(\mathfrak{p})$ は位相同型でもある.

特に, ネーター局所環 (A, \mathfrak{m}) に対して完備化に関する自然な射 $A \rightarrow A^*$ のファイバー環のことを形式的ファイバーという. 各素イデアルにおけるファイバー環がどうなっているかを調べることで, 問題を分割することができるというイメージだろうか.

Def

可換環に対する条件を \mathbb{P} と書くことにする. 例えば \mathbb{P} : regular, CM, Gorenstein, reduced など.

ネーター環 A と $k \subset A$: 部分体に対して, 任意の有限次拡大 k'/k に対しても $A \otimes_k k'$ が, \mathbb{P} を持つとき, A は k 上に **geometrically \mathbb{P}** であるという. 例えば $\mathbb{P} = \text{regular}$ のとき, A は k 上に **geometrically regular** であるという. \square

ちなみに, このとき $A \otimes_k k' = A \otimes_k k[\alpha_1, \dots, \alpha_n] = A[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ なので, $A \otimes_k k'$ はネーター環である. また, $k' = k$ としてもいいのだから, A において geometrically \mathbb{P} ならば \mathbb{P} である.

このノートでは, geometrically regular に注目する. geometrically reduced ものちに紹介する西村純一の結果[3] の中に出てくる. 西村純一は松村可換環論の Krull 環の節の最後にも結果が残されている.

Prop

$k \subset A$ をネーター環とその部分体とする. 次は同値である.

- i) A は k 上に geometrically regular である.
- ii) $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対して, $A_{\mathfrak{p}}$ は k 上に geometrically regular である.
- iii) $\forall \mathfrak{m} \in \text{Max}(A)$ に対して, $A_{\mathfrak{m}}$ は k 上に geometrically regular である.

ただし, $k \rightarrow A \rightarrow A_{\mathfrak{p}}$ という標準的な射によって k を $A_{\mathfrak{p}}$ の部分体とみなす. □

(proof)

(i) \Rightarrow (ii): k'/k を任意の有限次拡大とする.

$$A_{\mathfrak{p}} \otimes k' = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A A \otimes_k k' = A_{\mathfrak{p}} \otimes_A (A \otimes_k k')$$

であり, 正則環の局所化で表せるので $A_{\mathfrak{p}} \otimes k'$ も正則.

(ii) \Rightarrow (iii): 自明.

(iii) \Rightarrow (i): $A \rightarrow A \otimes_k k' = A[\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ は整拡大である. よって任意の $\mathfrak{n} \in \text{Max}(A \otimes_k k')$ に対して $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A \in \text{Max}(A)$ である. ここで $\exists t \in (A \setminus \mathfrak{m}) \cap \mathfrak{n}$ とすると, $\mathfrak{m}(A \otimes_k k') \subset \mathfrak{n}$ なので矛盾する. ゆえに \mathfrak{n} は $A_{\mathfrak{m}} \otimes_A A \otimes_k k'$ の素イデアルと対応する. $A_{\mathfrak{m}} \otimes_A A \otimes_k k' = A_{\mathfrak{m}} \otimes_k k'$ は正則環なので, その局所化である $(A \otimes_k k')_{\mathfrak{n}}$ も正則である. \mathfrak{n} は任意だったから, $A \otimes_k k'$ は正則である. ♠

次に射に対する regularity の概念などを導入し, G-ring の定義を行う.

Def

$\varphi: A \rightarrow B$ をネーター環の射とする. また, 環に対する条件 \mathbb{P} を考える.

φ が \mathbb{P} であるとは, 任意の $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対して, $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ が体 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上に geometrically \mathbb{P} であるときを言う. 特に, $\mathbb{P} = \text{regular}$ のとき, φ は **regular** であるという.

A が **G-ring** であるとは, 任意の $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対して, 完備化の射 $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}^*$ が regular であるときを言う. □

複雑でわかりにくいので, 射が regular であることの定義をまとめてみると次のようになる.

ネーター環の射 $A \rightarrow B$ が regular であるとは, 任意の素イデアル $\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ と, 任意の有限次拡大 $k'/\kappa(\mathfrak{p})$ に対して, $B \otimes_A k'$ が regular であることを言う.

今述べた形で理解する.

ところで, geometrically regular や射の regularity は, scheme のレベルで定義される. これによればスキームの射が smooth ならば regular である. [4, 07R9]

さて, [Th 32.1](#) を示すときに [1] では定理 23.7 を用いるとある. しかしこれはネーター局所環に対する定理であり, 局所環を外した場合に成立するかはわからない. そこで次の補題を用意し,, これを使って [Th 32.1](#) を示す.

ちなみに次の補題は linksp() における正則環に関する主張の一般化でもある.

Lem

$\varphi : A \rightarrow B$ が regular とする. このとき, A が regular ならば B も regular である. □

(proof)

$\forall P \in \text{Spec}(B)$ をとり, B_P が正則なことを示せばいい. $\mathfrak{p} = P \cap A$ として, $\tilde{\varphi} : A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_P$ という flat な局所環の射が誘導されることが簡単な普遍性の議論などによってわかる. この $\tilde{\varphi}$ も regular であることを示す. $\mathfrak{q} \in \text{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$ を任意にとり $K/\kappa(\mathfrak{q})$ を任意の有限次拡大とする. $S = B \setminus P$ とすれば

$$\begin{aligned} B_P \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} K &= S^{-1}(B_{\mathfrak{p}}) \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} K \\ &= (S^{-1}B)_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} K \\ &= S^{-1}(B \otimes_A K) \\ &= S^{-1}B \otimes_A A_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} K \\ &= S^{-1}B \otimes_A K \\ &= S^{-1}B \otimes_B (B \otimes_A K) \end{aligned}$$

となるが, φ は regular なので $B \otimes_A K$ は正則であり, 正則間の局所化だから $B_P \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} K$ も正則である. ゆえに $\tilde{\varphi}$ は regular である. したがって, 主張はネーター局所環の射である場合に示せばいい. すると, いま, $\varphi : A \rightarrow B$ は flat で A が正則, さらに (\mathfrak{m} を A の極大イデアルとして) $B/\mathfrak{m}B = B \otimes_A A/\mathfrak{m} = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{m})$ より, これは φ の正則性によって正則環. ゆえに定理 23.7 から B も正則である. ♠

Th 32.1

$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ をネーター環の射とする.

- i) もし φ と ψ が regular ならば, $\psi \circ \varphi$ も regular である.
- ii) もし $\psi \circ \varphi$ が regular で, かつ ψ が faithfully flat ならば, φ も regular である.

□

(proof)

- (i) めんどくさいので補足にとどめる. 最後に $\varphi_L : B_L \rightarrow C_L$ という正則な射で B_L が正則環であることがわかる. ここで前の補題を用いて C_L が正則なことを示すことで証明が終了する.
- (ii) φ が flat なのは [1] の 3 章の初めの方を書いてあることを用いればよい. $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ をとり, $L/\kappa(\mathfrak{p})$ を有限次拡大とする. $B_L = B \otimes_A L$ が正則なことを示す. $C_L = C \otimes_A L$ は仮定から正則となり, $B_L \rightarrow C_L$ は faithfully flat なので, B_L も正則である. ♠

最後に用いた, $A \rightarrow B$ が faithfully flat で B が正則ならば A も正則であるという事実を一応示しておく.

⦿ $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ をとり, $A_{\mathfrak{p}}$ が正則であることを示せばいい. 忠実平坦性から, とある $P \in \text{Spec}(B)$ をとって $P \cap A = \mathfrak{p}$ となる. ゆえに $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow B_P$ という平坦な局所環の射が誘導される. これは局所環の射なので忠実平坦でもある. ゆえに, もとから局所環の射だったとしてよい. $\text{gl.dim}(A) < \infty$ を示せばいい. 任意の A 加群 M をとる.

$$\cdots \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

を, M の射影分解とする. P たちは局所環 A 上の射影加群だから自由加群である. これに $\otimes_A B$ をすると, 忠実平坦性と P が自由加群であることから

$$\cdots \rightarrow P_1 \otimes_A B \rightarrow P_0 \otimes_A B \rightarrow M \otimes_A B \rightarrow 0$$

は $M \otimes_A B$ の射影分解になる. B は正則局所環なので $\text{gl.dim}(B) < \infty$ である. したがって, 十分大きい任意の i に対して $P_i \otimes_A B = 0$ である. 忠実平坦性から $P_i = 0$ である. ゆえに射影分解は有限であったから $\text{proj.dim}(M) < \infty$ であり, ゆえに $\text{gl.dim}(A) < \infty$ である.

Serre の定理はすごい.

忠実平坦や regular な射を仮定すると, 正則関係の環 (正則環, CM 環など) に対して良い性質が伝播することがわかる.

Th 32.2

$\varphi: A \rightarrow B$ をネーター環の射で, 忠実平坦かつ regular であるとする.

- i) A が正則環 (または reduced, Gorenstein, CTR, CM 環) であることと, B が同じ性質を持つことは同値である.
- ii) B が G-ring ならば, A も G-ring である. (逆は成立しない.)

□

(proof)

(i) CTR 環以外については, [1] の §23 の定理などからわかる. CTR 環について示す. 局所環の射に帰着できる. [2, Proposition 3.5] によって B が CTR ならば A も CTR である. 逆に A が CTR ならば, 同じく [2, Proposition 3.5] によって, $\forall \mathfrak{p} \in \min\{\text{tr}_R(\omega_R)\}$ に対して $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ が reduced なことを示せばいい. しかし, φ は regular なので, $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ は regular であり, 特に reduced である.

(ii) $\forall \mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)$ に対して $A_{\mathfrak{p}} \rightarrow (A_{\mathfrak{p}})^*$ が regular なことを示す. \mathfrak{p} の上にある B の素イデアルを P とする. すると, 次の可換図式が得られる.

$$\begin{array}{ccc} (A_{\mathfrak{p}})^* & \xrightarrow{f^*} & (B_P)^* \\ \alpha \uparrow & & \uparrow \beta \\ A_{\mathfrak{p}} & \xrightarrow{f} & B_P \end{array}$$

図式のソースは [こちら](#). あとは [Th 32.1](#) によって α が regular なことがわかる. ♠

Th 32.3

完備ネーター局所環は G-ring である.

□

(*proof*)

omit



参考文献

- [1] 松村英之, 可換環論, 復刊. 東京, Japan: 共立出版, 2000.
- [2] M. Miyazaki, 「Radical property of the traces of the canonical modules of Cohen-Macaulay rings」. [Online]. 入手先: <https://arxiv.org/abs/2506.17987>
- [3] J.-i. Nishimura, 「On ideal-adic completion of noetherian rings」, *J. Math. Kyoto Univ.*, vol. 21, no. 1, pp. 153–169, 1981, doi: [10.1215/kjm/1250522110](https://doi.org/10.1215/kjm/1250522110).
- [4] T. Stacks project authors, 「The Stacks project」. 2026 年.