

這份說明書是有關您即將接受的檢查【或醫療處置】的效益、風險及替代方案的書面說明，可做為您與醫師討論的補充資料。最重要的是我們希望您能充份瞭解資料的內容，所以請仔細閱讀；如果經醫師說明後您還有對這個檢查【或醫療處置】的任何疑問，請在簽名前再與您的醫師充分討論，醫師會很樂意為您解答，讓我們一起為了您的健康努力。

一、 病人狀況(適應症)：

- ☐ 腎功能測定
- ☐ 尿路阻塞性疾病之鑑別與診斷
- ☐ 腎性高血壓
- ☐ 腎臟發炎
- ☐ 腎移植前捐腎者與受贈者的腎功能評估
- ☐ 腎移植後追蹤、合併症之鑑別診斷，免疫抑制藥物之腎毒性或是排斥現象
- ☐ 其他_____

二、 建議之醫療處理：

- ☐ 26050 動態腎泌尿功能測定
- ☐ 26071 介入性動態腎泌尿功能測定
- ☐ 其他_____

三、 檢查(處置、治療)之優缺點：(經由檢查，您可能獲得以下所列的效益，但醫師並不保證您獲得任何一項；且檢查效益與風險之間的取捨，應由您決定。)

1. 病況較特殊或危急之受檢者，請事先聯繫本科醫師。
2. 因應檢查需要，易躁動及哭鬧之受檢者必須有家屬陪同以安撫情緒，或是採取鎮靜催眠的方式。
3. 若躁動及哭鬧由家屬安撫仍無效者，經本科醫師評估可能有注射鎮靜劑的需要，以使檢查得以順利進行。
4. 注射藥物後，若無其他需禁食之檢查，則可正常進食，並請盡量多喝水多排尿，以降低身體所接受之輻射劑量。

四、 替代方案：(這個檢查【或醫療處置】的替代方案如下，如果您決定不施行這個檢查【或醫療處置】，可能會有危險，請與醫師討論您的決定。)

- 可能替代方案
- ☐ 24小時連續尿液測定肌酸甘廓清率
 - ☐ 其他_____

五、 成功的可能性：沒有任何檢查【或醫療處置】是完全沒有風險的，以下所列的風險已被認定，但是仍然可能有一些醫師無法預期的風險未列出。

六、 檢查(處置、治療)後可能面對的問題：

1. 注射之同位素含有小量放射性，因其含量甚低，幾乎不會增加致癌機率，也不會增加不孕或後代異常的風險。檢查後多喝水多排尿可加速輻射劑量排出，但心臟衰竭或洗腎病人不宜。
2. 特殊體質者可能出現紅疹、畏寒、噁心、嘔吐、氣喘及暈眩等症狀，其發生率小於十萬分之六。

七、 不同意檢查(處置、治療)的後果：

無法評估病變位置與周遭組織的相關性，間接影響後續的治療計畫。

八、 檢查(處置、治療)內容：

1. 檢查當日請病人多喝水。
2. 請受檢者依約定時間準時至核子醫學科櫃檯報到。
3. 量病人身高、體重。
4. 檢查前請病人先上過廁所小便解乾淨再開始做檢查。(檢查中會注射利尿劑，請病人務必去上廁所)。
5. 檢查全程約需 30-40 分鐘，如無法靜躺可使用少量鎮定劑。
6. 靜脈注射後 15 分鐘會注射利尿劑。

7. 為避免對影像結果造成誤判，受檢者身上所有的外來物件（包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品）掃描前需先取出。
8. 造影檢查過程並不會痛苦，掃描過程請儘量不要動，以提高影像品質。
9. 得到病人或家屬簽字同意始開始進行造影檢查。

說明醫師： _____

西元 20____年____月____日____時____分

本人（或家屬）已經與醫師討論過接受這個檢查【或醫療處置】的效益、風險及替代方案，本人對醫師的說明都已充分了解，並且保有此資料副本一份。

病患（或家屬）： _____ （簽章）與病人之關係： _____

西元 20____年____月____日____時____分