CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

DOI: 10.55905/cuadv17n2-071

Receipt of originals: 1/17/2025
Acceptance for publication: 2/10/2025

A Dengue no Brasil com ênfase nos aspectos raciais

Dengue in Brazil with emphasis on racial aspects

Dengue en Brasil con énfasis en los aspectos raciales

Renan Vitor de Almeida Luz
Bacharel em Enfermagem
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)
Endereço: R. Antônio Macedo, 505, Parque São Jorge, São Paulo - SP, CEP: 03087-010
E-mail: renanluz633@gmail.com

Vitória Gazola Pereira
Bacharel em Enfermagem
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)
Endereço: R. Antônio Macedo, 505, Parque São Jorge, São Paulo - SP, CEP: 03087-010
E-mail: vitoriagazolap@outlook.com

Gisele Cristina Gomes Clementino
Bacharel em Enfermagem
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)
Endereço: R. Antônio Macedo, 505, Parque São Jorge, São Paulo - SP, CEP: 03087-010
E-mail: giselecgomesc@gmail.com

Yasmin Soares de Souza
Bacharel em Enfermagem
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)
Endereço: R. Antônio Macedo, 505, Parque São Jorge, São Paulo - SP, CEP: 03087-010
E-mail: yasmimsouza2032@gmail.com

Adriano Aparecido Bezerra Chaves
Doutor em Ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (EEUSP)
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)
Endereço: R. Antônio Macedo, 505, Parque São Jorge, São Paulo - SP, CEP: 03087-010
E-mail: adriano.chaves2@docente.unip.br

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Roudom Ferreira Moura
Doutor em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSPUSP)
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Endereço: R. Antônio Macedo, 505, Parque São Jorge, São Paulo - SP,
CEP: 03087-010
E-mail: roudom.moura@docente.unip.br

RESUMO
Introdução: A dengue é uma doença febril, aguda e com grande potencial de evoluir para quadros graves. Originada por um arbovírus, é transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypt. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da dengue no Brasil com ênfase nos aspectos raciais. Método: Estudo ecológico descritivo. Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, envolvendo as notificações de casos prováveis de dengue no Brasil entre os anos de 2014 e 2021. Resultados: Os dados mostram que os anos de 2015 e 2019 foram marcados por epidemias significativas de dengue no Brasil, entretanto foi identificado limitação na pesquisa, no que diz respeito ao não preenchimento do campo “raça/cor” em grande parte das notificações. Conclusão: O estudo constata que a população negra foi a mais impactada durante a epidemia de 2019. No entanto, a ausência do preenchimento do campo "raça/cor" nas notificações limitou uma análise mais aprofundada em outros cenários. São necessárias estratégias mais inclusivas e assertivas a respeito da coleta de dados e preenchimento do campo “raça/cor” das notificações.

Palavras-chave: dengue, infecções por arbovírus, racismo, epidemiologia, responsabilidade socioambiental.

ABSTRACT
Introduction: Dengue is an acute febrile disease with significant potential to develop into severe cases, caused by an arbovirus and primarily transmitted by the Aedes aegypti mosquito. Objective: To describe the epidemiological profile of dengue in Brazil, emphasizing racial aspects. Method: A descriptive ecological study using data from the Notifiable Diseases Information System, analyzing reports of probable dengue cases in Brazil between 2014 and 2021. Results: The analysis revealed significant dengue epidemics in 2015 and 2019, although a key limitation was the frequent omission of the "race/color" field in the notifications. Conclusion: The Black population was identified as the most affected during the 2019 epidemic, but the incomplete "race/color" data limited deeper analysis in other contexts, underscoring the need for more inclusive and precise data collection strategies.

Keywords: dengue, arbovirus infections, racism, epidemiology, socioenvironmental responsibility.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

RESUMEN
La dengue es una enfermedad febril aguda con un alto potencial de evolucionar a casos graves, causada por un arbovirus y transmitida principalmente por el mosquito Aedes aegypti. Objetivo: Describir el perfil epidemiológico del dengue en Brasil con énfasis en los aspectos raciales. Método: Estudio ecológico descriptivo. Los datos se obtuvieron del Sistema de Información de Agravios de Notificación, que incluye los reportes de casos probables de dengue en Brasil entre los años 2014 y 2021. Resultados: Los datos muestran que los años 2015 y 2019 estuvieron marcados por epidemias significativas de dengue en Brasil; sin embargo, se identificó una limitación en la investigación debido al frecuente no llenado del campo “raza/color” en gran parte de las notificaciones. Conclusión: El estudio constató que la población negra fue la más afectada durante la epidemia de 2019. No obstante, la ausencia de información en el campo “raza/color” limitó un análisis más profundo en otros contextos. Se requieren estrategias más inclusivas y efectivas para la recolección de datos y el llenado adecuado del campo “raza/color” en las notificaciones.

Palabras clave: dengue, infecciones por arbovirus, racismo, epidemiología, responsabilidad socioambiental.

1 INTRODUÇÃO

A dengue é uma doença febril, aguda, dinâmica e sistêmica causada por um arbovírus, transmitido pela picada de artrópodes hematófagos da família Flavivírus e possui como principal vetor a fêmea do mosquito Aedes aegypt (Yuill, 2023).

Atualmente, é de conhecimento público a existência de quatro sorotipos do vírus da dengue. Em termos de virulência, definida como a capacidade do vírus de replicar-se no hospedeiro e evoluir para a doença, a ordem do mais para o menos virulento, classifica as variantes do vírus da dengue como DENV-2, DENV-3, DENV-4 e DENV-1 (Lemos et al., 2023).

Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), agrupados pelo Ministério da Saúde no Painel de Monitoramento das Arboviroses, em 2024, durante as primeiras 19 semanas, houve 4.921.252 casos prováveis de Dengue no Brasil (Brasil, 2024a).

Fatores como falta de saneamento básico, acesso limitado à informação e condições de moradia precárias em comunidades marginalizadas condicionam

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

pessoas pretas e pardas a uma maior vulnerabilidade da doença (Brasil, 2024a; PNUD, 2024).

Desse modo, diante das desigualdades estruturais observadas, torna-se relevante considerar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) como uma métrica para avaliar o impacto das condições sociais na proliferação de doenças. O IDH é uma medida composta que avalia o desenvolvimento social e econômico dos países, considerando três dimensões principais: longevidade (expectativa de vida), educação (escolaridade) e renda per capita (PNUD, 2024).

Além do racismo ambiental, é fundamental reconhecer o racismo institucional, também conhecido como sistêmico, como um determinante estrutural das desigualdades enfrentadas por comunidades vulneráveis e subordinadas. O racismo institucional refere-se às práticas e políticas que, mesmo sem intenção explícita de discriminação, resultam em desigualdade racial e limitam o acesso de grupos marginalizados a recursos essenciais, como saúde, educação e serviços públicos (Brasil, 2024b).

Essas injustiças são frequentemente observadas em comunidades negras e outras marginalizadas, influenciadas por condições climáticas e ambientais adversas que podem ser determinantes quanto ao desenvolvimento de doenças em determinadas parcelas da sociedade (Chagas, 2023).

Tendo em vista tais premissas, este estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico da dengue no Brasil com ênfase nos aspectos raciais.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo ecológico descritivo. Foram utilizados os dados secundários do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) sobre os casos prováveis de dengue (casos confirmados e em investigação) no Brasil entre 2014 e 2021.

As variáveis principais incluíram casos prováveis de dengue por raça/cor. A análise abrangeu todo o território brasileiro, considerando as cinco regiões do país e para realização dos indicadores de saúde, foram utilizados dados do

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) referente a números totais e projeções que dizem respeito ao período de 2014 a 2021 no site https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html?=&t=resultados (projeção da população por sexo e idades simples, em 1º de julho - 2010/2060). Foram calculadas taxas de incidências dos casos prováveis de dengue por 100 mil habitantes por ano, média anual por região e IDH médio. Além disso, foram confeccionados gráficos dos casos prováveis de dengue anual e por região de residência, ambos segundo raça/cor. Para análise de correlação, foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson (r).


Os dados foram organizados em planilhas do Microsoft Excel (versão 2024) e apresentados em gráficos.

Como foram utilizadas fontes públicas (SINAN e IBGE) sem identificação individual, não houve necessidade de aprovação por Comitê de Ética, conforme a Resolução nº 510/2016. (Brasil, 2016).

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 1. Distribuição de taxa de incidência (100.000 hab.) de casos prováveis de dengue. Brasil, 2014- 2021.




Fonte: SINAN (2014 – 2021), atualizado em 12/11/2024; IBGE (2014-2021).

A figura 1 destaca um aumento substancial de casos prováveis de dengue em 2015 e 2019, elevando a taxa de incidência para 1.674,6 e 1.486,0 para cada 100.000 habitantes, respectivamente.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Figura 1. Distribuição de taxa média de incidência (100.000 hab.) de casos prováveis de dengue e IDH médio do período por região. Brasil, 2014-2021.




Fonte: SINAN (2014 – 2021), atualizado em 05/11/2024; IBGE (2014-2021).

A figura 2 destaca a região Sul com a menor média da taxa de incidência de casos prováveis de dengue por 100.000 habitantes no período (209,2), além de possuir a maior média de IDH (0,796). O coeficiente de correlação de Pearson (r), apresentou um resultado de P = 0,256, indicando uma correlação fraca entre incidência de dengue e IDH médio no Brasil.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Figura 2. Distribuição dos casos prováveis de dengue, segundo raça/cor. Brasil, 2014-2021.




Fonte: SINAN (2014 – 2021), atualizado em 22/10/2024.

A figura 3 mostra que os casos ignorados ou em branco se destacaram entre 2014 e 2016. Em 2019, houve aumento da contaminação por dengue entre pessoas da raça negra (preta/parda).

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Figura 4. Distribuição dos casos prováveis de dengue por região de residência e raça/cor. Brasil, 2014-2021.



Fonte: SINAN (2014 – 2021), atualizado em 03/11/2024.

A figura 4 evidencia que no Nordeste, 26% dos casos ocorreram em pretos/pardos, enquanto o Norte e o Centro-Oeste apresentam 18% e 30% em indígenas, respectivamente. Percentuais expressivos de ignorados/em branco foram registrados no Nordeste e Sudeste.

O cenário da dengue no Brasil passou por mudanças representativas ao longo dos anos, destacando o crescimento de casos em 2015 e 2019. Em 2015, o país enfrentou uma intensificação da crise de dengue, especialmente durante as estações chuvosas, o que levou a população a adotar práticas alternativas de armazenamento de água, utilizando reservatórios que não estavam conectados à rede, como baldes (Diniz, 2018).

Esses reservatórios tornaram-se criadouros consideráveis para o mosquito Aedes aegypti, principalmente na primavera e no verão, com isso, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESB) distribuiu

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

caixas d'água para diminuir criadouros, mas sem inspeção adequada, ainda houve desafios (Diniz, 2018).

Assim, a combinação de métodos inadequados de armazenamento de água e as condições climáticas favoráveis à reprodução do mosquito agravaram a crise de dengue em 2015 (Diniz, 2018).

Nos anos de 2017 e 2018, a incidência de casos de dengue foi consideravelmente menor, o que pode ter relação com a predominância do DENV-1, que gerou uma maior imunidade na população. Portanto, a redução da vulnerabilidade ao sorotipo 1 colaborou para a queda dos números de casos de dengue no Brasil em 2017 e 2018 (Carrera, 2019).

Ainda assim, a introdução do sorotipo DENV-2 em 2019 alterou esse cenário, resultando em uma nova epidemia de dengue no Brasil. Além do novo sorotipo, causas como o aquecimento global, a urbanização e o desmatamento também favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti (Carrera, 2019).

O aumento da temperatura e da umidade facilita a reprodução do mosquito, enquanto a pobreza e a urbanização contribuem para o acúmulo de água em locais inadequados (Carrera, 2019).

Explorando a associação direta do vetor da dengue e a proliferação da doença no Brasil, subentende-se que, quanto mais facilitado é a proliferação do mosquito devido a fatores ambientais que vão além das barreiras socioeconômicas, maior será a incidência da doença (Brasil, 2024c).

Concomitante a isso, a região centro-oeste, possuindo a maior taxa de incidência de casos prováveis de dengue no período estudado, emite a presença expressiva da doença em um local com significativas alterações climáticas e ambientais nas últimas décadas, fenômeno que é associado justamente com o aumento do vírus da dengue (Damtew et al., 2023).

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação (MCTI), o centro-oeste brasileiro, entre os anos 1980-2021, apresentou um aumento de temperatura superior à média global, de até 0,5°C por década (Brasil, 2022).

A associação da maior incidência do país no período de 2014-2021 (892,9 a cada 100.000 pessoas), com o aumento progressivo da média de temperatura

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

no centro-oeste brasileiro, corrobora com o argumento de alguns autores, como, por exemplo, Yohannes Tefera Damtew, sinalizando a relação do maior aparecimento da doença de acordo com o aumento da temperatura média de uma região (Damtew et al., 2023).

Portanto, a correlação fraca entre IDH médio do período por região e a taxa média de incidência (100.000 hab.), sinaliza uma dificuldade da análise socioeconômica somente a partir dessas variáveis, visto que a dengue passa por períodos de mudança paralelos ao meio ambiente e fatores influentes na proliferação de seu vetor, como a vulnerável infraestrutura que a desestruturada urbanização promove e falta de saneamento básico adequado (Lima; Corrêa; Uehara, 2024).

Os resultados do estudo revelaram uma defasagem nas notificações no que se refere ao preenchimento do quesito raça/cor entre os anos 2015 e 2016, esse fato faz alusão sobre o problema do racismo dentro da sociedade brasileira. Werneck (2016, p. 540, 541), acrescenta em seu artigo sobre racismo institucional que:

> Os dados epidemiológicos desagregados segundo raça/cor são consistentes o suficiente para indicar o profundo impacto que o racismo e as iniquidades raciais têm na condição de saúde, na carga de doenças e nas taxas de mortalidade de negras e negros de diferentes faixas etárias, níveis de renda e locais de residência.

O racismo Institucional que abrangem organizações, políticas, práticas e normas resultam em tratamentos e resultados desiguais, também é conhecido como racismo sistêmico que exclui seletivamente os grupos racialmente subordinados, induzindo e condicionando a ação do Estado, suas instituições e políticas públicas – atuando também nas instituições privadas – produzindo e reproduzindo a hierarquia racial (Werneck, 2016).

A Portaria nº 344 de 2017 tornou obrigatório o preenchimento do campo raça/cor, contribuindo para dados mais completos, que:

> Torna obrigatório o preenchimento do quesito raça/cor por todos os profissionais atuantes nos serviços de saúde de forma a respeitar o

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

> critério de autodeclaração do usuário de saúde, dentro dos padrões utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que constam nos formulários dos sistemas de informações da saúde como branca, preta, amarela, parda ou indígena (Brasil, 2017).

Porém, mesmo após a publicação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), formalizada pela Portaria GM/MS nº 992 de 13 de maio de 2009, os dados do censo de 2022 do IBGE indicaram a persistência de desigualdades estruturais que agravam a vulnerabilidade socioeconômica da população preta e parda no Brasil. Observou-se que o acesso a bens e serviços fundamentais para o bem-estar — como saúde, educação, habitação, emprego e renda — permaneceu significativamente desigual, reiterando a continuidade de disparidades históricas e sistêmicas que desafiam a efetivação de políticas de equidade social (IBGE, 2022).

Também é possível observar padrões distintos em diferentes áreas geográficas e associar os dados às questões sociais e demográficas que podem influenciar os resultados.

Na região Norte e Centro-Oeste: Indígenas são a maioria no percentual de contaminação por dengue, sendo levantadas as seguintes questões:

Muitas comunidades indígenas residem em áreas remotas, o que dificulta o acesso regular e eficiente aos serviços de saúde. A infraestrutura de transporte e comunicação é limitada, o que torna o envio de profissionais e a realização de campanhas preventivas mais complicadas (IBGE, 2023).

O garimpo também contribui para a proliferação de doenças nas terras indígenas, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, pois degrada o ambiente, propiciando a reprodução do mosquito, deixando a população indígena em estado de vulnerabilidade (Porto; Rocha, 2022).

Além disso, as aldeias muitas vezes não dispõem de saneamento básico adequado, o que favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Segundo o Censo 2022, a raça indígena apresenta o percentual mais baixo de conexões de redes de saneamento básico, com 29,9% (IBGE,2022).

Existem algumas organizações e políticas voltadas para a população indígena como Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS, 1999),

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI, 2002) e Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI, 2010) que visam diferenciar e especificar as ações e serviços de saúde da comunidade indígena, levando proteção, promoção e recuperação da saúde (Brasil, 1999, 2002, 2010).

Apesar da existência de organizações como citadas anteriormente, a distribuição de recursos e profissionais especializados não supre a demanda da comunidade, apesar dos esforços para a melhoria, há uma combinação de fatores como o isolamento geográfico, falta de infraestrutura e limitações no saneamento básico acabam por contribuir com a vulnerabilidade dessa população à dengue (Cunha et al., 2023).

Em relação a raça/cor negra, a porcentagem de contaminação é predominantemente maior na região do Nordeste, e também, quantitativamente é a mais declarada na região. Os resultados são proporcionais entre a porcentagem e a população total (IBGE, 2022).

Entretanto, pesquisas em solo brasileiro revelam que as regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas pela falta de distribuição e manutenção de saneamento básico. De acordo com Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS), as macroregiões Norte e Nordeste apresentam abastecimento de água em 58,9% e 74,9%, respectivamente, ao passo que no Centro-Oeste, Sul e Sudeste os índices são de 90,9%, 91,0% e 91,3%, respectivamente (Brasil, 2023).

Esses fatores evidenciam um cenário de racismo ambiental, no qual a degradação ambiental, a infraestrutura insuficiente e a falta de acesso adequado aos serviços de saúde impactam desproporcionalmente as populações indígenas e negras. Esse fenômeno reflete desigualdades históricas e estruturais, que ocorreram desde a era colonial, que, ao desconsiderar as necessidades específicas desses grupos, perpetuam condições de vulnerabilidade e limitam seu direito ao bem-estar e à saúde (Carvalho, 2021; Jesus, 2020).

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

4 CONCLUSÃO

A dengue é uma doença cíclica com elevado potencial epidêmico no território brasileiro, impactando uma grande parcela da população, especialmente os grupos mais vulneráveis, que sofrem com o acesso insuficiente ao saneamento básico e aos serviços de saúde.

O presente estudo evidenciou que no cenário epidêmico de 2019, a população preta/parda foi a mais afetada. Entretanto, que diz respeito ao acaso circunstancialmente similar de 2015, a análise sobre a incidência de casos prováveis por raça/cor foi afetada pela defasagem no preenchimento do campo de “raça/cor” nas notificações do SINAN.

Entretanto, mesmo com a impossibilidade de apontar uma correlação entre raça/cor com as notificações de casos prováveis de dengue com os dados disponíveis no período estudado, há, também, o indicativo de que pessoas da raça negra são proporcionalmente mais condicionadas, historicamente, a condições sociais, físicas e ambientais mais degradantes em relação a outras raças no Brasil, devido ao advento do racismo estrutural e suas ramificações.

De forma semelhante, o levantamento elucidou que as condições desiguais em terras indígenas refletem uma complexa interação de fatores, como o isolamento geográfico, a falta de condições sanitárias e a deterioração ambiental causada pelo garimpo. Esses elementos evidenciam o racismo ambiental, ao expor as comunidades indígenas a riscos adicionais e perpetuar um ciclo de vulnerabilidade e marginalização que compromete o direito desses povos a um ambiente seguro e saudável.

Ademais, a análise a ser feita a partir do IDH para identificação de correlação com a incidência de casos, mostra-se, neste quesito, ineficaz, uma vez que a dengue é uma doença que ultrapassa as barreiras analisadas pelo índice. Entretanto, há o direcionamento em que as condições sociais e ambientais nas quais um indivíduo se encontra estão diretamente ligadas à sua situação econômica.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de novos estudos que avaliem a conformidade no preenchimento das fichas de envio compulsório, considerando que o preenchimento do quesito "raça/cor" se tornou obrigatório desde 2017.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999. Acrescenta dispositivos à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que "dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", instituindo o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. Brasília, DF: Presidência da República, 1999. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9836.htm. Acesso em: 7 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas Fundação. Brasília, Fundação Nacional de Saúde, 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf. Acesso em: 7 de out. 2024.

BRASIL. Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), 2010. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sesai. Acesso em: 7 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n° 510. dispõe sobre as normas regulamentares a Resolução pesquisas em Ciências Humanas e Sociais , 7 abr. 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html . Acesso em: 2 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde Conselho Nacional de Saúde. Portaria nº 344, de 1º de fevereiro de 2017. Dispõe sobre o preenchimento do quesito raça/cor nos formulários dos sistemas de informação em saúde ,1 fev. 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0344_01_02_2017.html. Acesso em: 2 conjuntos. 2024.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mudança do clima: aumento das temperaturas e redução das chuvas são observadas e projetadas no Centro-Oeste. 03 nov. 2022 Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2021/09/mudanca-do-clima-aumento-das-temperaturas-e-reducao-das-chuvas-sao-observadas-e-projetadas-no-centro-oeste. Acesso em: 28 out. 2024

BRASIL. Ministério das Cidades. Panorama do saneamento básico do Brasil, 2023. Disponível em: https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/snis/produtos-do-snis/panorama-do-saneamento-basico-do-brasil. Acesso em: 27 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação. SINAN Brasília, 2024a DF: Ministério da Saúde. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/denguebbr.def. Acesso em: 10 set. 2024.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Racismo institucional: uma barreira invisível à igualdade. 01 de jul. 2024b. Disponível em: https://www.tre-al.jus.br/comunicacao/noticias/2024/Julho/racismo-institucional-uma-barreira-invisivel-a-igualdade#:~:text=Trata%2Dse%20de%20uma%20forma,perpetuando%20desigualdades%20de%20maneira%20estrutural. Acesso em: 27 out. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Monitoramento das arboviroses. 17 mai. 2024c. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aedes-aegypti/monitoramento-das-arboviroses. Acesso em: 19 de maio de 2024.

CARRERA, Marília. Re–emergência do Sorotipo 2 do Vírus da Dengue no Brasil é um dos Responsáveis pelo Aumento de 600% dos Casos da Doença no País. Laboratórios de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. p. 1, 17 dez. 2019. Disponível em: https://limhc.fm.usp.br/portal/entrada-de-novo-grupo-de-virus-da-dengue-no-brasil-e-um-dos-responsaveis-pelo-aumento-de-600-dos-casos-da-doenca-no-pais/. Acesso em: 10 out. 2024.

CARVALHO, Marcos Bernardino de. Racismo ambiental é uma realidade que atinge populações vulnerabilizadas. Jornal da USP, 9 dez. 2021. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/racismo-ambiental-e-uma-realidade-que-atinge-populacoes-vulnerabilizadas/. Acesso em: 27 out. 2024.

CHAGAS, Michelle (ed.). Enfrentando a Dengue nas Favelas e Periferias: E-book. Rio de Janeiro, RJ: Infodengue, 2023. E-book (27p.) ISBN: 978-85-5722-663-0. Disponível em: https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=palavra-chave-de-documentos/enfrentando-dengue-nas-favelas-e-periferias. 10/03/2023. Acesso em: 11 mar. 2024.

CUNHA, Maria Luiza Silva; CASANOVA, Angela Oliveira; CRUZ, Marly Marques et al. Planejamento e gestão do processo de trabalho em saúde: avanços e limites no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. Saúde e Sociedade, v. 27, n. 1, p. 130-144, 2023. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sausoc/a/bxbwqr5yK4VXZYhshXtpttN/. Acesso em: 7 out. 2024.

DAMTEW, Yohannes Tefera et al. Effects of high temperatures and heatwaves on dengue fever: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, [S. l.], v. 91, n. 104582, 21 abr. 2023. eBioMedicine, p. 1-14. DOI 104582. Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/ebiom/article/PIIS2352-3964(23)00147-0/fulltext. Acesso em: 13 nov. 2024.

DINIZ, Patrícia Placoná. Vigilância entomológica de vetores de arbovírus na cidade de São Paulo: Análise espaço temporal de criadouros, de acordo com

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

fatores sazonais e socioeconômicos, no período de 2012 a 2016. São Paulo. Tese para Doutorado USP 2018. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6132/tde-10072018-122912/publico/PatriciaPlaconaDinizREVISADA.pdf. Acesso em: 15 de outubro de 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil. Estudos e Pesquisas: Informação Demográfica e Socioeconômica, ed. 2, p. 01-16, 2022. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101972_informativo.pdf. Acesso em: 28 out. 2024.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil tem 1,7 milhão de indígenas e mais da metade deles vive na Amazônia Legal. Agência de Notícias IBGE, 2023. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37565-brasil-tem-1-7-milhao-de-indigenas-e-mais-da-metade-deles-vive-na-amazonia-legal. Acesso em: 7 out. 2024.

JESUS, Victor de. Racializando o olhar (sociológico) sobre a saúde ambiental em saneamento da população negra: um continnum colonial chamado racismo ambiental. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 29, n.2, DOI: 10.1590/S0104-12902020180519, 2020. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sausoc/a/5LRzfP3sP8kCDbhnJy6FkDH/. Acesso em: 27 out. 2024

LEMOS, Elba Regina Sampaio de et al. Arboviroses com Ênfase nas Transmitidas por Mosquitos. In Tópicos em Virologia (Online). Rio de Janeiro: FioCruz, 2023. cap. 07, p. 242-246. ISBN 978- 65-5708-151-8. Disponível em: https://books.scielo.org/id/5bhdb/pdf/lemos-9786557082119.pdf. Acesso em: 15 abr. 2024.

LIMA, Anete Medeiros de; CORRÊA, Ana Paula de Vechi; UEHARA, Silvia Carla da Silva André. Influência dos indicadores socioeconômicos na distribuição dos casos suspeitos de dengue no município de São Carlos-SP. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, p. 1-18, 22 abr. 2024. DOI https://doi.org/10.1590/S0103-7331202434009pt. Disponível em: https://www.scielo.br/j/physis/a/96N3PHJwRMczY6xZFNj7xvn/?lang=pt. Acesso em: 13 nov. 2024.

PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 25 anos : desenvolvimento humano no Brasil : Construir caminhos, pactuando novos horizontes. 1. ed. Brasilia, 2024. 78 p. ISBN 978-85-88201-72-9. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil/publications/relatorio-especial-2023-25-anos-desenvolvimento-humano-no-brasil. Acesso em: 25 out. 2024.

CUADERNOS DE EDUCACIÓN Y DESARROLLO
Europub European Publications
ISSN: 1989-4155

PORTO, Marcelo Firpo de Souza; ROCHA, Diogo. Neoextrativismo, garimpo e vulnerabilização dos povos indígenas como expressão de um colonialismo persistente no Brasil. Saúde em Debate, v. 46, n. 133, p. 487-500, 2022. DOI: 10.1590/0103-1104202213317. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sdeb/a/6HXzdpDBsqYQsjxXS6qFVmr/?format=pdf&lang=pt&utm_source. Acesso em: 12 out. 2024.

WERNECK, Jurema. Racismo institucional e saúde da população negra: Institutional racism and black population health. Saúde E Sociedade, p. 535-549, 19 jul. 2016. DOI: doi.org/10.1590/S0104-129020162610. Disponível em: https://www.scielo.br/j/sausoc/a/bJdS7R46GV7PB3wV54qW7vm/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 21 out. 2024.

YUILL, Thomas M. Febre hemorrágica da dengue/síndrome do choque da dengue. University of Wisconsin-Madison: Manuais MSD edição para profissionais, 2023. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doenças-infecciosas/arbovírus-arenavírus-e-filovírus/febre-hemorrágica-da-dengue-síndrome-do-choque-da-dengue. Acesso em: 15 abr. 2024.