

Afideo da Banana

Pentalonia nigronervosa



Os pulgões da banana escondidos entre as folhas e o pseudosserto (Scot Nelson)



P. nigronervosa colonia (Scot Nelson)



Formigas que protegem uma colônia de pulgões da banana (Scot Nelson)

Prevenção	Monitoramento	Controle direto
• Use somente material de plantação limpo • Remova hospedeiros alternativos, como cocoyam, taro, gengibre, cardamomo, da plantação e dos arredores • Incentive a presença de inimigos naturais, como coccinélídeos, moscas sirfídeas e crisopas na plantação, reduzindo a quantidade de produtos químicos usados	• Monitore regularmente durante condições moderadas de umidade e temperatura (20-25 °C) entre folhas e pseudocaulos e na base de folhas jovens para pequenos pulgões oval vermelhos ou quase pretos • Durante os períodos chuvosos, colônias densas são encontradas em torno das bases dos pseudocaulos perto do nível do solo (até 7-8 cm abaixo da superfície do solo) • Afides às vezes são encontrados em frutas • Procure sinais de presença de pulgão: • Os danos causados por grandes colônias causam descolorações, acúmulo de melharuco e crescimento de mofo de fuligem em toda a planta e manchas de frutas • As folhas podem ser enroladas ou dobradas e mostrar áreas necróticas • As colônias são muitas vezes protegidas por formigas e podem estar escondidas em estruturas de barro perto do nível do solo, feitas por formigas • O pulgão de banana é um vetor do vírus da banana bunchy top (BBTV). Se os pulgões forem encontrados na plantação, observe cuidadosamente os sintomas da BBTV nos próximos 25 dias.	• Se disponível, liberte parasitoides, como <i>Lysiphlebus testaceipes</i>, <i>L. Fabarum</i>, <i>Ephedrus cerasicola</i>, <i>Aphidius</i> spp. ou <i>Aphelinus</i> spp.

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a sua utilização.