


그동안 국소 진행성/전이성 요로상피암의 최적의 1차 치료 옵션에 대한 고민은 지속되었습니다.¹



국소 진행성/전이성 요로상피암의 1차 치료 결정은 매우 중요합니다.¹⁻⁴

16.2개월*

지난 수십년 동안 백금기반 화학요법은 OS 연장에 한계가 있음에도 불구하고 1차 표준치료로 사용되었습니다.²

국소 진행성/전이성 요로상피암 환자 중 50% 미만의 환자만이 2차 치료를 받기 때문에 1차 치료 선택이 중요합니다.^{†,3,4}



파드셉®(엔포투맙베도틴)+펨브롤리주맙 병용요법은 백금기반 화학요법 대비 mOS 및 mPFS가 약 2배 연장되었으며, 임상을 통해 안전성 프로파일을 확인하였습니다.¹

국소 진행성/전이성 요로상피암 환자를 대상으로 진행된 파드셉®+펨브롤리주맙 1차 병용요법의 효과 및 안전성을 확인한 연구(EV-302)가 궁금하시다면?



ESMO, EAU 및 NCCN 가이드라인에서
국소 진행성/전이성 요로상피암의 새로운 1차 치료로
파드셉®+펨브롤리주맙 병용요법을 권장하고 있습니다.⁵⁻⁷

파드셉® INDICATION⁸

1. 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 1차 치료로서 펨브롤리주맙과의 병용요법
2. 단독요법으로 이전에 PD-1 또는 PD-L1 억제제 및 백금기반 화학요법제의 치료 경험이 있는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암 성인 환자의 치료

*Based on a retrospective UK-based study looking at real-world outcomes in 216 patients diagnosed with LA or mUC between 2003 and 2017.²

†Based on 2 studies: (1) an observational study evaluating treatment patterns and clinical outcomes of 4,757 patients who were diagnosed with LA/mUC from May 2016 to April 2021 with data in the Flatiron Database, and (2) a retrospective, longitudinal cohort study (N=803) that included all patients ≥18 years old diagnosed with de novo LA/mUC within the province of Alberta, Canada, between 1 January 2015 and 31 December 2019.^{3,4}

LA, locally advanced; mOS, median overall survival; mPFS, median progression-free survival; mUC, metastatic urothelial cancer; OS, overall survival.

References 1. Powles T, et al. *N Engl J Med*. 2024;390(10):875-888. 2. Cheeseman S, et al. *Front Oncol*. 2020;10:167. 3. Alimohamed N, et al. *Curr Oncol*. 2022;29(10):7587-7597. 4. Morgans AK, et al. *Urol Oncol*. 2023;41(8):357. 5. Powles T, et al. *Ann Oncol*. 2024;35(6):485-490. 6. European Association of Urology. EAU Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma. <https://d56bochluxqnz.cloudfront.net/documents/full-guideline/EAU-Guidelines-on-Upper-Urinary-Tract-Urothelial-Carcinoma-2024.pdf>. Last accessed Jul 2024. 7. NCCN Guidelines®. Bladder Cancer. Version 4.2024-May 9, 2024. 8. 파드셉®주 제품설명서

파드셉®주 20 mg(엔포투맙베도틴)

파드셉®주 30 mg(엔포투맙베도틴)

메일 수신을 원치 않으시면, [수신거부](#)를 눌러 주세요. (If you don't want to receive this e-mail anymore, [click here](#))
개인보호정책에 대해서는 우측 링크를 방문하여 확인 하실 수 있습니다. [개인정보처리방침](#)

한국아스텔라스제약(주)의 제품 사용으로 이상사례가 발행한 경우에는 해당 사항을 한국아스텔라스제약(주) 의약품 안전정보 담당 부서 (010-5254-3389)에 보고하여 주시기 바랍니다.

제품에 대한 문의사항이 있으신 경우 아래 전화번호 또는 이메일로 연락 주십시오.

전화: (02)3448-0504 (대표전화) / 080-920-5388 (수신자 부담) 이메일: medinfo.kr@kr.astellas.com



한국아스텔라스제약(주) (06164) 서울특별시 강남구 테헤란로 521 파르나스타워 7층 Tel. 02-3448-0504
Fax. 02-3448-0510

MAT-KR-PAD-2024-00056