

Proteins are considered to provide.... 

10-15% of total energy ☐

50% of total energy ☐

25-35% of total energy ☒

<10% of total energy ☐

77 برای بررسی وضعیت دریافت پروتئین در سالمندان کدام مورد بهتر است؟

☒ سطح آلبومین سرمی

☐ محاسبه درصد توده لخم بدنی آنها

☐ سطح گلبولین خون

☐ محاسبه دریافت انرژی روزانه چون انرژی و پروتئین بهم وابسته اند

4. از کاربرهای اسیدهای آمینه غیر ضروری در بدن؟

☐ تولید آمونیاک

☐ ذخیره در کبد برای شرایط گرسنگی

☐ ذخیره بصورت پروتئین و افزایش وزن

☒ ورود به گلوکونئوژنز

4. کدام اندیس زیر بهتر خطر بیماریهای قلبی را ارزیابی میکند؟

ارزیابی الگوی غذایی فرد و عادات غذایی ☐

WC ☐

BMI ☐

BMI و WHR ☒

برجسته شدن محل اتصال دنده ها به جناغ سینه شبیه دانه های تسبیح در کدام بیماری دیده می شود؟

- ☐ بری بری
- ☐ ماراسموس
- ☒ راشیتیزم
- ☐ کم خونی فقر آهن

انتخاب برای برگشت به صفحه (1 از 3)

صفحه : 6 از 30

مرور پاسخ ها

صفحه بعدی >

7. کدام گزینه زیر بیشتر در دفع کلاسترول از اوله گوارشی نقش دارد؟

☐ لاکتوز

☐ لیگنین

☒ بیٲٲون

☐ همی سلولز

نام آزمون دهنده:



00:22:39

زمان مانده:

اصول کلی تغذیه

عنوان آزمون:

6. مهمترین علت کاهش نیاز به انرژی دریافتی در سالمندان

☐ افزایش وزن در سالمندی خطرناک است

☐ کاهش وزن است

☐ بی تحرکیست

☒ کاهش توده لخم و عضلاتیست

صفحه : 0 از 0

→ صفحه بعدی

8. درمورد تغذیه سالمندان کدام گزینه صحیح است؟

✓ بدلیل کاهش تحرک و تماس کمتر با آفتاب نیاز به ویتامین D بیشتر میشود

☐ بهتر است انرژی دریافتی روزانه کاهش یابد

☐ نیاز به آب در آنها زیاد نیست

☐ بهتر است برای جلوگیری از کم شونی قرص آهن بگیرند

7. در رابطه با اهداف تغذیه ای در بیمار مبتلا به اختلالات قلب و عروق کدام صحیح است؟

☐ افزایش فیبر دریافتی در حد تحمل بیمار است

☒ کاهش دریافت اسیدهای چرب اشباع به کمتر از 7 درصد کل کالری روزانه است

☐ هدف کاهش سطح کلسترول سرمی به کمتر از 200 میلیگرم در دهمی لیتر است

☐ کاهش کالری دریافتی و کاهش وزن است

6. میزان افزایش وزن بارداری در صورتی که BMI مادر نرمال باشد:

☐ 14 تا 18 کیلوگرم

☐ کمتر از 8/8

☐ 10

☒ 11/3- 15/8 kg

12 فردی که چاقی شکمی دارد:

☐ اگر BMI خوبی داشته باشد مشکلی ندارد

☐ اگر BMI پایین تر از نرمال دارد نباید اقدامی برای کاهش چربی شکمی انجام دهد

☐ بهتر است دور باسن نیز اندازه گیری شود و سپس تصمیم گرفته شود

☒ خطر بیماری قلبی عروقی در وی بیشتر است و حتما باید اقدام شود

8. رژیم DASH؟

☐ تنها در درمان فشار خون بالا کاربرد دارد

☐ رژیمیست که در آن میزان چربیها بطور کلی کاهش یافته اند تا مشکلات متابولیکی کم شود.

☐ رژیم انتخابی در کاهش وزن است

☒ سرشار از فیبر و نسبتاً پر پروتئین است.

5. شما به مادران باردار توصیه میکنید در هفته چند بار ماهی مصرف کنند؟

☐ 3 بار در هفته

☐ بهتر است مصرف نکنند به دلیل احتمال آلرژی

☒ دو بار در هفته

☐ هر روز

11. آقای 47 ساله دیابتی به شما مراجعه میکند گزینه صحیح؟

☐ توصیه به افزایش دریافت پروتئین و کاهش دریافت قندهای ساده میکنیم

☒ الگوی غذایی و سبک زندگی را بررسی و اصلاح میکنیم

☐ توصیه به دریافت هرچه بیشتر مفزيجات و فیبر میکنیم

☐ توصیه با کاهش وزن و افزایش فعالیت بدنی میکنیم

Iron deficiency leads to... 13

Iron deficiency anemia ☒

Cycle cell anemia ☐

Prptein energy malnutrition ☐

thalassemia ☐

بررسی اندکس های سلامت در اجتماع جز کدام است؟

ب) روشهای غیر مستقیم ☒

روشهای مستقیم ☐

ارزیابی عمومی ☐

روش های کلی نگر

Which nutrient should be added to the diet of patients with phenylketonuria? 13

metunin ☐

Alanin ☐

Phenylalanin ☐

Tyrosin ☒

ام گزینه زیر بیشتر در دفع کلسترول از لوله گوارشی نقش دارد؟

گنن

کتوز

عمی سلولز

پکتین

8. در رژیم مناسب بیماران کلیوی

- ☐ میزان پروتئین دریافتی را بالا میبریم چون بیمار بیشتر نیاز دارد
- ☒ بهتر است بیمار مایعات بیشتری دریافت کند تا مواد زائد را بهتر دفع کند
- ☐ باید دریافت املاح را به منظور حفظ کلیه ها کاهش دهیم
- ☐ اگر بیمار دیالیز نمیشود و کراتینین سرم بالاست باید رژیم کم پروتئین استفاده شود.

مقداری از یک ماده مغذی که نیاز نیمی از افراد جامعه را برآورده کند

✓ مقداری از یک ماده مغذی که نیاز بیش از 97 درصد افراد یک گروه سنی و جنسی خاص را برآورده کند

مجموع AI و EAR

مقداری از یک ماده غذایی که همه افراد سالم یک جامعه آن را مصرف کرده و مشکلی نداشته اند.

بایستی مراقب دریافت آب باشیم تا ادم پیش نیاید ✓

○ میتوانند املاح بیشتری دریافت کنند چون دیالیز کار کلیه را تکمیل میکند.

○ میتوانند رژیم آزادانه تری داشته باشند چون دیالیز کار کلیه را تکمیل میکند.

○ میتوانند آزادانه تر مصرف غلات را داشته باشند چون دیالیز کار کلیه را تکمیل میکند.

12. کدام مورد کمخونی زیر فیزیولوژیک محسوب میشود؟

☐ آنمی در ورزشکاران

☐ آنمی در تالاسمی مینور

☐ آنمی در سالمندی

☒ آنمی در بارداری

16. مصرف مولتی ویتامین مخصوص قبل از بارداری خطر کدام بیماریها را در جنین کم می کند؟

بیماریهای عصبی ☐

بیماریهای تنفسی ☐

بیماریهای قلبی عروقی ☒

بیماریهای گوارشی ☐

15. از کاربرهای اسیدهای آمینه غیر ضروری در بدن؟

ورود به گلوکونئوزنز ☒

ذخیره در کبد برای شرایط گرسنگی ☐

ذخیره بصورت پروتئین و افزایش وزن ☐

تولید آمونیاک ☐



16. میزان انرژی مورد نیاز مادر در سه ماهه سوم بارداری برابر است با

112 کیلو کالری

112 + (360-340) کیلوکالری ✓

مشابه قبل از بارداری

360-340 کیلوکالری

17 برای سنجش انرژی پایه مورد نیاز یک فرد در شبانه روز دقیقترین روش چیست؟

☐ استفاده از کالریمتری مستقیم

☐ استفاده از یادآمد یا ثبت غذایی

☒ استفاده از فرمول های دقیق که بر اساس سن و جنس و میزان فعالیت بدنی و وزن افراد تعبیه شده اند

☐ استفاده از کالریمتری غیر مستقیم

17. کدام مورد زیر در حالت معمول بیمار را مبتلا به کم خونی فقر آهن قرار نمیکند؟

عادت ماهیانه ☐

عفونت مزمن ☐

تمرینات ورزشی سخت در نوجوانان دختر ☐

خونریزی مخفی در مدفوع به مدت یکسال ☒

27. برای پیشگیری از فقر آهن کدام مورد را پیشنهاد میکنید؟

☐ مصرف مرتب قرص آهن

☐ پخت غذا در ظروف مسی

☒ مصرف مرتب مواد غذایی حاوی آهن بصورت روزانه، پرهیز از مصرف لبنیات زیاد و چربی با غذاهای حاوی آهن

☐ کاهش مصرف لبنیات