

Синописис протокола исследования биоэквивалентности: Розувастатин 20 мг (натошак)

Protocol ID: BE-ROZ-2026

МНН	Розувастатин
Лекарственная форма	Таблетки, 20 мг
Тип	Однофазное
Дизайн	Рандомизированное, открытое, двухпериодное, двухпоследовательностное перекрестное
Периоды	2 период(а/ов), 2 последовательности(ей), washout 7 дней

Цели и задачи

Оценить биоэквивалентность тестируемого и референтного препаратов Розувастатин по параметрам C_{max} и AUC при приёме натошак.

- Сравнить C_{max} и AUC_{0-t} (и при возможности $AUC_{0-\infty}$) после лог-трансформации.
- Оценить T_{max} описательно.
- Оценить безопасность и переносимость (НЯ, жизненные показатели, лабораторные показатели).

Популяция

Здоровые добровольцы (мужчины и/или женщины) согласно критериям включения/исключения.

Критерии включения:

- Подписанное информированное согласие.
- Возраст 18–55 лет.
- ИМТ 18.5–30.0 кг/м².
- Отсутствие клинически значимых отклонений по обследованиям и анализам.

Критерии исключения:

- Гиперчувствительность к действующему веществу или компонентам препарата.
- Приём лекарств, влияющих на фармакокинетику, в период скрининга/отмывки.
- Значимые хронические заболевания (печени, почек, CCC и др.).
- Участие в другом клиническом исследовании в последние 3 месяца.

Режим дозирования

Test: Однократный приём тестируемого препарата 20 мг натошак с 240 мл воды.

Reference: Однократный приём референтного препарата 20 мг натошак с 240 мл воды.

Отбор проб и биоаналитика

Отбор проб крови проводится в каждом периоде до 76 часов после дозирования, с более частым забором образцов вокруг предполагаемого T_{max} . Период полувыведения составляет 19 часов. Предлагаемая сетка точек (ч): 0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72.

Аналитический метод: Валидационный биоаналитический метод LC-MS/MS для определения концентраций действующего вещества в плазме.

Таймпоинты (ч): 0, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72

Статистика и биоэквивалентность

PK параметры: C_{max} , AUC_{0-t}, AUC_{0-∞} (при наличии), T_{max} (описательно)

Критерий БЭ: 90% ДИ для отношения геометрических средних (T/R) по $\ln(C_{max})$ и $\ln(AUC_{0-t})$ в пределах 80.00–125.00%.

Расчёт выборки: Расчёт выполнен для 90% ДИ ($\alpha=0.05$) и мощности 80%.

Использован CV_{intra}=20%. Требуется завершивших: 14; к скринингу: 20 (с учётом drop-out/screen-fail из входных параметров).

Безопасность и этика

Оценка НЯ/СНЯ, физикальные осмотры, жизненные показатели, ЭКГ, клинические и биохимические анализы крови/мочи.

Исследование проводится в соответствии с GCP, Хельсинкской декларацией и локальными требованиями. Обязательно информированное согласие.

Источники

- Rosuvastatin Pharmacokinetics: A Comprehensive Overview — <https://www.omicsonline.org/open-access-pdfs/rosuvastatin-pharmacokinetics-a-comprehensive-overview.pdf>

Примечание: документ сформирован автоматически и требует экспертной валидации перед регуляторным использованием.