

Quiz 2 – Electromagnetismo Intermedio (LFIS322)

Clases 1–5

Tiempo máximo: 20 minutos. Justifique sus respuestas.

1. (Notación indicial – 2 pts) Demuestre usando notación indicial que

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0.$$

2. (Gradiente y potencial – 2 pts) Sea

$$f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}.$$

Calcule el gradiente ∇f y discuta su dirección en relación al vector posición \vec{r} .

3. (Ley de Gauss – 4 pts) Una esfera maciza de radio R tiene densidad de carga uniforme ρ .

(a) Calcule el campo eléctrico en el interior ($r < R$).

(b) Calcule el campo eléctrico en el exterior ($r > R$).

4. (Potencial de una varilla cargada – 4 pts) Una varilla delgada de longitud L , cargada uniformemente con densidad lineal λ , está situada sobre el eje x entre $x = 0$ y $x = L$.

(a) Calcule el potencial $V(P)$ en un punto P sobre el eje y , a una distancia a del origen.

(b) A partir de V , obtenga la componente E_y del campo eléctrico en P .

Puntaje total: 12 pts.

Soluciones – Quiz 2 (Clases 1–5)

1. (Notación indicial – 3 pts) Demostrar que $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$.

Solución (notación indicial):

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = \partial_i (\varepsilon_{ijk} \partial_j A_k) = \varepsilon_{ijk} \partial_i \partial_j A_k.$$

Como $\partial_i \partial_j = \partial_j \partial_i$ (conmutan) es simétrica en $i \leftrightarrow j$, mientras que ε_{ijk} es antisimétrica en $i \leftrightarrow j$, su contracción es nula:

$$\boxed{\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0}.$$

2. (Gradiente y potencial – 3 pts) Para $f(x, y, z) = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$.

Solución: Sea $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$. Entonces

$$\nabla f = -2(x, y, z) e^{-r^2} = -2\vec{r} e^{-r^2}.$$

Dirección: ∇f apunta *opuesta* a \vec{r} (hacia el origen); su módulo decrece rápido por el factor e^{-r^2} .

$$\boxed{\nabla f = -2(x, y, z) e^{-(x^2+y^2+z^2)}}.$$

3. (Ley de Gauss – 4 pts) Esfera maciza de radio R con densidad uniforme ρ .

Interior $r < R$:

$$E(4\pi r^2) = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \hat{r}}.$$

Exterior $r > R$: $Q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$,

$$E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\varepsilon_0} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}}.$$

4. (Potencial de una varilla cargada – 5 pts) Varilla delgada de longitud L sobre el eje x (de 0 a L) con densidad lineal λ . Punto P en el eje y a distancia a del origen.

Potencial en $P = (0, a)$:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^L \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left[\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) \right]_0^L.$$

$$\boxed{V(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \ln \left(\frac{L + \sqrt{L^2 + a^2}}{a} \right)}.$$

Campo E_y a partir de V :

$$E_y(P) = -\frac{\partial V}{\partial a} = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{a}{\sqrt{L^2 + a^2} (L + \sqrt{L^2 + a^2})} - \frac{1}{a} \right).$$

Esto simplifica elegantemente usando $R = \sqrt{L^2 + a^2}$:

$$\frac{1}{a} - \frac{a}{R(L + R)} = \frac{L}{aR} \Rightarrow \boxed{E_y(P) = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0} \frac{L}{a\sqrt{L^2 + a^2}}}.$$

(Para $\lambda > 0$ y $a > 0$, $E_y > 0$: el campo apunta en $+\hat{y}$, *alejándose* de la varilla cargada.)