

În fișierul g18.csv sunt salvate valorile luate de instanțe pentru componentele principale într-un model de analiză în componente principale standardizată pe șase variabile observate.

Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Cattell?

- a.3
- b.2
- c.Niciuna dintre valorile specificate
- d.5
- e.4

Intr-un model de analiză factorială cu 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$ s-au obținut coeficienții de corelație din fișierul g21_1.csv și coeficienții de corelație parțială din fișierul g21_2.csv.

La care din următoarele clase de factorabilitate se încadrează modelul conform indexului KMO global?

- a.Bună
- b.Mediocră
- c.Slabă
- d.Foarte bună
- e.Medie

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul g22_2.csv iar centrii de clase au fost salvați în fișierul g22_2.csv. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D.

În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

- a.B
- b.C
- c.D
- d.A

În fișierul g23.csv este salvată matricea ierarhie rezultată în urma unei clusterizări ierarhice pe un set de date cu 25 de instanțe.

O linie în matrice corespunde unei joncțiuni. Pe coloana 3 din matrice se află distanțele de joncționare pentru fiecare joncțiune.

Care este partiția optimală?

- a.Niciuna dintre variantele specificate
- b.Partiția cu 6 clusteri
- c.Partiția cu 4 clusteri
- d.Partiția cu 3 clusteri
- e.Partiția cu 2 clusteri

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul g22_2.csv iar centrii de clase au fost salvați în fișierul g22_2.csv.

Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D.

În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde np este numele de import al pachetului numpy.

- a.B
- b.D
- c.C
- d.A

În fișierul g17.csv se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane, obținută în urma aplicării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$.

Valorile proprii sunt: (3.019, 1.2203, 0.6536, 0.102, 0.005).

Pentru care dintre variabilele observate, primele două componente principale explică în comun mai mult de 90% din varianță (comunalitatea) ?

- a. X_4 și X_5
- b.Niciuna dintre variantele specificate
- c. X_1, X_2, X_3 și X_4
- d. X_1, X_2 și X_5
- e. X_1 și X_3

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul g22_2.csv iar centrii de clase au fost salvați în fișierul g22_2.csv.

Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D.

În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde np este numele de import al pachetului numpy.

- a.B
- b.D
- c.A

d.C

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`.

Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D.

În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

a.C

b.B

c.A

d.D

În fișierul `g19.csv` sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate.

Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser?

a.5

b.4

c.1

d.2

e.3

În fișierul `g19.csv` sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate.

Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser?

a.1

b.5

c.2

d.4


e.3

În fișierul *g18.csv* sunt salvate valorile luate de instanțe pentru componentele principale într-un model de analiză în componente principale standardizată pe șase variabile observate.

Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Cattell?

- ☐ a. 2
- ☐ b. 4
- ☐ c. 5
- ☐ d. Niciuna dintre valorile specificate
- ☐ e. 3

Fie dendrograma din figura următoare:



Care dintre următoarele partiții este partiția cu trei clusteri conform graficului dendrogramă prezentat?

Precizare. Un cluster este delimitat prin acolade { ... }

- ☐ a. {i6, i5, i7, i3, i4}, {i2, i1, i9, i8, i10}
- ☐ b. {i7, i6, i5}, {i3, i4}, {i10, i8, i9}, {i1, i2}
- ☐ c. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ d. {i7, i5, i6}, {i3, i4}, {i1, i2, i9, i8, i10}
- ☐ e. {i1, i2}, {i10, i8, i9}, {i7, i5, i6, i3, i4}

Într-un model de analiză factorială cu 5 variabile observate standardizate și 2 factori, am obținut coeficienții factoriali L (*factor loadings*) din fișierul *g20.csv*. Care dintre factori are cea mai mare varianță?

- ☐ a. Factorul 5
- ☐ b. Factorul 1
- ☐ c. Factorul 3
- ☐ d. Factorul 2
- ☐ e. Factorul 4


În fișierul *g23.csv* este salvată matricea-ierarhie rezultată în urma unei clusterizări ierarhice pe un set de date cu 25 de instanțe.

O linie în matrice corespunde unei joncțiuni. Pe coloana 3 din matrice se află distanțele de jonționare pentru fiecare joncțiune.

Care este partiția optimală?

- ☐ a. Partiția cu 3 clusteri
- ☐ b. Partiția cu 4 clusteri
- ☐ c. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ d. Partiția cu 2 clusteri
- ☐ e. Partiția cu 6 clusteri

Fie dendrograma din figura următoare:



Care dintre următoarele partiții este partiția cu trei clusteri conform graficului dendrogramă prezentat?

Precizare. Un cluster este delimitat prin acolade { ... }

- ☐ a. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ b. {i7, i6, i5}, {i3, i4}, {i10, i8, i9}, {i1, i2}
- ☐ c. {i1, i2}, {i10, i8, i9}, {i7, i5, i6, i3, i4}
- ☐ d. {i7, i5, i6}, {i3, i4}, {i1, i2, i9, i8, i10}
- ☐ e. {i6, i5, i7, i3, i4}, {i2, i1, i9, i8, i10}

În fișierul *g17.csv* se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane, obținută în urma aplicării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$.

Valorile proprii sunt: (3.019, 1.2203, 0.6536, 0.102, 0.005).

Pentru care dintre variabilele observate, primele două componente principale explică în comun mai mult de 90% din varianță (comunalitatea) ?

- ☐ a. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ b. X_4 și X_5
- ☐ c. X_1 , X_2 , X_3 și X_4
- ☐ d. X_1 , X_2 și X_5
- ☐ e. X_1 și X_3

Dezvoltare Software pentru analiza datelor, Tip-C, Sem-1, Zi (2021

[Acasă](#) / [Cursuri](#) / [2021-2022](#) / [Licenta](#) / [Dezvoltare-C,Sem1\(354dw\)](#) / [6 februarie - 12 februarie](#) / [Examen grila Seria E](#)

Timp rămas 0:26:30

1 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D. În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

- ☐ a. D
- ☐ b. B
- ☐ c. A
- ☐ d. C

[Pagina următoare](#)



Navigare în test

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Trimite testul pentru evaluare

În fișierul *g17.csv* se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane, obținută în urma aplicării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$.

Valorile proprii sunt: (3.019, 1.2203, 0.6536, 0.102, 0.005).

Pentru care dintre variabilele observate, primele două componente principale explică în comun mai mult de 90% din varianță (comunalitatea)?

- ☐ a. X_4 și X_5
- ☒ b. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ c. X_1 și X_3
- ☐ d. X_1, X_2, X_3 și X_4
- ☐ e. X_1, X_2 și X_5

Șterge alegerea mea

În fișierul *g23.csv* este salvată matricea-ierarhie rezultată în urma unei clusterizări ierarhice pe un set de date cu 25 de instanțe.

O linie în matrice corespunde unei joncțiuni. Pe coloana 3 din matrice se află distanțele de joncționare pentru fiecare joncțiune.

Care este partiția optimală?

- ☐ a. Partiția cu 4 clusteri
- ☐ b. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ c. Partiția cu 6 clusteri
- ☐ d. Partiția cu 2 clusteri
- ☐ e. Partiția cu 3 clusteri

Întrebare

nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
1 răspuns

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D .

În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

- ☐ a. C
- ☐ b. A
- ☐ c. B
- ☐ d. D

În fișierul *g19.csv* sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate. Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser?

- ☐ a. 5
- ☐ b. 4
- ☐ c. 2
- ☐ d. 1
- ☐ e. 3

Examen grila Seria E (page 5 din ...)

Curs: Dezvoltare Software pentru ...

isNaN() - JavaScript | MDN

+

online.ase.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=215426&cmid=106073&page=4

Apps ASE | Admitere cicl... cucuvea - Căutare... Microsoft Word - 2... windows - error C4... Filă nouă Pointeri. Abordarea... (1) (DOC) Alocare d... Biblioteca digitala -... Biblioteca digitala -... Reading list

HL@ASE Română (ro)

45 STOICA ANDREEAIRINA

Acasă / Cursuri / 2021-2022 / Licenta / Dezvoltare-C,Sem1(354dw) / 6 februarie - 12 februarie / Examen grila Seria E

5 Întrebare

Nu a primit răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu flag

Timpe rămas 0:12:59

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D. În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

☐ a. A

☐ b. D

☐ c. B

☐ d. C

Trimite testul pentru evaluare

Seturi de date grile Seria E

Sari la...

1 2 3 4 5

Trimite testul pentru evaluare

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Type here to search

4°C

9:47 AM

2/11/2022

Într-un model de analiză factorială cu 5 variabile observate standardizate și 2 factori comuni s-au obținut coeficienții factoriali L (*factor loadings*) din fișierul *g20.csv*. Care dintre factorii specifici are cea mai mare varianță?

- ☐ a. Factorul 5
- ☐ b. Factorul 2
- ☐ c. Factorul 1
- ☐ d. Factorul 3
- ☐ e. Factorul 4

În fișierul *g19.csv* sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate.

Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser?

- ☐ a. 5
- ☐ b. 4
- ☐ c. 3
- ☐ d. 2
- ☐ e. 1

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D . În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

- ☐ a. D
- ☐ b. C
- ☐ c. A
- ☐ d. B

Dezvoltare Software pentru analiza datelor, Tip-C, Sem-1, Zi (2021-2022)

[Acasă](#) / [Cursuri](#) / [2021-2022](#) / [Licenta](#) / [Dezvoltare-C,Sem1\(354dw\)](#) / [6 februarie - 12 februarie](#) / [Examen grila Seria E](#)

3 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

În fișierul *g19.csv* sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate.
Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser?

- ☐ a. 2
☐ b. 1
☐ c. 3
☐ d. 5
☐ e. 4

Timp rămas 0:11:44

[Pagina următoare](#)

Seturi de date grile Seria E

Sari la...

Navigare în test

1 2 3 4 5

Trimite testul pentru evaluare

4 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

În fișierul *g17.csv* se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane, obținută în urma aplicării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$.

Valorile proprii sunt: (3.019, 1.2203, 0.6536, 0.102, 0.005).

Pentru care dintre variabilele observate, primele două componente principale explică în comun mai mult de 90% din varianță (comunalitatea) ?

- ☐ a. X_4 și X_5
- ☐ b. X_1, X_2, X_3 și X_4
- ☐ c. X_1 și X_3
- ☐ d. X_1, X_2 și X_5
- ☐ e. Niciuna dintre variantele specificate

Pagina următoare

WhatsApp

Examen grila Seria E (page 4 din ...)

Dezvoltare-S,Sem1(5972ds): Part...

online.ase.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=215499&cmid=106073&page=3

AppsBluza sport cu man...Tommy Jeans Bluză...Calvin Klein Perfor...Bluză | Slim Fit Tom...Căciulă cu adaos de...fillstyle bs fillrect -...Proiect/server/mod...Manual | SequelizeReading list

HL@ASERomână (ro)

HOINARU ADELASTEFANIA

Acasă / Cursuri / 2021-2022 / Licenta / Dezvoltare-C,Sem1(354dw) / 6 februarie - 12 februarie / Examen grila Seria E

4 Întrebare
Nu a primit răspuns încă
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Timp rămas 0:11:24

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D.
În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

☐ a. B

☐ b. C

☐ c. A

☐ d. D

Pagina următoare

Seturi de date grile Seria E

Sari la...

1

Claudiu Vinte


Trimite testul pentru evaluare

6°C Sunny

9:49 AM 2/11/2022

Fie dendrograma din figura următoare:

Timp rămas 0:10:17



Care dintre următoarele partiții este partiția cu trei clusteri conform graficului dendrogramă prezentat?

Precizare. Un cluster este delimitat prin acolade { ... }

- ☐ a. {i7, i6, i5}, {i3, i4}, {i10, i8, i9}, {i1, i2}
- ☐ b. {i6, i5, i7, i3, i4}, {i2, i1, i9, i8, i10}
- ☐ c. {i7, i5, i6}, {i3, i4}, {i1, i2, i9, i8, i10}
- ☐ d. {i1, i2}, {i10, i8, i9}, {i7, i5, i6, i3, i4}
- ☐ e. Niciuna dintre variantele specificate

Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în fișierul `g22_2.csv` iar centrii de clase au fost salvați în fișierul `g22_2.csv`. Predictorii sunt $X_1, \dots, X_6$ iar clasele sunt etichetate cu A, B, C și D . În ce clasă va fi clasificată instanța $x = [118, 19.8, 2.5, 8.3, 61.1, 8.3]$?

Indicație. Inversa matricei de covarianță totală va fi calculată prin funcția `np.linalg.inv()`, unde `np` este numele de import al pachetului `numpy`.

- ☐ a. D
- ☐ b. C
- ☐ c. A
- ☐ d. B

În fișierul *g18.csv* sunt salvate valorile luate de instanțe pentru componentele principale într-un model de analiză în componente principale standardizată pe șase variabile observate.

Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Cattell?

- ☐ a. 3
- ☐ b. 2
- ☐ c. Niciuna dintre valorile specificate
- ☐ d. 5
- ☐ e. 4

(2) WhatsApp

Examen grila Seria E (page 5 din ...)

Dezvoltare-S,Sem1(5972ds): Part...

online.ase.ro/mod/quiz/attempt.php?attempt=215499&cmid=106073&page=4

AppsBluza sport cu man...Tommy Jeans Bluză...Calvin Klein Perfor...Bluză | Slim Fit Tom...Căciulă cu adaos de...fillstyle bs fillrect -...Proiect/server/mod...Manual | SequelizeReading list

HL@ASERomână (ro)

HOINARU ADELASTEANIA

Dezvoltare Software pentru analiza datelor, Tip-C, Sem-1, Zi (2021-2022)

Acasă / Cursuri / 2021-2022 / Licenta / Dezvoltare-C,Sem1(354dw) / 6 februarie - 12 februarie / Examen grila Seria E

5 Întrebare
Nu a primit răspuns încă
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

În fișierul *g18.csv* sunt salvate valorile luate de instanțe pentru componentele principale într-un model de analiză în componente principale standardizată pe șase variabile observate.
Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Cattell?

☐ a. 4

☐ b. Niciuna dintre valorile specificate

☐ c. 2

☐ d. 5

☐ e. 3

Timp rămas 0:07:52

Trimit testul pentru evaluare

Seturi de date grile Seria E

Sari la...

Claudiu Vinte

Navigare în test

12345

Trimit testul pentru evaluare

Python

Ricardo: Într-un model de analiză discriminantă liniară cu 6 variabile predictor și 4 clase, matricea de covarianță totală (T) a fost salvată în f

Google Chrome • web.whatsapp.com

6°C Sunny

9:53 AM 2/11/2022

Într-un model de analiză factorială cu 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$ s-au obținut coeficienții de corelație din fișierul *g21_1.csv* și coeficienții de corelație parțială din fișierul *g21_2.csv*.

La care din următoarele clase de factorabilitate se încadrează modelul conform indexului KMO global?

- ☐ a. Mediocră
- ☐ b. Bună
- ☐ c. Medie
- ☐ d. Foarte bună
- ☐ e. Slabă


În fișierul *g17.csv* se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane, obținută în urma aplicării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$.

Valorile proprii sunt: (3.019, 1.2203, 0.6536, 0.102, 0.005).

Pentru care dintre variabilele observate, primele două componente principale explică în comun mai mult de 90% din varianță (comunalitatea) ?

- ☐ a. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ b. X_1 și X_3
- ☐ c. X_1, X_2, X_3 și X_4
- ☐ d. X_1, X_2 și X_5
- ☐ e. X_4 și X_5

Fie dendrograma din figura următoare:



Care dintre următoarele partiții este partiția cu trei clusteri conform graficului dendrogramă prezentat?

Precizare. Un cluster este delimitat prin acolade { ... }

- ☐ a. {i6, i5, i7, i3, i4}, {i2, i1, i9, i8, i10}
- ☐ b. {i1, i2}, {i10, i8, i9}, {i7, i5, i6, i3, i4}
- ☐ c. {i7, i6, i5}, {i3, i4}, {i10, i8, i9}, {i1, i2}
- ☐ d. {i7, i5, i6}, {i3, i4}, {i1, i2, i9, i8, i10}
- ☐ e. Niciuna dintre variantele specificate

Timp rămas 0:05:48

5 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

🚩 Întrebare cu
flag

Într-un model de analiză factorială cu 5 variabile observate standardizate și 2 factori comuni s-au obținut coeficienții factoriali L (*factor loadings*) din fișierul *g20.csv*. Care dintre factorii specifici are cea mai mare varianță?

- ☐ a. Factorul 1
- ☐ b. Factorul 3
- ☐ c. Factorul 4
- ☐ d. Factorul 2
- ☐ e. Factorul 5

Trimite testul pentru evaluare

Navi

1

Trimite

În fișierul *g17.csv* se află matricea vectorilor proprii așezați pe coloane, obținută în urma aplicării unei analize în componente principale standardizate pe un număr de 5 variabile observate, $X_1, \dots, X_5$.

Valorile proprii sunt: (3.019, 1.2203, 0.6536, 0.102, 0.005).

Pentru care dintre variabilele observate, primele două componente principale explică în comun mai mult de 90% din varianță (comunalitatea) ?

- ☐ a. X_1, X_2, X_3 și X_4
- ☐ b. X_1 și X_3
- ☐ c. X_1, X_2 și X_5
- ☐ d. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ e. X_4 și X_5

Trimite testul pentru evaluare

În fișierul *g23.csv* este salvată matricea-ierarhie rezultată în urma unei clusterizări ierarhice pe un set de date cu 25 de instanțe.

O linie în matrice corespunde unei joncțiuni. Pe coloana 3 din matrice se află distanțele de jonționare pentru fiecare joncțiune.

Care este partiția optimală?

- ☐ a. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ b. Partiția cu 6 clusteri
- ☐ c. Partiția cu 2 clusteri
- ☐ d. Partiția cu 3 clusteri
- ☐ e. Partiția cu 4 clusteri

În fișierul *g19.csv* sunt salvate comunalitățile pentru un model de analiză în componente principale standardizată cu cinci variabile observate. Care este numărul de componente principale semnificative conform criteriului Kaiser?

- ☐ a. 5
- ☐ b. 4
- ☐ c. 2
- ☐ d. 1
- ☐ e. 3

În fișierul *g23.csv* este salvată matricea-ierarhie rezultată în urma unei clusterizări ierarhice pe un set de date cu 25 de instanțe.

O linie în matrice corespunde unei joncțiuni. Pe coloana 3 din matrice se află distanțele de joncționare pentru fiecare joncțiune.

Care este partiția optimală?

- ☐ a. Niciuna dintre variantele specificate
- ☐ b. Partiția cu 4 clusteri
- ☐ c. Partiția cu 3 clusteri
- ☐ d. Partiția cu 2 clusteri
- ☐ e. Partiția cu 6 clusteri