

1-1, 1-2

(1) 解:

- a) 是命题, 真值为 T。
- b) 不是命题。
- c) 是命题, 真值要根据具体情况确定。
- d) 不是命题。
- e) 是命题, 真值为 T。
- f) 是命题, 真值为 T。
- g) 是命题, 真值为 F。
- h) 不是命题。
- i) 不是命题。

(2) 解:

原子命题: 我爱北京天安门。

复合命题: 如果不是练健美操, 我就出外旅游拉。

(3) 解:

a) $(\neg P \wedge R) \rightarrow Q$

b) $Q \rightarrow R$

c) $\neg P$

d) $P \rightarrow \neg Q$

(4) 解:

a) 设 Q: 我将去参加舞会。R: 我有时间。P: 天下雨。

$Q \leftrightarrow (R \wedge \neg P)$: 我将去参加舞会当且仅当我有时间和天不下雨。

b) 设 R: 我在看电视。Q: 我在吃苹果。

$R \wedge Q$: 我在看电视边吃苹果。

c) 设 Q: 一个数是奇数。R: 一个数不能被 2 除。

$(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$: 一个数是奇数, 则它不能被 2 整除并且一个数不能被 2 整除, 则它是奇数。

(5) 解:

a) 设 P: 王强身体很好。Q: 王强成绩很好。 $P \wedge Q$

b) 设 P: 小李看书。Q: 小李听音乐。 $P \wedge Q$

c) 设 P: 气候很好。Q: 气候很热。 $P \vee Q$

d) 设 P: a 和 b 是偶数。Q: $a+b$ 是偶数。 $P \rightarrow Q$

e) 设 P: 四边形 ABCD 是平行四边形。Q: 四边形 ABCD 的对边平行。 $P \leftrightarrow Q$

f) 设 P: 语法错误。Q: 程序错误。R: 停机。
 $(P \vee Q) \rightarrow R$

(6) 解:

a) P: 天气炎热。Q: 正在下雨。 $P \wedge Q$

b) P: 天气炎热。R: 湿度较低。 $P \wedge R$

c) R: 天正在下雨。S: 湿度很高。 $R \vee S$

d) A: 刘英上山。B: 李进上山。 $A \wedge B$

e) M: 老王是革新者。N: 小李是革新者。 $M \vee$

N

f) L: 你看电影。M: 我看电影。 $\neg L \rightarrow \neg M$

g) P: 我不看电视。Q: 我不外出。R: 我在睡觉。
 $P \wedge Q \wedge R$

h) P: 控制台打字机作输入设备。Q: 控制台打字机作输出设备。 $P \wedge Q$

1-3

(1) 解:

a) 不是合式公式, 没有规定运算符次序 (若规定运算符次序后亦可作为合式公式)

b) 是合式公式

c) 不是合式公式 (括弧不配对)

d) 不是合式公式 (R 和 S 之间缺少联结词)

e) 是合式公式。

(2) 解:

a) A 是合式公式, $(A \vee B)$ 是合式公式,
 $(A \rightarrow (A \vee B))$ 是合式公式。这个过程可以
简记为:

$A; (A \vee B); (A \rightarrow (A \vee B))$

同理可记

b) $A; \neg A; (\neg A \wedge B); ((\neg A \wedge B) \wedge A)$

c) $A; \neg A; B; (\neg A \rightarrow B); (B \rightarrow A);$

$((\neg A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A))$

d) $A; B; (A \rightarrow B); (B \rightarrow A);$

$((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$

(3) 解:

a) $((((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \wedge C) \rightarrow A)) \rightarrow ((B \wedge C) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow C))$

b) $((B \rightarrow A) \vee (A \rightarrow B)).$

(4) 解:

a) 是由 c) 式进行代换得到, 在 c) 中用 Q
代换 P , $(P \rightarrow P)$ 代换 Q .

d) 是由 a) 式进行代换得到, 在 a) 中用
 $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 代换 Q .

e) 是由 b) 式进行代换得到, 用 R 代换 P , S
代换 Q , Q 代换 R , P 代换 S .

(5) 解:

a) P : 你没有给我写信。 R : 信在途中丢失
了。 $P \quad Q$

b) P : 张三不去。 Q : 李四不去。 R : 他就去。
 $(P \wedge Q) \rightarrow R$

c) P : 我们能划船。 Q : 我们能跑步。
 $\neg (P \wedge Q)$

d) P : 你来了。 Q : 他唱歌。 R : 你伴奏。
 $P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$

(6) 解:

P:它占据空间。Q:它有质量。R:它不断变化。
S:它是物质。

这个人起初主张: $(P \wedge Q \wedge R) \leftrightarrow S$

后来主张: $(P \wedge Q \leftrightarrow S) \wedge (S \rightarrow R)$

这个人开头主张与后来主张的不同点在于: 后来认为有 $P \wedge Q$ 必同时有 R, 开头时没有这样的主张。

(7) 解:

a) P: 上午下雨。 Q:我去看电影。 R:我在我家里读书。 S:我在我家里看报。

$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow (R \vee S))$

b) P: 我今天进城。 Q:天下雨。 $\neg Q \rightarrow P$

c) P: 你走了。 Q:我留下。 $Q \rightarrow P$

1-4

(4) 解: a)

P	Q R	$Q \wedge R$	$P \wedge (Q \wedge R)$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \wedge R$
T	T				
	T				
T	T				
	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F
	T	F	F	F	F
	F	T	F	F	F
T	F	F	F	F	F
	F	T	F	F	F
F	T	F	F	F	F
	T	F	F	F	F
	F				
F	F				
	T				

F	F			
	F			

所以, $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$

b)

P		P		(P
Q	$Q \vee R$	$\vee (Q \vee R)$	$P \vee Q$	$\vee Q) \vee R$
T	T	T		
T	T	T	T	T
T	T	T		
T	F	T	T	T
T	T	T		
F	T	T	T	T
T	T	T		

F	F	F	T	T
T			T	T
T				
F			T	T
F				
F			F	T
T				
F			F	F
F				

F				
---	--	--	--	--

所以, $P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$

c)

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	T	T	T	T	T
T	T	T	T	F	T
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	F	F
T	T	F	T	F	F
F	T	F	T	F	F
T	F	F	T	F	F
T					

F					
F					
F					
T					
T					
F					
T					
F					
F					
T					
F					
F					
F					

所以, $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

d)

P			$\neg P$	$\neg (P \wedge Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg (P \vee Q)$
Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$			
T						
T						
T						
F	F	F	F	F	F	F
F	F	T	T	T	F	F
F	T	F	T	T	F	F
F	T	T	T	T	T	T
T						
F						
F						

所以， $\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$, $\neg (P \vee Q)$

$$\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$$

(5) 解：如表，对问好所填的地方，可得公式
 $F_1 \sim F_6$ ，可表达为

P	Q	R	F1	F2	F3	F4	F5	F6
T	T	T	T	F	T	T	F	F
T	T	F	F	F	T	F	F	F
T	F	T	T	F	F	T	T	F

T	F	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	T	F	F	T	T	F
F	T	F	T	F	F	F	T	F
F	F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	F	F	T	F	T	T	T

$$F1: (Q \rightarrow P) \rightarrow R$$

$$F2: (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$F3: (P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \vee R)$$

$$F4: (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$$

$$F5: (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

$$F6: \neg (P \vee Q \vee R)$$

(6)

		1														
P	Q		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
F	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F
F	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T
T	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T

解：由上表可得有关公式为

1. F	2. $\neg (P \vee Q)$	
3. $\neg (Q \rightarrow P)$	4. $\neg P$	
	5. $\neg (P \rightarrow Q)$	6. $\neg Q$
7. $\neg (P \leftrightarrow Q)$	8. $\neg (P \wedge Q)$	
	9. $P \wedge Q$	10. $P \leftrightarrow Q$
11. Q	12. $P \rightarrow Q$	
	13. P	14. Q
$\rightarrow P$	15. $P \vee Q$	16. T

(7) 证明:

$$a) A \rightarrow (B \rightarrow A) \Leftrightarrow \neg A \vee (\neg B \vee A)$$

$$\Leftrightarrow A \vee (\neg A \vee \neg B)$$

$$\Leftrightarrow A \vee (A \rightarrow \neg B)$$

$$\Leftrightarrow \neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$$

$$b) \neg (A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow \neg ((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B))$$

$$\Leftrightarrow \neg ((A \wedge B) \vee \neg (A \vee B))$$

$$\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge \neg (A \wedge B)$$

$$\text{或 } \neg (A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow \neg ((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge A) \vee (B \wedge \neg B) \vee (B \wedge A))$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg A \wedge \neg B) \vee (B \wedge A))$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg (A \vee B)) \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge \neg (A \wedge B)$$

$$c) \neg (A \rightarrow B) \Leftrightarrow \neg (\neg A \vee B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$$

$$d) \neg (A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow \neg ((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$$

$$\Leftrightarrow \neg ((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$$

$$e) (((A \wedge B \wedge C) \rightarrow D) \wedge (C \rightarrow (A \vee B \vee D)))$$

$$\Leftrightarrow (\neg (A \wedge B \wedge C) \vee D) \wedge (\neg C \vee (A \vee B \vee D))$$

$$\Leftrightarrow (\neg (A \wedge B \wedge C) \vee D) \wedge (\neg (\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg (A \wedge B \wedge C) \wedge \neg (\neg A \wedge \neg B \wedge C)) \vee D$$

$$\Leftrightarrow ((A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge C)) \rightarrow D$$

$$\Leftrightarrow (((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)) \wedge C) \rightarrow D$$

$$\Leftrightarrow ((C \wedge (A \leftrightarrow B)) \rightarrow D)$$

$$f) A \rightarrow (B \vee C) \Leftrightarrow \neg A \vee (B \vee C)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \vee C$$

$$\Leftrightarrow \neg (A \wedge \neg B) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \rightarrow C$$

$$g) (A \rightarrow D) \wedge (B \rightarrow D) \Leftrightarrow (\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B) \vee D$$

$$\Leftrightarrow \neg (A \vee B) \vee D$$

$$\Leftrightarrow (A \vee B) \rightarrow D$$

$$h) ((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow (D \vee C))$$

$$\Leftrightarrow (\neg (A \wedge B) \vee C) \wedge (\neg B \vee (D \vee C))$$

$$\Leftrightarrow (\neg (A \wedge B) \wedge (\neg B \vee D)) \vee C$$

$$\Leftrightarrow (\neg (A \wedge B) \wedge \neg (\neg D \wedge B)) \vee C$$

$$\Leftrightarrow \neg ((A \wedge B) \vee (\neg D \wedge B)) \vee C$$

$$\Leftrightarrow ((A \vee \neg D) \wedge B) \rightarrow C$$

$$\Leftrightarrow (B \wedge (D \rightarrow A)) \rightarrow C$$

(8) 解:

$$a) ((A \rightarrow B) \leftrightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)) \wedge C$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \vee B) \leftrightarrow (B \vee \neg A)) \wedge C$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \vee B) \leftrightarrow (\neg A \vee B)) \wedge C$$

$$\Leftrightarrow T \wedge C \Leftrightarrow C$$

$$b) A \vee (\neg A \vee (B \wedge \neg B)) \Leftrightarrow (A \vee \neg A) \vee (B \wedge \neg B)$$

$$\Leftrightarrow T \vee F \Leftrightarrow T$$

$$c) (A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$$

$$\Leftrightarrow (A \vee \neg A) \wedge (B \wedge C)$$

$$\Leftrightarrow T \wedge (B \wedge C)$$

$$\Leftrightarrow B \wedge C$$

(9) 解: 1) 设 C 为 T, A 为 T, B 为 F, 则满足 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$, 但 $A \leftrightarrow B$ 不成立。

2) 设 C 为 F, A 为 T, B 为 F, 则满足 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$, 但 $A \Leftrightarrow B$ 不成立。

3) 由题意知 $\neg A$ 和 $\neg B$ 的真值相同, 所以 A 和 B 的真值也相同。

习题 1-5

(1) 证明:

$$\text{a) } (P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge (\neg P \vee Q)) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow Q$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \wedge Q) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee Q$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee T$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$\text{b) } \neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow P \vee (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg P) \vee Q$$

$$\Leftrightarrow T \vee Q$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$\text{c) } ((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$\text{因为 } (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$$

所以 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 为重言式。

$$\text{d) } ((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a)) \leftrightarrow (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a)$$

$$\vee (c \wedge a)) \leftrightarrow (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a)$$

$$\text{因为 } ((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a))$$

$$\Leftrightarrow ((a \vee c) \wedge b) \vee (c \wedge a)$$

$$\Leftrightarrow ((a \vee c) \vee (c \wedge a)) \wedge (b \vee (c \wedge a))$$

$$\Leftrightarrow (a \vee c) \wedge (b \vee c) \wedge (b \vee a)$$

所以 $((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a)) \leftrightarrow (a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a)$ 为重言式。

(2) 证明:

$$a) (P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$$

解法 1:

设 $P \rightarrow Q$ 为 T

(1) 若 P 为 T, 则 Q 为 T, 所以 $P \wedge Q$ 为 T,
故 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 为 T

(2) 若 P 为 F, 则 Q 为 F, 所以 $P \wedge Q$ 为 F,
 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 为 T

命题得证

解法 2:

设 $P \rightarrow (P \wedge Q)$ 为 F, 则 P 为 T, $(P \wedge Q)$ 为 F, 故必有 P 为 T, Q 为 F, 所以 $P \rightarrow Q$ 为 F。

解法 3:

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q))$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee (P \wedge Q))$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q))$$

$\Leftrightarrow T$

所以 $(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$

$$b) (P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$$

设 $P \vee Q$ 为 F, 则 P 为 F, 且 Q 为 F,
故 $P \rightarrow Q$ 为 T, $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 为 F,
所以 $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$ 。

$$c) (Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))) \Rightarrow R \rightarrow Q$$

设 $R \rightarrow Q$ 为 F, 则 R 为 T, 且 Q 为 F, 又 $P \wedge \neg P$ 为 F

所以 $Q \rightarrow (P \wedge \neg P)$ 为 T, $R \rightarrow (P \wedge \neg P)$ 为 F

所以 $R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))$ 为 F, 所以 $(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P)))$ 为 F

即 $(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))) \Rightarrow R \rightarrow Q$ 成立。

(3) 解:

a) $P \rightarrow Q$ 表示命题“如果 8 是偶数，那么糖果是甜的”。

b) a) 的逆换式 $Q \rightarrow P$ 表示命题“如果糖果是甜的，那么 8 是偶数”。

c) a) 的反换式 $\neg P \rightarrow \neg Q$ 表示命题“如果 8 不是偶数，那么糖果不是甜的”。

d) a) 的逆反式 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 表示命题“如果糖果不是甜的，那么 8 不是偶数”。

(4) 解：

a) 如果天下雨，我不去。

设 P ：天下雨。 Q ：我不去。 $P \rightarrow Q$

逆换式 $Q \rightarrow P$ 表示命题：如果我不去，则天天下雨。

逆反式 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 表示命题：如果我去，则天不下雨

b) 仅当你走我将留下。

设 S ：你走了。 R ：我将留下。 $R \rightarrow S$

逆换式 $S \rightarrow R$ 表示命题：如果你走了则我将留下。

逆反式 $\neg S \rightarrow \neg R$ 表示命题：如果你不走，则我不留下。

c) 如果我不能获得更多帮助，我不能完成个任务。

设 E ：我不能获得更多帮助。 H ：我不能完成这个任务。 $E \rightarrow H$

逆换式 $H \rightarrow E$ 表示命题：我不能完成这个任务，则我不能获得更多帮助。

逆反式 $\neg H \rightarrow \neg E$ 表示命题：我完成这个任务，则我能获得更多帮助

(5) 试证明 $P \leftrightarrow Q$ ， Q 逻辑蕴含 P 。

证明：解法 1：

本题要求证明 $(P \leftrightarrow Q) \wedge Q \Rightarrow P$,

设 $(P \leftrightarrow Q) \wedge Q$ 为 T, 则 $(P \leftrightarrow Q)$ 为 T, Q 为 T,
故由 \leftrightarrow 的定义, 必有 P 为 T.

所以 $(P \leftrightarrow Q) \wedge Q \Rightarrow P$

解法 2:

由体题可知, 即证 $((P \leftrightarrow Q) \wedge Q) \rightarrow P$ 是永真式.

$$\begin{aligned}
 & ((P \leftrightarrow Q) \wedge Q) \rightarrow P \\
 \Leftrightarrow & (((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \wedge Q) \rightarrow P \\
 \Leftrightarrow & (\neg ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee \neg Q) \vee P \\
 \Leftrightarrow & (((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)) \vee \neg Q) \vee P \\
 \Leftrightarrow & ((\neg Q \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \vee P \vee Q)) \vee P \\
 \Leftrightarrow & ((\neg Q \vee \neg P) \wedge T) \vee P \\
 \Leftrightarrow & \neg Q \vee \neg P \vee P \\
 \Leftrightarrow & \neg Q \vee T \\
 \Leftrightarrow & T
 \end{aligned}$$

(6) 解:

P: 我学习

Q: 我数学不及

格

R: 我热衷于玩扑克。

如果我学习, 那么我数学不会不及格:
 $P \rightarrow \neg Q$

如果我不热衷于玩扑克, 那么我将学习:
 $\neg R \rightarrow P$

但我数学不及格:

Q

因此我热衷于玩扑克。

R

即本题符号化为: $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow P) \wedge Q \Rightarrow R$
证:

$$\begin{aligned}
 & \text{证法 1: } ((P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow P) \wedge Q) \rightarrow R \\
 \Leftrightarrow & \neg ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (R \vee P) \wedge Q) \vee R \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge Q) \vee (\neg R \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R \\
 \Leftrightarrow &
 \end{aligned}$$

$$((\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((R \vee \neg R) \wedge (R \vee \neg P))$$

$$\Leftrightarrow \neg Q \vee P \vee R \vee \neg P$$

$$\Leftrightarrow T$$

所以，论证有效。

证法 2：设 $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow P) \wedge Q$ 为 T，
则因 Q 为 T， $(P \rightarrow \neg Q)$ 为 T，可得 P 为 F，
由 $(\neg R \rightarrow P)$ 为 T，得到 R 为 T。

故本题论证有效。

(7) 解：

P：6 是偶数 Q：7 被 2 除尽
R：5 是素数

如果 6 是偶数，则 7 被 2 除不尽
 $P \rightarrow \neg Q$

或 5 不是素数，或 7 被 2 除尽
 $\neg R \vee Q$

5 是素数

所以 6 是奇数

$\neg P$
即本题符号化为： $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R \Rightarrow \neg P$

证：

证法 1： $((P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R) \rightarrow \neg P$
 $\Leftrightarrow \neg ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R) \vee \neg P$
 $\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (R \wedge \neg Q) \vee \neg R) \vee \neg P$
 $\Leftrightarrow ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee ((\neg R \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg Q))$
 $\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \vee (\neg R \vee \neg Q)$
 $\Leftrightarrow T$

所以,论证有效,但实际上他不符合实际意义。

证法 2: $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R$ 为 T,
则有 R 为 T, 且 $\neg R \vee Q$ 为 T, 故 Q 为 T,
再由 $P \rightarrow \neg Q$ 为 T, 得到 $\neg P$ 为 T。

(8) 证明:

a) $P \Rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$

设 P 为 T, 则 $\neg P$ 为 F, 故 $\neg P \rightarrow Q$ 为 T

b) $\neg A \wedge B \wedge C \Rightarrow C$

假定 $\neg A \wedge B \wedge C$ 为 T, 则 C 为 T。

c) $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$

因为 $A \vee B \vee \neg B$ 为永真, 所以 $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$
成立。

d) $\neg (A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

设 $\neg (A \wedge B)$ 为 T, 则 $A \wedge B$ 为 F。

若 A 为 T, B 为 F, 则 $\neg A$ 为 F, $\neg B$ 为 T, 故
 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

若 A 为 F, B 为 T, 则 $\neg A$ 为 T, $\neg B$ 为 F, 故
 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

若 A 为 F, B 为 F, 则 $\neg A$ 为 T, $\neg B$ 为 T, 故
 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

命题得证。

e) $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A \Rightarrow B \vee C$

设 $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A$ 为 T,
则 $D \vee E$ 为 T, $(D \vee E) \rightarrow \neg A$ 为 T, 所以 $\neg A$ 为
T

又 $\neg A \rightarrow (B \vee C)$ 为 T, 所以 $B \vee C$ 为 T。命题得
证。

f) $(A \wedge B) \rightarrow C, \neg D, \neg C \vee D \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

设 $(A \wedge B) \rightarrow C, \neg D, \neg C \vee D$ 为 T, 则 $\neg D$ 为 T,
 $\neg C \vee D$ 为 T, 所以 C 为 F

又 $(A \wedge B) \rightarrow C$ 为 T, 所以 $A \wedge B$ 为 F, 所以 $\neg A$
 $\vee \neg B$ 为 T。命题得证。

(9) 解:

a) 如果他有勇气, 他将得胜。

P: 他有勇气

Q: 他将得胜

胜

原命题: $P \rightarrow Q$

逆反式:

$\neg Q \rightarrow \neg P$ 表示: 如果他失败了, 说明他没勇气。

b) 仅当他不累他将得胜。

P: 他不累

Q: 他得胜

原命题: $Q \rightarrow P$

逆反式:

$\neg P \rightarrow \neg Q$ 表示: 如果他累, 他将失败。

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \vee \neg R)) \wedge \neg P \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge (P \wedge Q) \vee (Q \wedge \neg P \wedge Q) \vee (\neg R \wedge \neg P \wedge Q))$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg R \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \vee \neg Q)$$

$$c) \neg P \wedge \neg Q \wedge (\neg R \rightarrow P)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge (R \vee P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee F$$

$$\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge R$$

$$\Leftrightarrow \neg (P \vee Q \vee \neg R)$$

(2) 解:

$$a) \neg P \Leftrightarrow P \downarrow P$$

$$b) P \vee Q \Leftrightarrow \neg (P \downarrow Q) \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

$$c) P \wedge Q \Leftrightarrow \neg P \downarrow \neg Q \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

习题 1-6

(1) 解:

$$a) (P \wedge Q) \wedge \neg P \Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \wedge Q \Leftrightarrow \neg (T \vee Q)$$

$$b) (P \rightarrow (Q \vee \neg R)) \wedge \neg P \wedge Q$$

(3) 解:

$$P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee P$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \uparrow \neg P) \uparrow (P \uparrow P)$$

$$\Leftrightarrow P \uparrow (P \uparrow P)$$

$$P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee P$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \downarrow P)$$

$$\Leftrightarrow \neg ((P \downarrow P) \downarrow P)$$

$$\Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow P) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow P)$$

(4) 解:

$$P \uparrow Q$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \downarrow \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q))$$

$$\Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q))$$

(5) 证明:

$$\neg (B \uparrow C)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg B \vee \neg C)$$

$$\Leftrightarrow \neg B \downarrow \neg C$$

$$\neg (B \downarrow C)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg B \wedge \neg C)$$

$$\Leftrightarrow \neg B \uparrow \neg C$$

(6) 解: 联结词 “ \uparrow ” 和 “ \downarrow ” 不满足结合律。

举例如下:

a) 给出 ~~不~~ 一组指派: P 为 T , Q 为 F , R 为 F , 则 $(P \uparrow Q) \uparrow R$ 为 T , $P \uparrow (Q \uparrow R)$ 为 F

故 $(P \uparrow Q) \uparrow R \neq P \uparrow (Q \uparrow R)$.

b) 给出一组指派: P 为 T, Q 为 F, R 为 F, 则 $(P \downarrow Q) \downarrow R$ 为 T, $P \downarrow (Q \downarrow R)$ 为 F
故 $(P \downarrow Q) \downarrow R \quad P \downarrow (Q \downarrow R)$.

(7) 证明:

设变元 P, Q, 用连结词 \leftrightarrow, \neg 作用于 P, Q 得到:

P, Q, $\neg P$, $\neg Q$, $P \leftrightarrow Q$, $P \leftrightarrow P$, $Q \leftrightarrow Q$, $Q \leftrightarrow P$.

但 $P \leftrightarrow Q \leftrightarrow Q \leftrightarrow P$, $P \leftrightarrow P \leftrightarrow Q \leftrightarrow Q$, 故实际有:

P, Q, $\neg P$, $\neg Q$, $P \leftrightarrow Q$, $P \leftrightarrow P$ (T)

(A)

用 \neg 作用于 (A) 类, 得到扩大的公式类 (包括原公式类):

P, Q, $\neg P$, $\neg Q$, $\neg (P \leftrightarrow Q)$, T, F, $P \leftrightarrow Q$

(B)

用 \leftrightarrow 作用于 (A) 类, 得到:

$P \leftrightarrow Q$, $P \leftrightarrow \neg P \leftrightarrow F$, $P \leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow Q)$, $P \leftrightarrow$
 $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow Q$, $P \leftrightarrow (P \leftrightarrow P) \leftrightarrow P$,

$Q \leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow Q)$, $Q \leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow F$, $Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow P$, $Q \leftrightarrow T \leftrightarrow Q$,

$\neg P \leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow P \leftrightarrow Q$, $\neg P \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg Q$, $\neg P \leftrightarrow T \leftrightarrow \neg P$,

$\neg Q \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg P$, $\neg Q \leftrightarrow T \leftrightarrow \neg Q$,

$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow P \leftrightarrow Q$.

因此, (A) 类使用运算后, 仍在 (B) 类中。

对 (B) 类使用 \neg 运算得:

$\neg P$, $\neg Q$, P, Q, $P \leftrightarrow Q$, F, T,

$\neg (P \leftrightarrow Q)$,

仍在 (B) 类中。

对 (B) 类使用 \leftrightarrow 运算得:

$P \leftrightarrow Q$, $P \leftrightarrow \neg P \leftrightarrow F$, $P \leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow Q)$, $P \leftrightarrow \neg$
 $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg Q$, $P \leftrightarrow T \leftrightarrow P$, $P \leftrightarrow F \leftrightarrow \neg P$, $P \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow Q$,

$Q \leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow Q)$, $Q \leftrightarrow \neg Q \leftrightarrow F$, $Q \leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow Q)$

$\Leftrightarrow \neg P, Q \Leftrightarrow T \Leftrightarrow Q, Q \Leftrightarrow F \Leftrightarrow \neg Q, Q \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P,$
 $\neg P \Leftrightarrow \neg Q \Leftrightarrow P \Leftrightarrow Q, \neg P \Leftrightarrow \neg (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow Q, \neg P \Leftrightarrow T \Leftrightarrow \neg P,$
 $\neg P \Leftrightarrow F \Leftrightarrow P, \neg P \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow \neg Q,$
 $\neg Q \Leftrightarrow \neg (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P, \neg Q \Leftrightarrow T \Leftrightarrow \neg Q, \neg Q \Leftrightarrow T \Leftrightarrow \neg Q,$
 $\neg Q \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P,$
 $\neg (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow T \Leftrightarrow \neg (P \Leftrightarrow Q), \neg (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow F \Leftrightarrow P \Leftrightarrow Q,$
 $\neg (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow F$
 $T \Leftrightarrow F \Leftrightarrow F, T \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \Leftrightarrow Q$
 $F \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow \neg (P \Leftrightarrow Q)$
 $(P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \Leftrightarrow Q) \Leftrightarrow P \Leftrightarrow Q.$

故由 (B) 类使用 \Leftrightarrow 运算后, 结果仍在 (B) 中。
 由上证明: 用 \Leftrightarrow, \neg 两个连结词, 反复作用在两个变元的公式中, 结果只能产生 (B) 类中的公式, 总共仅八个不同的公式, 故 $\{\Leftrightarrow, \neg\}$ 不是功能完备的, 更不能是最小联结词组。

已证 $\{\Leftrightarrow, \neg\}$ 不是最小联结词组, 又因为 $P \Leftrightarrow \neg (P \Leftrightarrow Q)$, 故任何命题公式中的联结词, 如仅用 $\{\quad, \neg\}$ 表达, 则必可用 $\{\Leftrightarrow, \neg\}$ 表达, 其逆亦真。故 $\{\quad, \neg\}$ 也必不是最小联结词组。

(8) 证明 $\{\vee\}, \{\wedge\}$ 和 $\{\rightarrow\}$ 不是最小联结词组。

证明: 若 $\{\vee\}, \{\wedge\}$ 和 $\{\rightarrow\}$ 是最小联结词, 则

$$\neg P \Leftrightarrow (P \vee P \vee \dots)$$

$$\neg P \Leftrightarrow (P \wedge P \wedge \dots)$$

$$\neg P \Leftrightarrow P \rightarrow (P \rightarrow (P \rightarrow \dots))$$

对所有命题变元指派 T, 则等价式左边为 F, 右边为 T, 与等价表达式矛盾。

所以 $\{\vee\}, \{\wedge\}$ 和 $\{\rightarrow\}$ 不是最小联结词。

(9) 证明 $\{\neg, \rightarrow\}$ 和 $\{\neg, \vee\}$ 是最小联结词组。

证明: 因为 $\{\neg, \vee\}$ 为最小联结词组, 且 $P \vee Q \Leftrightarrow \neg P \rightarrow Q$

所以 $\{\neg, \rightarrow\}$ 是功能完备的联结词组，又 $\{\neg\}$, $\{\rightarrow\}$ 都不是功能完备的联结词组。

所以 $\{\neg, \rightarrow\}$ 是最小联结词组。

又因为 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$ ，所以 $\{\neg, \wedge\}$ 是功能完备的联结词组，又 $\{\neg\}$, $\{\wedge\}$ 不是功能完备的联结词组，

所以 $\{\neg, \wedge\}$ 是最小联结词组。

习题 1-7

(1) 解：

$$P \wedge (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q)$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee (\neg Q \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

(2) 解：

a) $(\neg P \wedge Q) \rightarrow R$

$$\Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)$$

b) $P \rightarrow ((Q \wedge R) \rightarrow S)$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg(Q \wedge R) \vee S)$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg R \wedge S) \vee (\neg R \wedge \neg S) \vee (S \wedge P) \vee (S \wedge \neg P)$$

c) $\neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \rightarrow T)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \wedge (\neg S \vee T)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge T)$$

d) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$e) \neg (P \wedge Q) \wedge (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge P) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge P) \vee (\neg Q \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge P)$$

(3) 解:

$$a) P \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee \neg P) \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$b) \neg (P \rightarrow Q) \vee (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P \vee Q)$$

$$c) \neg (P \rightarrow Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge \neg Q$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P)$$

$$d) (P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$e) (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P) \wedge (Q \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P)$$

(4) 解:

$$a) (\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \leftrightarrow \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg P \vee \neg Q) \vee (P \leftrightarrow \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow \Sigma_{1, 2, 3}$$

$$\Leftrightarrow P \vee Q = \Pi_0$$

$$b) Q \wedge (P \vee \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (Q \wedge \neg Q)$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q = \Sigma_3$$

$$\Leftrightarrow \Pi_{0, 1, 2}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

$$c) P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$$

$$\Leftrightarrow P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$$

$$\Leftrightarrow P \vee Q \vee R = \Pi_0$$

$$\Leftrightarrow \Sigma_{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}$$

$$= (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$

$$\vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$$

$$\vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$d) (P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge (Q \wedge R)) \vee$$

$$((\neg Q \wedge \neg R) \wedge \neg P) \vee ((\neg Q \wedge \neg R)$$

$$\wedge (Q \wedge R))$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) = \Sigma_{0, 7}$$

$$\Leftrightarrow \Pi_{1, 2, 3, 4, 5, 6}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$$

$$\wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$$

$$\wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$e) P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \wedge (\neg Q \vee P))$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P)$$

$$\Leftrightarrow T \vee (T \wedge \neg Q) \Leftrightarrow T$$

$$\Leftrightarrow \Sigma_{0, 1, 2, 3} = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$f) (Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P) \wedge \neg P \wedge Q$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P) \wedge \neg (P \vee \neg Q) \Leftrightarrow F$$

$$\Leftrightarrow \Pi_{0,1,2,3} = (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

(5) 证明:

a)

$$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$$

$$A \rightarrow (B \wedge C)$$

$$\Leftrightarrow \neg A \vee (B \wedge C)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$$

b)

$$(A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\neg A \vee B) \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow A \wedge (B \vee \neg B)$$

$$\Leftrightarrow A \wedge T$$

$$\Leftrightarrow A$$

$$(\neg A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$$

$$\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$$

$$\Leftrightarrow A \vee (B \wedge \neg B)$$

$$\Leftrightarrow A \vee F$$

$$\Leftrightarrow A$$

c)

$$A \wedge B \wedge (\neg A \vee \neg B)$$

$$\Leftrightarrow ((A \wedge \neg A) \vee (A \wedge \neg B)) \wedge B$$

$$\Leftrightarrow A \wedge B \wedge \neg B$$

$$\Leftrightarrow F$$

$$\neg A \wedge \neg B \wedge (A \vee B)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge A) \vee (\neg A \wedge B)) \wedge \neg B$$

$$\Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge B$$

$$\Leftrightarrow F$$

d)

$$A \vee (A \rightarrow (A \wedge B))$$

$$\Leftrightarrow A \vee \neg A \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow T$$

$$\neg A \vee \neg B \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow \neg (A \wedge B) \vee (A \wedge B)$$

$$\Leftrightarrow T$$

(6) 解: $A \Leftrightarrow R \uparrow (Q \wedge \neg (R \downarrow P))$, 则 $A^* \Leftrightarrow R \downarrow (Q \vee \neg (R \uparrow P))$

$$A \Leftrightarrow R \uparrow (Q \wedge \neg (R \downarrow P))$$

$$\Leftrightarrow \neg (R \wedge (Q \wedge (R \vee P)))$$

$$\Leftrightarrow \neg R \vee \neg Q \vee \neg (R \vee P)$$

$$\Leftrightarrow \neg (R \wedge Q) \vee \neg (R \vee P)$$

$$A^* \Leftrightarrow R \downarrow (Q \vee \neg (R \uparrow P))$$

$$\Leftrightarrow \neg (R \vee (Q \vee (R \wedge P)))$$

$$\Leftrightarrow \neg R \wedge \neg Q \wedge \neg (R \wedge P)$$

$$\Leftrightarrow \neg (R \vee Q) \wedge \neg (R \wedge P)$$

(7) 解: 设 A: A 去出差。B: B 去出差。C: C 去出差。D: D 去出差。

若 A 去则 C 和 D 中要去一个。 $A \rightarrow (C \vee D)$

B 和 C 不能都

去。 $\neg (B \wedge C)$

C 去则 D 要留下。 $C \rightarrow \neg D$

按题意应有: $A \rightarrow (C \vee D)$, $\neg (B \wedge C)$, $C \rightarrow \neg D$ 必须同时成立。

$$\text{因为 } C \vee D \Leftrightarrow (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)$$

$$\text{故 } (A \rightarrow (C \vee D)) \wedge \neg (B \wedge C) \wedge (C \rightarrow \neg D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)) \wedge \neg (B \wedge C)$$

$$\wedge (\neg C \vee \neg D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)) \wedge (\neg B \vee \neg C)$$

$$\wedge (\neg C \vee \neg D)$$

$$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)) \wedge ((\neg B \wedge \neg C)$$

$$\begin{aligned}
& \vee (\neg B \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge \neg D) \vee \neg C \\
& \Leftrightarrow \underline{(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C)} \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \\
& \vee \underline{(\neg A \wedge \neg C \wedge \neg D)} \vee (\neg A \wedge \neg C) \\
& \vee (\neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee \underline{(\neg C \wedge D \wedge \neg B \wedge \neg D)} \\
& \vee \underline{(\neg C \wedge D \wedge \neg C \wedge \neg D)} \\
& \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg C) \vee \underline{(\neg D \wedge C \wedge \neg B \wedge \neg C)} \\
& \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg B \wedge \neg D) \\
& \vee \underline{(\neg D \wedge C \wedge \neg C \wedge \neg D)} \vee \underline{(\neg D \wedge C \wedge \neg C)}
\end{aligned}$$

在上述的析取范式中，有些（画线的）不符合题意，舍弃，得

$$\begin{aligned}
& (\neg A \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee (\neg C \wedge D) \\
& \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg B)
\end{aligned}$$

故分派的方法为：B ∧ D，或 D ∧ A，或 C ∧ A。

(8) 解：设 P：A 是第一。Q：B 是第二。R：C 是第二。S：D 是第四。E：A 是第二。

由题意得 $(P \vee \neg Q) \wedge (R \vee \neg S) \wedge (E \vee \neg S)$

$$\begin{aligned}
& \Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \wedge ((R \wedge \neg S) \\
& \vee (\neg R \wedge S)) \wedge ((E \wedge \neg S) \vee (\neg E \wedge S)) \\
& \Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \\
& \vee (\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S) \\
& \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S)) \wedge ((E \wedge \neg S) \vee (\neg E \wedge S))
\end{aligned}$$

因为 $(P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S)$ 与 $(\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S)$ 不合题意，所以原式可化为

$$\begin{aligned}
& ((P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \\
& \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S)) \wedge ((E \wedge \neg S) \\
& \vee (\neg E \wedge S)) \\
& \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S \wedge E \wedge \neg S) \\
& \vee (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S \wedge \neg E \wedge S) \\
& \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge E \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge \neg E \wedge S) \\
& \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S \wedge E)
\end{aligned}$$

$$\vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge \neg E)$$

因 R 与 E 矛盾, 故 $\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge \neg E$ 为真,
即 A 不是第一, B 是第二, C 不是第二, D 为
第四, A 不是第二。

于是得: A 是第三 B 是第二 C 是第一
D 是第四。

习题 1-8

(1) 证明:

$$\text{a) } \neg (P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg R \Rightarrow \neg P$$

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) $\neg R$ | P |
| (2) $\neg Q \vee R$ | P |
| (3) $\neg Q$ | (1) (2) T, I |
| (4) $\neg (P \wedge \neg Q)$ | P |
| (5) $\neg P \vee Q$ | (4) T, E |
| (6) $\neg P$ | (3) (5) T, I |

$$\text{b) } J \rightarrow (M \vee N), (H \vee G) \rightarrow J, H \vee G \Rightarrow M \vee N$$

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) $(H \vee G) \rightarrow J$ | P |
| (2) $(H \vee G)$ | P |
| (3) | |
| J | (1) (2) T, I |
| (4) $J \rightarrow (M \vee N)$ | P |
| (5) $M \vee N$ | (3) (4) T, I |

$$\text{c) } B \wedge C, (B \leftrightarrow C) \rightarrow (H \vee G) \Rightarrow G \vee H$$

- | | |
|---------------------------|--------------|
| (1) $B \wedge C$ | P |
| (2) B | (1) T, I |
| (3) C | (1) T, I |
| (4) $B \vee \neg C$ | (2) T, I |
| (5) $C \vee \neg B$ | (3) T, I |
| (6) $C \rightarrow B$ | (4) T, E |
| (7) $B \rightarrow C$ | (5) T, E |
| (8) $B \leftrightarrow C$ | (6) (7) T, E |

(9) $(B \leftrightarrow C) \rightarrow (H \vee G)$ P
 (10) $H \vee G$ (8) (9) T, I
 d) $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg (\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$
 (1) $(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$
 (2) $\neg Q \vee R$ (1) T, I
 (3) $\neg R$ (1) T, I
 (4) $\neg Q$ (2) (3) T
 (5) $P \rightarrow Q$ P
 (6) $\neg P$ (4) (5) T
 (7) $\neg S$ (6) (7) T, I

(7) $\neg (\neg P \wedge \neg S)$ P
 (8) $P \vee \neg S$ (7) T, E
 (9) $\neg S$ (6) (8) T, I
 (2) 证明:
 a) $\neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C$
 (1) $\neg A \vee B$ P
 (2) A (1) T, I
 (3) C

(1) T, I

(4) $\neg A \vee B$

(5) $\neg B$

(2) (4) T, I

(6) $C \rightarrow \neg B$

(7) $\neg B$

(3) (6) T, I

(8) $B \wedge \neg B$

矛盾。(5), (7)

b) $A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \wedge D) \rightarrow E, \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F)$

(1) $\neg (A \rightarrow (B \rightarrow F))$

(2) A

(1) T, I

(3) $\neg (B \rightarrow (1) T)$

(4) B

(3) T, I

(5) $\neg F$

(3) T,

(6) $A \rightarrow (B \rightarrow C)$

(7)	B	→	(8) (11) T, I	
C			(13) (C ∧ D)	→
(2) (6) T, I			E P	
(8)			(14)	
C			E	
(4) (7) T, I			(12) (13) T, I	
(9) $\neg F \rightarrow (D \wedge \neg$			(15)	\neg
E) P			E	
(10) D ∧ \neg			(10) T, I	
E (5)			(16) E ∧ \neg	矛
(9) T, I			E	
(11)			盾。(14), (15)	
D			c) $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$	
(10) T, I			(1) $\neg (A$	→
(12) C ∧			F)	P
D			(2)	

$$\text{d) } A \rightarrow (B \wedge C), \neg B \vee D, (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D, B \rightarrow (A \wedge \neg E) \Rightarrow B \rightarrow E$$

(1)	\neg	(B	\rightarrow
E)		P	
(2)			
B			
	(1) T, I		
(3)			\neg
E			
	(1) T, I		
(4)	\neg	B	\vee
D			
P			
(5)			
D			
	(2) (4) T, I		
(6)	(E \rightarrow \neg F)		\rightarrow \neg
D		P	

(7)	\neg	(E	\rightarrow	\neg
F)				(5) (6) T,
I				
(8)				
E				
	(7) T, I			
(9)	E	\wedge	\neg	
E				
矛盾				
e) (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D), (B \rightarrow E) \wedge (D \rightarrow F), \neg (E \wedge				
F), A \rightarrow C \Rightarrow \neg A				
(1) (A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D)				P
(2)	A			\rightarrow
B				
(1) T, I				
(3)	(B \rightarrow E)	\wedge	(D \rightarrow	

F)		P		F		(
(4)		B	→	5) (8) T, I		
E				(10)	C	→
(3) T, I				D		
(5)		A	→	(1) T, I		
E				(11)	D	→
(2) (4) T, I				F		
(6)	¬	(E	∧	(3) T, I		
F)			P	(12)	C	→
(7)	¬	E	∨	F		
F			(6) T,	(10) (10) T, I		
E				(13)	A	→
(8)	E	→	¬	C		
F			(P		
7) T, E				(14)	A	→
(9)	A	→	¬	F		

(13) (12) T, I
 (15) \neg F \rightarrow \neg
 A (14) T, E
 (16) A \rightarrow \neg
 A (9)
 (15) T, I
 (17) \neg A \vee \neg
 A (16) T, E
 (18) \neg
 A
 (17) T, E

(3) 证明:

a) $\neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C$

(1)

A

P

(2) \neg A \vee
 B P
 (3) B
 (1) (2) T, I
 (4) C \rightarrow \neg
 B P
 (5) \neg
 C (
 3) (4) T, I
 (6) A \rightarrow \neg
 C CP

b) $A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \wedge D) \rightarrow E, \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F)$

(1) A

P

(2) $A \rightarrow (B \rightarrow C)$

P

(3)	B	→	(14) $A \rightarrow (B \rightarrow F)$	CP
C	(1) (2) T, I		c) $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$	
(4) B	P		(1)	
(5)			A	
C	(3) (4) T, I		P	
(6) $(C \wedge D) \rightarrow E$	P		(2)	A \vee
(7) $C \rightarrow (D \rightarrow E)$	(6) T, E		B	(1) T, I
(8)	D	→	(3) $A \vee B \rightarrow C \vee D$	P
E	(5) (7) T, I		(4)	C \wedge
(9) $\neg D \vee E$	(8) T, E		D	(2) (3)
(10) $\neg (D \wedge \neg E)$	(9) T, E		T, I	
(11) $\neg F \rightarrow (D \wedge \neg E)$	P		(5)	
(12)			D	
F	(10) (11) T, I		(4) T, I	
(13)	B	→	(6)	D \vee
F	CP		E	(5) T, I

(7) $D \vee E \rightarrow F$	P	F)	(3) (4) T, I
(8)		(6)	
F		E	(5) T
(6) (7) T, I		, I	
(9)	A	(7)	B
F	CP	E	CP
d) $A \rightarrow (B \wedge C), \neg B \vee D, (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D, B \rightarrow (A \wedge \neg E) \Rightarrow B \rightarrow E$			
(1)		(4) 证明:	
B		a) $R \rightarrow \neg Q, R \vee S, S \rightarrow \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$	
P (附加前提)		(1)	R \rightarrow \neg
(2) $\neg B \vee D$	P	Q	P
(3)		(2)	R \vee
D	(1) (2) T, I	S	P
(4) $(E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D$	P	(3)	S \rightarrow \neg
(5)	\neg (E \rightarrow \neg	Q	P
		(4)	\neg
		Q	(1)

(2) (3) T, I

(5) P

Q

(6)

P

(5) T, I

b) $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R, \neg P \leftrightarrow Q \Rightarrow P$

证法一:

(1) S

R

(2)

R

(3)

S

) T, I

(4) S \rightarrow

\rightarrow

P

\neg

(4)

\vee

P

\neg

P

(1) (2

\neg

Q

(5)

Q

(6)

$P \leftrightarrow Q$

(7) $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg P)$

(8) $\neg P \rightarrow$

Q

(7) T, I

(9)

P

(5) (8) T

, I

证法二: (反证法)

(1)

P

加前提)

(2)

P

\neg

(3) (4) T, I

\neg

P

(6) T, E

P

\rightarrow

\neg

\neg

\neg

\neg

\neg

\neg

P (附

\neg

\neg

$P \leftrightarrow Q$	P	7) (8) T, I
(3) $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg P)$	(2) T, E	(10)
(4) $\neg P$	\rightarrow	R
Q	(3) T, I	(11)
(5)		$\neg R$
Q		矛盾 (9)
(1) (4) T, I		(10) T, I
(6) $S \rightarrow \neg P$		c) $\neg (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg (R \vee S), ((Q \rightarrow P) \vee \neg R),$
Q	P	$R \Rightarrow P \leftrightarrow Q$
(7)	\neg	(1)
S	(5)	R
(6) T, I		P
(8) $S \vee P$	\vee	(2) $(Q \rightarrow P) \vee \neg$
R	P	R
(9)		(3) $P \rightarrow$
R	(P
	(2) T, I	(1)

(4) $\neg (P \rightarrow Q) \rightarrow \neg (R \vee S)$ P
 (5) $(R \vee S) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ (4) T, E
 (6) R \vee S (1) T, I
 (7) P \rightarrow Q (5) T, I
 (8) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ (3) (7) T, I
 (9) $P \leftrightarrow Q$ (8) T, E

(5) 解:

a) 设 P : 我跑步。 Q : 我很疲

劳。

前提为: $P \rightarrow Q, \neg Q$

(1) P \rightarrow Q
 (2) $\neg Q$
 (3) P
 (1) (2) T, I

结论为: $\neg P$, 我没有跑步。

b) 设 S: 他犯了错误。 R: 他神色慌张。

前提为: $S \rightarrow R, R$

因为 $(S \rightarrow R) \wedge R \leftrightarrow (\neg S \vee R) \wedge R \leftrightarrow R$ 。故
 本题没有确定的结论。

实际上, 若 $S \rightarrow R$ 为真, R 为真,
 则 S 可为真, S 也可为假, 故无有效结论。

c) 设 P: 我的程序通过。 Q: 我很快乐。

R: 阳光很好。 S: 天很暖和。(把

晚上十一点理解为阳光不好)

前提为: $P \rightarrow Q$, $Q \rightarrow R$, $\neg R \wedge S$

(1) $P \rightarrow$

Q P

(2) $Q \rightarrow$

R P

(3) $P \rightarrow$

R (1) (2) T, I

(4) $\neg R \vee$

S P

(5) \neg

R (4) T, I

(6) \neg

P (3) (5) T

, I

结论为: $\neg P$, 我的程序没有通过

习题 2-1, 2-2

(1) 解:

a) 设 $W(x)$: x 是工人。 c : 小张。

则有 $\neg W(c)$

b) 设 $S(x)$: x 是田径运动员。 $B(x)$: x 是球类运动员。 h : 他

则有 $S(h) \vee B(h)$

c) 设 $C(x)$: x 是聪明的。 $B(x)$: x 是美丽的。 l : 小莉。

则有 $C(l) \wedge B(l)$

d) 设 $O(x)$: x 是奇数。

则有 $O(m) \rightarrow \neg O(2m)$ 。

e) 设 $R(x)$: x 是实数。 $Q(x)$: x 是有理数。

则有 $(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$

f) 设 $R(x)$: x 是实数。 $Q(x)$: x 是有理数。

则有 $(\exists x)(R(x) \wedge Q(x))$

g) 设 $R(x)$: x 是实数。 $Q(x)$: x 是有理数。

则有 $\neg(\forall x)(R(x) \rightarrow Q(x))$

h) 设 $P(x, y)$: 直线 x 平行于直线 y

$G(x, y)$: 直线 x 相交于直线 y 。

则有 $P(A, B) \leftrightarrow \neg G(A, B)$

(2) 解:

a) 设 $J(x)$: x 是教练员。 $L(x)$: x 是运动员。

则有 $(\forall x)(J(x) \rightarrow L(x))$

b) 设 $S(x)$: x 是大学生。 $L(x)$: x 是运动员。

则有 $(\exists x)(L(x) \wedge S(x))$

c) 设 $J(x)$: x 是教练员。 $O(x)$: x 是年老的。

$V(x)$: x 是健壮的。

则有 $(\exists x)(J(x) \wedge O(x) \wedge V(x))$

d) 设 $O(x)$: x 是年老的。 $V(x)$: x 是健壮的。

j : 金教练

则有 $\neg O(j) \wedge \neg V(j)$

e) 设 $L(x)$: x 是运动员。 $J(x)$: x 是教练员。

则 $\neg(\forall x)(L(x) \rightarrow J(x))$

本题亦可理解为: 某些运动员不是教练。

故 $(\exists x)(L(x) \wedge \neg J(x))$

f) 设 $S(x)$: x 是大学生。 $L(x)$: x 是运动员。

$C(x)$: x 是国家选手。

则有 $(\exists x)(S(x) \wedge L(x) \wedge C(x))$

g) 设 $C(x)$: x 是国家选手。 $V(x)$: x 是健壮的。

则有 $(\forall x)(C(x) \rightarrow V(x))$ 或 $\neg(\exists x)(C(x) \wedge \neg V(x))$

h) 设 $C(x)$: x 是国家选手。 $O(x)$: x 是老的。

$L(x)$: x 是运动员。

则有 $(\forall x)(O(x) \wedge C(x) \rightarrow L(x))$

i) 设 $W(x)$: x 是女同志。 $H(x)$: x 是家庭妇女。 $C(x)$: x 是国家选手。

则有 $\neg(\exists x)(W(x) \wedge C(x) \wedge H(x))$

j) $W(x)$: x 是女同志。 $J(x)$: x 是教练。

$C(x)$: x 是国家选手。

则有 $(\exists x)(W(x) \wedge J(x) \wedge C(x))$

k) $L(x)$: x 是运动员。 $J(y)$: y 是教练。

$A(x, y)$: x 钦佩 y 。

则有 $(\forall x)(L(x) \rightarrow (\exists y)(J(y) \wedge A(x, y)))$

l) 设 $S(x)$: x 是大学生。 $L(x)$: x 是运动员。 $A(x, y)$: x 钦佩 y 。

则 $(\exists x)(S(x) \wedge (\forall y)(L(y) \rightarrow \neg A(x, y)))$

习题 2-3

(1) 解:

a) 5 是质数。

b) 2 是偶数且 2 是质数。

c) 对所有的 x , 若 x 能被 2 除尽, 则 x 是偶数。

d) 存在 x , x 是偶数, 且 x 能除尽 6。(即某些偶数能除尽 6)

e) 对所有的 x , 若 x 不是偶数, 则 x 不能被 2 除尽。

f) 对所有的 x , 若 x 是偶数, 则对所有的 y , 若 x 能除尽 y , 则 y 也是偶数。

g) 对所有的 x , 若 x 是质数, 则存在 y , y 是偶数且 x 能除尽 y (即所有质数能除尽某些偶数)。

h) 对所有的 x , 若 x 是奇数, 则对所有 y , y 是质数, 则 x 不能除尽 y (即任何奇数不能除尽任何质数)。

(2) 解: $(\forall x)(\forall y)((P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x,y) \rightarrow (\exists! z)(L(z) \wedge R(x,y,z)))$

或 $(\forall x)(\forall y)((P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x,y) \rightarrow (\exists z)(L(z) \wedge R(x,y,z) \wedge \neg (\exists u)(\neg E(z,u) \wedge L(u) \wedge R(x,y,u))))$

(3) 解:

a) 设 $N(x):x$ 是有限个数的乘积。 $z(y):y$ 为 0。

$P(x):x$ 的乘积为零。 $F(y):y$ 是乘积中的一个因子。

则有 $(\forall x)((N(x) \wedge P(x) \rightarrow (\exists y)(F(y) \wedge z(y)))$

b) 设 $R(x):x$ 是实数。 $Q(x,y):y$ 大于 x 。
故 $(\forall x)(R(x) \rightarrow (\exists y)(Q(x,y) \wedge R(y)))$

c) $R(x):x$ 是实数。 $G(x,y):x$ 大于 y 。 则

$(\exists x)(\exists y)(\exists z)(R(x) \wedge R(y) \wedge R(z) \wedge G(x+y,x \cdot z)$

(4) 解: 设 $G(x,y):x$ 大于 y 。 则有 $(\forall x)(\forall y)(\forall z)(G(y,x) \wedge G(0,z) \rightarrow G(x \cdot z, y \cdot z))$

(5) 解: 设 $N(x):x$ 是一个数。 $S(x,y):y$ 是 x 的后继数。 $E(x,y):x=y$ 。 则

a) $(\forall x)(N(x) \rightarrow (\exists! y)(N(y) \wedge S(x,y)))$

或 $(\forall x)(N(x) \rightarrow (\exists y)(N(y) \wedge S(x,y) \wedge \neg (\exists z)(\neg E(y,z) \wedge N(z) \wedge S(x,z))))$

b) $\neg (\exists x)(N(x) \wedge S(x,1))$

c) $(\forall x)(N(x) \wedge \neg S(x,2) \rightarrow (\exists! y)(N(y) \wedge S(y,x)))$

或 $(\forall x)(N(x) \wedge \neg S(x,2) \rightarrow (\exists y)(N(y) \wedge S(y,x) \wedge \neg (\exists z)(\neg E(y,z) \wedge N(z) \wedge S(z,x))))$

(6) 解: 设 $S(x):x$ 是大学生。 $E(x):x$ 是戴眼睛

的。

$F(x)$: x 是用功的。 $R(x,y)$: x 在看 y 。

$G(y)$: y 是大的。 $K(y)$: y 是厚的。 $J(y)$: y 是巨著。 a :这本。 b :那位。

则有 $E(b) \wedge F(b) \wedge S(b) \wedge R(b,a) \wedge G(a) \wedge K(a) \wedge J(a)$

(7) 解: 设 $P(x,y)$: x 在 y 连续。 $Q(x,y)$: $x > y$ 。
则

$$P(f,a) \Leftrightarrow ((\forall \varepsilon)(\exists \delta)(\forall x)(Q(\varepsilon,0) \rightarrow (Q(\delta,0) \wedge Q(\delta,|x-a|) \rightarrow Q(\varepsilon,|f(x)-f(a)|))))$$

习题 2-4

(1) 解: a) x 是约束变元, y 是自由变元。

b) x 是约束变元, $P(x) \wedge Q(x)$ 中的 x 受全称量词 \forall 的约束, $S(x)$ 中的 x 受存在量词 \exists 的约束。

c) x, y 都是约束变元, $P(x)$ 中的 x 受 \exists 的约束,

$R(x)$ 中的 x 受 \forall 的约束。

d) x, y 是约束变元, z 是自由变元。

(2) 解: a) $P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)$

b) $R(a) \wedge R(b) \wedge R(c) \wedge S(a) \wedge S(b) \wedge S(c)$

c) $(P(a) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(b) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(c) \rightarrow Q(c))$

d)

$(\neg P(a) \wedge \neg P(b) \wedge \neg P(c)) \vee (P(z) \wedge P(b) \wedge P(c))$

e) $(R(a) \wedge R(b) \wedge R(c)) \wedge (S(a) \vee S(b) \vee S(c))$

(3) 解:

a)

$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (P(1) \vee Q(1)) \wedge (P(2) \vee Q(2))$,

但 $P(1)$ 为 T, $Q(1)$ 为 F, $P(2)$ 为 F, $Q(2)$ 为 T, 所以

$(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (T \vee F) \wedge (F \vee T) \Leftrightarrow T$ 。

b) $(\forall x)(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a) \Leftrightarrow$

$((P \rightarrow Q(-2)) \wedge (P \rightarrow Q(3)) \wedge (P \rightarrow Q(6))) \vee R(a)$

因为 P 为 T, Q(-2)为 T, Q(3)为 T, Q(6)为 F, R(5)为 F, 所以

$$(\forall x)(P \rightarrow Q(x)) \vee R(a) \Leftrightarrow$$

$$((T \rightarrow T) \wedge (T \rightarrow T) \wedge (T \rightarrow F)) \vee F \Leftrightarrow F$$

(4) 解: a) $(\forall u)(\exists v)(P(u, z) \rightarrow Q(v)) \Leftrightarrow S(x, y)$

b) $(\forall u)(P(u) \rightarrow$

$$(R(u) \vee Q(u)) \wedge (\exists v)R(v) \rightarrow (\exists z)S(x, z)$$

(5) 解: a) $((\exists y)A(u, y) \rightarrow (\forall x)B(x, v)) \wedge (\exists x)(\forall z)C(x, t, z)$

b) $((\forall y)P(u, y) \wedge (\exists z)Q(u, z)) \vee (\forall x)R(x, t)$

习题 2-5

(1) 解 :

a) $P(a, f(a)) \wedge P(b, f(b)) \Leftrightarrow P(1, f(1)) \wedge P(2, f(2)) \Leftrightarrow P(1, 2) \wedge P(2, 1) \Leftrightarrow T \wedge F \Leftrightarrow F$

b) $(\forall x)(\exists y)P(y, x) \Leftrightarrow (\forall x) (P(1, x) \vee P(2, x)) \Leftrightarrow$

$$(P(1, 1) \vee P(2, 1)) \wedge (P(1, 2) \vee P(2, 2))$$

$$\Leftrightarrow (T \vee F) \wedge (T \vee F) \Leftrightarrow T$$

c) $(\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow P(f(x), f(y)))$

$$\Leftrightarrow (\forall x) ((P(x, 1) \rightarrow P(f(x), f(1))) \wedge (P(x, 2) \rightarrow P(f(x), f(2))))$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(P(1, 1) \rightarrow P(f(1), f(1))) \wedge (P(1, 2) \rightarrow P(f(1), f(2)))$$

$$\wedge (P(2, 1) \rightarrow P(f(2), f(1))) \wedge (P(2, 2) \rightarrow P(f(2), f(2)))$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(P(1, 1) \rightarrow P(2, 2)) \wedge (P(1, 2) \rightarrow P(2, 1)) \wedge (P(2, 1) \rightarrow P(1, 2)) \wedge (P(2, 2) \rightarrow P(1, 1))$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(T \rightarrow F \wedge (T \rightarrow F) \wedge (F \rightarrow T) \wedge (F \rightarrow T)) \Leftrightarrow F \wedge F \wedge T \wedge T \Leftrightarrow F$$

(2) 解: a) $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(f(x), a))$

$$\Leftrightarrow (P(1) \rightarrow Q(f(1), 1)) \wedge (P(2) \rightarrow Q(f(2), 1))$$

$$\Leftrightarrow (F \rightarrow Q(2, 1)) \wedge (T \rightarrow Q(1, 1))$$

$$\Leftrightarrow (F \rightarrow F) \wedge (T \rightarrow T) \Leftrightarrow T$$

$$b) (\exists x)(P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$$

$$\Leftrightarrow (P(f(1)) \wedge Q(1, f(1))) \quad \vee$$

$$(P(f(2)) \wedge Q(2, f(1))) \Leftrightarrow (T \wedge T) \vee (F \wedge F) \Leftrightarrow T$$

$$c) (\exists x)(P(x) \wedge Q(x, a))$$

$$\Leftrightarrow (P(1) \wedge Q(1, a)) \vee (P(2) \wedge Q(2, a))$$

$$\Leftrightarrow (P(1) \wedge Q(1, 1)) \vee (P(2) \wedge Q(2, 1))$$

$$\Leftrightarrow (F \wedge T) \vee (T \wedge F) \Leftrightarrow F$$

$$d) (\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(x, y))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(P(x) \wedge (\exists y)Q(x, y))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(P(x) \wedge (Q(x, 1) \vee Q(x, 2)))$$

$$\Leftrightarrow (P(1) \wedge (Q(1, 1) \vee$$

$$Q(1, 2))) \wedge (P(2) \wedge (Q(2, 1) \vee Q(2, 2)))$$

$$\Leftrightarrow (F \wedge (T \vee T)) \wedge (T \wedge (F \vee F)) \Leftrightarrow F$$

(3) 举例说明下列各蕴含式。

$$a) \neg((\exists x)(P(x) \wedge Q(a)) \Rightarrow (\exists x)P(x) \rightarrow \neg Q(a))$$

$$b) (\forall x)(\neg P(x) \rightarrow Q(x)), (\forall x) \neg Q(x) \Rightarrow P(a)$$

$$c) (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)), (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$$

$$d) (\forall x)(P(x) \vee Q(x)), (\forall x) \neg P(x) \Rightarrow (\exists x)Q(x)$$

$$e) (\forall x)(P(x) \vee Q(x)), (\forall x) \neg P(x) \Rightarrow (\forall x)Q(x)$$

解：a) 因为 $\neg((\exists x)(P(x) \wedge Q(a)) \Leftrightarrow \neg(\exists x)P(x) \vee \neg Q(a)$

故原式为 $\neg(\exists x)P(x) \vee \neg Q(a) \Rightarrow (\exists x)P(x) \rightarrow \neg Q(a)$

设 $P(x)$: x 是大学生。 $Q(x)$: x 是运动员

前提 或者不存在 x , x 是大学生, 或者 a 是运动员

结论 如果存在 x 是大学生, 则必有 a 是运动员。

b) 设 $P(x)$: x 是研究生。 $Q(x)$: x 是大学生。

a : 论域中的某人。

前提：对论域中所有 x ，如果 x 不是研究生则 x 是大学生。

对论域中所有 x ， x 不是大学生。

结论：对论域中所有 x 都是研究生。

故，对论域中某个 a ，必有结论 a 是研究生，即 $P(a)$ 成立。

c) 设 $P(x)$: x 是研究生。 $Q(x)$: x 曾读过大学。 $R(x)$: x 曾读过中学。

前提 对所有 x ，如果 x 是研究生，则 x 曾读过大学。

对所有 x ，如果 x 曾读过大学，则 x 曾读过中学。

结论：对所有 x ，如果 x 是研究生，则 x 曾读过中学。

d) 设 $P(x)$: x 是研究生。 $Q(x)$: x 是运动员。

前提 对所有 x ，或者 x 是研究生，或者 x 是运

动员。

对所有 x ， x 不是研究生

结论 必存在 x ， x 是运动员。

e) 设 $P(x)$: x 是研究生。 $Q(x)$: x 是运动员。

前提 对所有 x ，或者 x 是研究生，或者 x 是运动员。

对所有 x ， x 不是研究生

结论 对所有 x ， x 是运动员。

(4) 证明: $(\exists x)(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow (\exists x) (\neg A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x) \neg A(x) \vee (\exists x) B(x)$

$\Leftrightarrow \neg (\forall x) A(x) \vee (\exists x) B(x) \Leftrightarrow (\forall x) A(x) \rightarrow (\exists x) B(x)$

(5) 设论域 $D=\{a, b, c\}$ ，求证 $(\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x) \Rightarrow (\forall x) (A(x) \vee B(x))$

证明：因为论域 $D=\{a, b, c\}$ ，所以

$(\forall x) A(x) \vee (\forall x) B(x) \Leftrightarrow (A(a) \wedge A(b) \wedge A(c)) \vee$

$$(B(a) \wedge B(b) \wedge B(c))$$

$$\Leftrightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(a) \vee B(b)) \wedge (A(a) \vee B(c)) \wedge (A(b) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(b) \vee B(c)) \wedge (A(c) \vee B(a)) \wedge (A(c) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c))$$

$$\Rightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$$

$$\text{所以 } (\forall x)A(x) \vee (\forall x)B(x) \Rightarrow (\forall x)(A(x) \vee B(x))$$

(6) 解：推证不正确，因为

$$\neg (\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x)) \Leftrightarrow \neg ((\exists x)A(x) \wedge (\exists x)\neg B(x))$$

$$(7) \text{ 求证 } (\forall x)(\forall y)(P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y)$$

$$\text{证明： } (\forall x)(\forall y)(P(x) \rightarrow Q(y))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\neg P(x) \vee Q(y))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x) \neg P(x) \vee (\forall y)Q(y)$$

$$\Leftrightarrow \neg (\exists x)P(x) \vee (\forall y)Q(y)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)P(x) \rightarrow (\forall y)Q(y)$$

习题 2-6

$$(1) \text{ 解： a) } (\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)Q(x,y))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\neg P(x) \vee (\exists y)Q(x,y))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\exists y)(\neg P(x) \vee Q(x,y))$$

$$\text{b) } (\exists x)(\neg ((\exists y)P(x,y)) \rightarrow ((\exists z)Q(z) \rightarrow R(x)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)((\exists y)P(x,y) \vee ((\exists z)Q(z) \rightarrow R(x)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)((\exists y)P(x,y) \vee (\neg (\exists z)Q(z) \vee R(x)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)((\exists y)P(x,y) \vee ((\forall z)\neg Q(z) \vee R(x)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\exists y)(\forall z)(P(x,y) \vee \neg Q(z) \vee R(x))$$

$$\text{c) } (\forall x)(\forall y)((\exists z)P(x,y,z) \wedge (\exists u)Q(x,u)) \rightarrow (\exists v)Q(y,v)$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\neg ((\exists z)P(x,y,z) \wedge (\exists u)Q(x,u)) \vee$$

$$(\exists v)Q(y,v))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((\forall z)\neg P(x,y,z) \vee (\forall u)\neg Q(x,u) \vee (\exists v)Q(y,v))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((\forall z)\neg P(x,y,z) \vee (\forall u)\neg Q(x,u) \vee (\exists v)Q(y,v))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\forall z)(\forall u)(\exists v)(\neg P(x,y,z) \vee \neg Q(x,u) \vee Q(y,v))$$

(2) 解: a) $((\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)) \rightarrow (\exists x)(P(x) \vee Q(x))$

$$\Leftrightarrow \neg ((\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)) \vee (\exists x)(P(x) \vee Q(x))$$

$$\Leftrightarrow \neg (\exists x)(P(x) \vee Q(x)) \vee (\exists x)(P(x) \vee Q(x))$$

$$\Leftrightarrow T$$

b) $(\forall x)(P(x) \rightarrow (\forall y)((\forall z)Q(x,y) \rightarrow \neg (\forall z)R(y,x)))$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\neg P(x) \vee (\forall y)(Q(x,y) \rightarrow \neg R(y,x)))$$

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)(\neg P(x) \vee \neg Q(x,y) \vee \neg R(y,x))$$

前束合取范式

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((P(x) \wedge Q(x,y) \wedge R(y,x))$$

$$\vee (P(x) \wedge Q(x,y) \wedge \neg R(y,x))$$

$$\vee (\neg P(x) \wedge \neg Q(x,y) \wedge R(y,x))$$

$$\vee (\neg P(x) \wedge Q(x,y) \wedge R(y,x))$$

$$\vee (\neg P(x) \wedge \neg Q(x,y) \wedge R(y,x))$$

$$\vee ((P(x) \wedge \neg Q(x,y) \wedge \neg R(y,x))$$

$$\vee (\neg P(x) \wedge Q(x,y) \wedge \neg R(y,x)))$$

前束析取范式

c) $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)((\forall z)Q(x,z) \vee (\forall z)R(x,y,z))$

$$\Leftrightarrow \neg (\forall x)P(x) \vee (\exists x)((\forall z)Q(x,z) \vee (\forall z)R(x,y,z))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) \neg P(x) \vee (\exists x)((\forall z)Q(x,z) \vee (\forall u)R(x,y,u))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x) \vee (\forall z)Q(x,z) \vee (\forall u)R(x,y,u))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(\forall z)(\forall u)(\neg P(x) \vee Q(x,z) \vee R(x,y,u))$$

前束合取范式

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow (\exists x) (\forall z) (\forall u) ((P(x) \wedge Q(x,z) \wedge R(x,y,u)) \\ &\quad \vee (P(x) \wedge Q(x,z) \wedge \neg R(x,y,u)) \\ &\quad \vee (P(x) \wedge \neg Q(x,z) \wedge R(x,y,u)) \\ &\quad \vee (P(x) \wedge \neg Q(x,z) \wedge \neg R(x,y,u)) \\ &\quad \vee (\neg P(x) \wedge Q(x,z) \wedge \neg R(x,y,u)) \\ &\quad \vee (\neg P(x) \wedge \neg Q(x,z) \wedge R(x,y,u)) \\ &\quad \vee (\neg P(x) \wedge \neg Q(x,z) \wedge \neg R(x,y,u))) \end{aligned}$$

前束析取范式

$$\begin{aligned} &d) (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x,y)) \rightarrow ((\exists y)P(y) \wedge (\exists z)Q(y,z)) \\ &\Leftrightarrow \neg (\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x,y)) \vee ((\exists y)P(y) \wedge \\ &\quad (\exists z)Q(y,z)) \\ &\Leftrightarrow (\exists x)(\neg P(x) \wedge \neg Q(x,y)) \vee ((\exists u)P(u) \wedge \\ &\quad (\exists z)Q(y,z)) \\ &\Leftrightarrow (\exists x) (\exists u) (\exists z) ((\neg P(x) \wedge \neg Q(x,y)) \vee (P(u) \\ &\quad \wedge Q(y,z))) \end{aligned}$$

前束析取范式

$$\Leftrightarrow (\exists x) (\exists u) (\exists z) ((\neg P(x) \vee P(u)) \wedge (\neg P(x) \vee Q(y,z)) \wedge (\neg Q(x,y) \vee P(u)) \wedge (\neg Q(x,y) \vee Q(y,z)))$$

前束合取范式

习题 2-7

(1)证明:

(2)a)	①	$(\forall x)(\neg A(x) \rightarrow B(x))$	P
	②	$\neg A(u) \rightarrow B(u)$	
	US①		
	③	$(\forall x) \neg B(x)$	
	P		
	④	$\neg B(u)$	
	US③		
	⑤	$A(u) \vee B(u)$	

US③	US③
⑤ $\neg B(u) \rightarrow \neg A(u)$	⑤ $\neg B(u)$
T②E	T②④I
⑥ $C(u) \rightarrow \neg A(u)$	⑥ $(\forall x)(A(x) \vee B(x))$
T④⑤I	P
⑦ $(\forall x)(C(x) \rightarrow \neg A(x))$	⑦ $A(u) \vee B(u)$
UG⑥	US
d) $(\forall x)(A(x) \vee B(x)), (\forall x)(B(x) \rightarrow \neg C(x)), (\forall x)C(x) \Rightarrow (\forall x)A(x)$	⑧ $A(u)$
① $(\forall x)(B(x) \rightarrow \neg C(x))$	T⑤⑦I
P	⑨ $(\forall x)A(x)$
② $B(u) \rightarrow \neg C(u)$	UG⑧
US①	(2) 证明:
③ $(\forall x)C(x)$	a) ① $(\forall x)P(x)$
P	P (附加前提)
④ $C(u)$	② $P(u)$
	US①

③ $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$

P

④ $P(u) \rightarrow Q(u)$

US③

⑤ $Q(u)$

T②④I

⑥ $(\forall x)Q(x)$

UG⑤

⑦ $(\forall x)P(x) \rightarrow (\forall x)Q(x)$

CP

b) 因为 $(\forall x)P(x) \vee (\exists x)Q(x) \Leftrightarrow \neg (\forall x)P(x) \rightarrow$

$(\exists x)Q(x)$

故本题就是推证 $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \neg$

$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$

① $\neg (\forall x)P(x)$

P (附加前提)

② $(\exists x) \neg P(x)$

T①E

③ $\neg P(c)$

ES②

④ $(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$

P

⑤ $P(c) \vee Q(c)$

ES④

⑥ $Q(c)$

T③⑤I

⑦ $(\exists x)Q(x)$

EG⑥

⑧ $\neg (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$

CP

(3)

解：a) 设 $R(x)$: x 是实数。 $Q(x)$: x 是有理数。

$I(x)$: x 是整数。

本题符号化为：

$$(\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x)) \wedge (\exists x)(Q(x) \wedge I(x)) \Rightarrow (\exists x)(R(x) \wedge I(x))$$

$$\textcircled{1} \quad (\exists x)(Q(x) \wedge I(x))$$

P

$$\textcircled{2} \quad Q(c) \wedge I(c)$$

ES①

$$\textcircled{3} \quad (\forall x)(Q(x) \rightarrow R(x))$$

P

$$\textcircled{4} \quad Q(c) \rightarrow R(c)$$

US③

$$\textcircled{5} \quad Q(c)$$

T②I

$$\textcircled{6} \quad R(c)$$

T④⑤I

⑦

I(c)

T②I

$$\textcircled{8} \quad R(c) \wedge I(c)$$

T⑥⑦I

$$\textcircled{9} (\exists x)(R(x) \wedge I(x))$$

EG⑧

b) 设 $P(x)$: x 喜欢步行。 $Q(x)$: x 喜欢乘汽车。

$R(x)$: x 喜欢骑自行车

本题符号化为：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x)), (\forall x)(Q(x) \vee R(x)), (\exists x)$$

$$\neg R(x) \Rightarrow (\exists x) \neg P(x)$$

$$\textcircled{1} \quad (\exists x) \neg R(x)$$

P

$$\textcircled{2} \quad \neg R(c)$$

ES①

③ $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$
P

④ $Q(c) \vee R(c)$
US③

⑤ $Q(c)$
T②④I

⑥ $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$
P

⑦ $P(c) \rightarrow \neg Q(c)$
US⑥

⑧ $\neg P(c)$
T⑤⑦I

⑨ $(\exists x) \neg P(x)$
EG⑧

c) 每个大学生不是文科学生就是理工科学生，有的大学生是优等生，小张不是理工科学生，但他

是优等生，因而如果小张是大学生，他就是文科学生。

设 $G(x)$: x 是大学生。 $L(x)$: x 是文科学生。
 $P(x)$: x 是理工科学生。

$S(x)$: x 是优秀生。 c : 小张。

本题符号化为:

$(\forall x)(G(x) \rightarrow L(x) \vee P(x)), (\exists x)(G(x) \wedge S(x)),$
 $\neg P(c), S(c) \Rightarrow G(c) \rightarrow L(c)$

① $G(c)$
P (附加前提)

② $(\forall x)(G(x) \rightarrow L(x) \vee P(x))$
P

③ $G(c) \rightarrow L(c) \vee P(c)$
US②

④ $L(c) \vee P(c)$
T①③I

⑤ \neg P (c)

P

⑥ L(c)

T④⑤I

⑦G(c) \rightarrow L(c)

CP

注意：本题推证过程中未用到前提 $(\exists x)(G(x) \wedge S(x))$ 以及 $S(c)$ 。主要是 $S(x)$ ： x 是优秀生，这个条件与其他前提的联系对证明结论没有影响，因 $S(x)$ 与其他前提不矛盾，故本题的推证仍是有效的。

3-5.1 列出所有从 $X=\{a,b,c\}$ 到 $Y=\{s\}$ 的关系。

解： $Z_1=\{<a,s>\}$
 $Z_2=\{<b,s>\}$
 $Z_3=\{<c,s>\}$
 $Z_4=\{<a,s>,<b,s>\}$
 $Z_5=\{<a,s>,<c,s>\}$
 $Z_6=\{<b,s>,<c,s>\}$
 $Z_7=\{<a,s>,<b,s>,<c,s>\}$

3-5.2 在一个有 n 个元素的集合上，可以有多少种不同的关系。

解 因为在 X 中的任何二元关系都是 $X \times X$ 的子集，而 $X \times X = X^2$ 中共有 n^2 个元素，取 0 个到 n^2 个元素，共可组成 2^{n^2} 个子集，即 $|\wp(X \times X)| = 2^{n^2}$ 。

3-5.3 设 $A=\{6:00, 6:30, 7:30, \dots, 9:30, 10:30\}$ 表示在晚上每隔半小时的九个时刻的集合，设 $B=\{3,12,15,17\}$ 表示本地四个电视频道的集合，设 R_1 和 R_2 是从 A 到 B 的两个二元关系，对于二元关系 $R_1, R_2, R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 \oplus R_2$ 和 $R_1 - R_2$ 可分别得出怎样的解释。

解： $A \times B$ 表示在晚上九个时刻和四个电视频道所组成的电视节目表。

R_1 和 R_2 分别是 $A \times B$ 的两个子集，例如 R_1 表示音乐节目播出的时间表， R_2 是戏曲节目的播出时间表，则 $R_1 \cup R_2$ 表示音乐或戏曲节目的播出时间表， $R_1 \cap R_2$ 表示音乐和戏曲一起播出的时间表， $R_1 \oplus R_2$ 表示音乐节目表以及戏曲节目表，但不是音乐和戏曲一起的节日表， $R_1 - R_2$ 表示不是戏曲时间的音乐节目时间表。

3-5.4 设 L 表示关系“小于或等于”， D 表示“整除”关系， L 和 D 均定义于 $\{1,2,3,6\}$ ，分别写出 L 和 D 的所有元素并求出 $L \cap D$ 。


解： $L=\{<1,2>,<1,3>,<1,6>,<2,3>,<2,6>,<3,6>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<6,6>\}$
 $D=\{<1,2>,<1,3>,<1,6>,<2,6>,<3,6>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<6,6>\}$
 $L \cap D = \{<1,2>,<1,3>,<1,6>,<2,6>,<3,6>,<1,1>,<2,2>,<3,3>,<6,6>\}$

3-5.5 对下列每一式，给出 A 上的二元关系，试给出关系图：

a) $\{<x,y> | 0 \leq x \wedge y \leq 3\}$ ，这里 $A=\{1,2,3,4\}$ ；
b) $\{<x,y> | 2 \leq x,y \leq 7 \text{ 且 } x \text{ 除尽 } y\}$ ，这里 $A=\{n | n \in \mathbb{N} \wedge n \leq 10\}$
c) $\{<x,y> | 0 \leq x-y < 3\}$ ，这里 $A=\{0,1,2,3,4\}$ ；
d) $\{<x,y> | x,y \text{ 是互质的}\}$ ，这里 $A=\{2,3,4,5,6\}$

解：

a) $R=\{<0,0>,<0,1>,<0,2>,<0,3>,<1,0>,<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,0>,<2,1>,<2,2>,<2,3>,<3,0>,<3,1>,<3,2>,<3,3>,\}$
其关系图



b) $R=\{<2,0>,<2,2>,<2,4>,<2,6>,<3,0>,<3,3>,<3,6>,<4,0>,<4,4>,<5,0>,<5,5>,<6,0>,<6,6>,<7,0>,<7,7>\}$

3-6.1 分析集合 $A=\{1, 2, 3\}$ 上的下述五个关系:

- (1) $R=\{<1, 1>, <1, 2>, <1, 3>, <3, 3>\}$;
- (2) $S=\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$;
- (3) $T=\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 2>, <2, 3>\}$;
- (4) \emptyset =空关系;
- (5) $A \times A$ =全域关系。

判断 A 中的上述关系是否为 a) 自反的, b) 对称的, c) 可传递的, d) 反对称的。



- 解 (1) R 是可传递和反对称的。
(2) S 是自反, 对称和可传递的。
(3) T 是反对称的。

- (4) 空关系是对称, 可传递和反对称的。
(5) 全域关系是自反, 对称和可传递的。

3-6.2 给定 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, 考虑 A 上的关系 R , 若 $R=\{<1, 3>, <1, 4>, <2, 3>, <2, 4>, <3, 4>\}$

- a) 在 $A \times A$ 的坐标图上标出 R , 并绘出它的关系图;
b) R 是 i) 自反的 ii) 对称的 iii) 可传递的, iv) 反对称的吗?

解
a)



R 是可传递的和反对称的; 但不是自反的和对称的。

3-6.3 举出 $A=\{1, 2, 3\}$ 上关系 R 的例子, 使其具有下述性质:

- a) 既是对称的, 又是反对称的;
- b) R 既不是对称的, 又不是反对称的;
- c) R 是可传递的。

解

- a) $R=\{<1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$
- b) $R=\{<1, 2>, <2, 1>, <2, 3>\}$
- c) $R=\{<1, 2>, <2, 1>, <1, 1>, <2, 2>, <3, 3>\}$

3-6.4 如果关系 R 和 S 是自反的, 对称的和可传递的, 证明 $R \cap S$ 也是自反, 对称和可传递的。

证明 设 R 和 S 是 X 上的自反的, 对称的和可传递的关系。

- 1) 对任意 $x \in X$, 有 $<x, x> \in R$ 和 $<x, x> \in S$, 所以 $<x, x> \in R \cap S$, 即 $R \cap S$ 在 X 上是自反的。
- 2) 对任意的 $<x, y> \in R \cap S$, 有 $<x, y> \in R \wedge <x, y> \in S$, 因为 R 和 S 是对称的, 故必有 $<y, x> \in R \wedge <y, x> \in S$. 即 $<y, x> \in R \cap S$, 所以 $R \cap S$ 在 X 上是对称的。
- 3) 对任意的 $<x, y> \in R \cap S \wedge <y, z> \in R \cap S$, 则有 $<x, y> \in R \wedge <x, y> \in S \wedge <y, z> \in R \wedge <y, z> \in S$. 因为 R 和 S 是可传递的, 故得 $<x, z> \in R \wedge <x, z> \in S$, 即 $<x, z> \in R \cap S$, 所以 $R \cap S$ 在 X 上是可传递的。

3-6.5 给定 $S=\{1, 2, 3, 4\}$ 和 S 上关系: $R=\{<1, 2>, <4, 3>, <2, 2>, <2, 1>, <3, 1>\}$

说明 R 是不可传递的, 找出关系 $R_1 \supseteq R$, 使得 R_1 是可传递的, 还能找出另一个

3-7.1 设 R_1 和 R_2 是 A 上的任意关系, 说明以下命题的真假并予以证明。

- a) 若 R_1 和 R_2 是自反的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的;
- b) 若 R_1 和 R_2 是反自反的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是反自反的;
- c) 若 R_1 和 R_2 是对称的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是对称的;
- d) 若 R_1 和 R_2 是传递的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是传递的。

证明 a) 对任意 $a \in A$, 设 R_1 和 R_2 是自反的, 则 $<a, a> \in R_1$, $<a, a> \in R_2$ 所以, $<a, a> \in R_1 \circ R_2$, 即 $R_1 \circ R_2$ 也是自反的。

b) 假。例如: 设 $A=\{a, b\}$, 有 $R_1=\{<a, b>\}$ 与 $R_2=\{<b, a>\}$ R_1 和 R_2 是反自反的。但 $R_1 \circ R_2=\{<a, a>\}$, 所以 $R_1 \circ R_2$ 在 A 上不是反自反的。

c) 假。例如: 设 $A=\{a, b, c\}$, 有 $R_1=\{<a, b>, <b, a>, <c, c>\}$, $R_2=\{<b, c>, <c, b>\}$ R_1 和 R_2 是对称的, 但 $R_1 \circ R_2=\{<a, c>, <c, b>\}$ 所以, $R_1 \circ R_2$ 不是对称的。

d) 假。例如: 设 $A=\{a, b, c\}$, 有 $R_1=\{<a, b>, <b, c>, <a, c>\}$, $R_2=\{<b, c>, <c, a>, <b, a>\}$ 则 R_1, R_2 都是传递的。但 $R_1 \circ R_2=\{<a, c>, <a, a>, <b, a>\}$ 所以, $R_1 \circ R_2$ 不是传递的。

3-7.2 证明 若 S 为集合 X 上的二元关系:

- a) S 是传递的, 当且仅当 $(S \circ S) \subseteq S$;
- b) S 是自反的, 当且仅当 $I_X \subseteq S$;
- c) 证明定理 3-7.3 (b) (即 S 是反对称的, 当且仅当 $S \cap S^c \subseteq I_X$)。

证明 a) 设 S 为传递的, 若 $<x, z> \in S \circ S$, 则存在某个 $y \in X$, 使得 $<x, y>$

$> \in S$, 且 $<y, z> \in S$ 。
若 S 是传递的, $<x, z> \in S$, 所以 $(S \circ S) \subseteq S$ 。

反之, 设 $(S \circ S) \subseteq S$, 假定 $<x, y> \in S$ 且 $<y, z> \in S$, 则 $<x, z> \in S \circ S$ 。因为 $(S \circ S) \subseteq S$, 故 $<x, z> \in S$, 得到 S 是传递的。

b) 设 S 是自反的, 令 $<x, y> \in I_X$, 则 $x=y$ 。但 $<x, x> \in S$, 因此 $<x, y> = <x, x> \in S$, 得 $I_X \subseteq S$ 。

反之, 令 $I_X \subseteq S$, 设任意 $x \in X$, $<x, x> \in I_X$, 故 $<x, x> \in S$, 因此 S 是自反的。

c) 设 S 是反对称的。假定 $<x, y> \in S \cap S^c$, 则 $<x, y> \in S \wedge <x, y> \in S^c \Rightarrow <x, y> \in S \wedge <y, x> \in S$ 因为 S 是反对称的, 故 $x=y$, 所以 $<x, y> = <x, x> \in I_X$, 即 $S \cap S^c \subseteq I_X$ 。

反之, 若 $S \cap S^c \subseteq I_X$, 设 $<x, y> \in S$ 且 $<y, x> \in S$, 则 $<x, y> \in S \wedge <x, y> \in S^c \Leftrightarrow <x, y> \in S \cap S^c \Rightarrow <x, y> \in I_X$ 故 $x=y$, 即 S 是反对称的。

3-7.3 设 S 为 X 上的关系, 证明若 S 是自反和传递的, 则 $S \circ S = S$, 其逆为真吗?

证明 若 S 是 X 上传递关系, 由习题 3-7.2a) 可知 $(S \circ S) \subseteq S$, 令 $<x, y> \in S$, 根据自反性, 必有 $<x, x> \in S$, 因此有 $<x, y> \in S \circ S$, 即 $S \subseteq S \circ S$ 。得到 $S = S \circ S$ 。

这个定理的逆不真。例如 $X=\{1, 2, 3\}$, $S=\{<1, 2>, <2, 2>, <1, 1>\}$,

3-8.1 根据图 3-8.1 中的有向图, 写出邻接矩阵和关系 R, 并求出 R 的自反闭包和对称闭包。
解

$$M_R = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$




图 3-8.1

$$R = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle =$$

$$r(R) = R \cup I_X = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle =$$

$$s(R) = R \cup R^C = \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

3-8.2 设集合 $A = \{a, b, c, d\}$ A 上的关系

$$R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle \}$$


a) 用矩阵运算和作图方法求出 R 的自反、对称、传递闭包;

b) 用 Warshall 算法, 求出 R 的传递闭包。

解 a)

$$M_R = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

R 的关系图如图所示。



$$M_R + M_{I_A} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$= \{ \langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, d \rangle \} \text{ (图 (a))}$$




图 (a)

$$M_R + M_{R^C} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

3-9.1 4 个元素的集合共有多少不同的划分。

解 整数 4 可划分为: 4, 1+3, 1+1+2, 2+2, 1+1+1+1。

$$1 + C_4^1 + C_4^2 + \frac{1}{2} C_4^2 + 1 = 15 \text{ (种)}$$

3-9.2 设 $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 是集合 A 的一个划分, 我们定义 A 上的一个二元关系 R, 使 $\langle a, b \rangle \in R$ 当且仅当 a 和 b 在这个划分的同一块中。证明 R 是自反的, 对称的, 和传递的。

证明 设对任意 $a \in A$, 则必存在 A_i , 使 $a \in A_i$, 因 a 与 a 必可看作在同一块中, 故有 $\langle a, a \rangle \in R$ 。即 R 是自反的。

设 $a, b \in A$, 若有 $\langle a, b \rangle \in R$, 则 a 与 b 必在同一块, 故 b 与 a 亦在同一块, $\langle b, a \rangle \in R$, 即 R 是对称的。

对任意 $a, b, c \in A$,

$$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$$

$$\Rightarrow (\exists i) (a \in A_i \wedge b \in A_i) \wedge (\exists j) (b \in A_j \wedge c \in A_j)$$

$$\Rightarrow (\exists i) (\exists j) (a \in A_i \wedge c \in A_j \wedge b \in A_i \cap A_j)$$

$$\Rightarrow (\exists i) (\exists j) (a \in A_i \wedge c \in A_j \wedge A_i \cap A_j \neq \emptyset)$$

$$\Rightarrow (\exists i) (\exists j) (a \in A_i \wedge c \in A_j \wedge i = j) (\because i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset)$$

$$\Rightarrow a, c \text{ 在同一块}$$

$$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$$

$$\therefore R \text{ 传递}$$

3-10.1 设 R 和 R' 是集合 A 上的等价关系，用例子说明： $R \cup R'$ 不一定是等价关系。

证明 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $S = R \cup R'$

$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$$

$$R' = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

则 $R \cup R' = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$

因为如 $\langle 2, 3 \rangle \in S \wedge \langle 3, 1 \rangle \in S$, 但 $\langle 2, 1 \rangle \notin S$, 故 $R \cup R'$ 不是传递的, 即 $R \cup R'$ 不是 A 上的等价关系。

3-10.2 试问由 4 个元素组成的有限集上所有等价关系的个数为多少?

解 因为集合 X 上的等价关系与 X 的划分是一一对应的, 所以 4 个元素的有限集上等价关系的数目, 与 4 个元素集合进行划分的数目是相同的, 由习题 3-9.1 可知共有 15 个不同的等价关系。

3-10.3 给定集合 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 找出 S 上的等价关系 R , 此关系 R 能产生划分 $\{\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}\}$, 并画出关系图。

解 我们可用如下方法产生一个等价关系:


$$R_1 = \{1, 2\} \times \{1, 2\} = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$R_2 = \{3\} \times \{3\} = \{ \langle 3, 3 \rangle \}$$

$$R_3 = \{4, 5\} \times \{4, 5\} = \{ \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$$

$$R = R_1 \cup R_2 \cup R_3 = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 5, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle \}$$

关系图如图。



3-10.4 设 R 是一个二元关系, $S = \{ \langle a, b \rangle \mid \text{对于某一 } c, \text{ 有 } \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R \}$, 证明若 R 是一个等价关系, 则 S 也是一个等价关系。

证明 设 R 是 A 上的等价关系:

- (1) 对任一 $x \in A$, 因为 R 在 A 上自反, 所以 $\langle x, x \rangle \in R$ 。由 S 定义, $\langle x, x \rangle \in S$, 所以 S 是自反的。
- (2) 对任意 $x, y \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in S$, 则存在某个 c , 使得 $\langle x, c \rangle \in R \wedge \langle c, y \rangle \in R$, 因为 R 是对称, 故有: $\langle y, c \rangle \in R \wedge \langle c, x \rangle \in R$, 由 S 的定义, 可知 $\langle y, x \rangle \in S$, 所以 S 是对称的。
- (3) 对任意 $x, y, z \in A$, 若 $\langle x, y \rangle \in S$, 及 $\langle y, z \rangle \in S$, 则必存在某个 c_1 , 使 $\langle x, c_1 \rangle \in R$, $\langle c_1, y \rangle \in R$ 。由 R 的传递性, 可知 $\langle x, y \rangle \in R$, 同理存在 c_2 , 使 $\langle y, c_2 \rangle \in R \wedge \langle c_2, z \rangle \in R$, 由 R 传递, 可知 $\langle y, z \rangle \in R$ 。再由 S 定义, 得 $\langle x, z \rangle \in S$ 。故 S 是传递的。

3-10.5 设正整数的序偶集合 A , 在 A 上定义二元关系 R 如下: $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$, 当且仅当 $xv = yu$, 证明 R 是一个等价关系。

证明 设 A 上定义的二元关系 R 为:

$$\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{u}{v}$$

① 对任意 $\langle x, y \rangle \in A$, 因为 $\frac{x}{y} = \frac{x}{y}$, 所以

$$\langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$$

即 R 是自反的。

② 设 $\langle x, y \rangle \in A$, $\langle u, v \rangle \in A$, 若

$$\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{u}{v} \Rightarrow \frac{u}{v} = \frac{x}{y}$$

$$\Rightarrow \langle \langle u, v \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$$

即 R 是对称的。

③ 设任意 $\langle x, y \rangle \in A$, $\langle u, v \rangle \in A$, $\langle w, s \rangle \in A$, 对

$$\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R \wedge \langle \langle u, v \rangle,$$

$$\langle w, s \rangle \in R$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{y} = \frac{u}{v} \right) \wedge \left(\frac{u}{v} = \frac{w}{s} \right) \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{w}{s}$$

$$\Rightarrow \langle \langle x, y \rangle, \langle w, s \rangle \rangle \in R$$

故 R 是传递的, 于是 R 是 A 上的等价关系。

3-10.6 设 R 是集合 A 上的对称和传递关系, 证明如果对于 A 中的每一个元素 a, 在 A 中也同时存在 b, 使 $\langle a, b \rangle \in R$ 之中, 则 R 是一个等价关系。

证明 对任意 $a \in A$, 必存在一个 $b \in A$, 使得 $\langle a, b \rangle \in R$ 。

因为 R 是传递的和对称的, 故有:

$$\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle c, a \rangle \in R$$

$$\text{由 } \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, a \rangle \in R \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R$$

所以 R 在 A 上是自反的, 即 R 是 A 上的等价关系。

3-10.7 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的等价关系, 试确定下述各式, 哪些是 A 上的等价关系, 对不是的式子, 提供反例证明。

a) $(A \times A) - R_1$;

b) $R_1 - R_2$;

c) R_1^2 ;

d) $r(R_1 - R_2)$ (即 $R_1 - R_2$ 的自反闭包)。

解 a) $(A \times A) - R_1$ 不是 A 上等价关系。例如:

$$A = \{a, b\}, R_1 = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$$

$$A \times A = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$$

$$(A \times A) - R_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$$

所以 $(A \times A) - R_1$ 不是 A 上等价关系。

b) 设 $A = \{a, b, c\}$

$$R_1 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$$

$$R_2 = \{ \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle \}$$

$$R_1 - R_2 = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle \}$$

所以 R_1 和 R_2 是 A 上等价关系, 但 $R_1 - R_2$ 不是 A 上等价关系。

c) 若 R_1 是 A 上等价关系, 则

$$\langle a, a \rangle \in R_1 \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R_1 \circ R_1$$

所以 R_1^2 是 A 上自反的。

若 $\langle a, b \rangle \in R_1^2$ 则存在 c , 使得 $\langle a, c \rangle \in R_1 \wedge \langle c, b \rangle \in R_1$ 。因 R_1 对称, 故有

$$\langle b, c \rangle \in R_1 \wedge \langle c, a \rangle \in R_1 \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R_1^2$$

即 R_1^2 是对称的。

若 $\langle a, b \rangle \in R_1^2 \wedge \langle b, c \rangle \in R_1^2$, 则有

$$\langle a, b \rangle \in R_1 \circ R_1 \wedge \langle b, c \rangle \in R_1 \circ R_1$$

$$\Rightarrow (\exists e_1) (\langle a, e_1 \rangle \in R_1 \wedge \langle e_1, b \rangle \in R_1) \wedge (\exists e_2) (\langle b, e_2 \rangle \in R_1 \wedge \langle e_2, c \rangle \in R_1)$$

$$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R_1 \wedge \langle b, c \rangle \in R_1 \quad (\because R_1 \text{ 传递})$$

$$\Rightarrow \langle a, c \rangle \in R_1^2$$

即 R_1^2 是传递的。

故 R_1^2 是 A 上的等价关系。

d) 如 b) 所设, R_1 和 R_2 是 A 上的等价关系,

但

$$r(R_1 - R_2) = (R_1 - R_2) \cup I_A$$

$$= \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, a \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle \}$$

不是 A 上的等价关系。

3-10.8 设 C^* 是实数部分非零的全体复数组成的集合， C^* 上的关系 R 定义为：
 $(a+bi)R(c+di) \Leftrightarrow ac > 0$ ，证明 R 是等价关系，并给出关系 R 的等价类的几何说明。

证明：(1) 对任意非零实数 a ，有
 $a^2 > 0 \Leftrightarrow (a+bi)R(a+bi)$

故 R 在 C^* 上是自反的。

(2) 对任意 $(a+bi)R(c+di) \Leftrightarrow ac > 0$ ，

因 $ca = ac > 0 \Leftrightarrow (c+di)R(a+bi)$ ，

所以 R 在 C^* 上是对称的。

(3) 设 $(a+bi)R(c+di)$ ， $(c+di)R(u+vi)$ ，则有
 $ac > 0 \wedge cu > 0$

若 $c > 0$ ，则 $a > 0 \wedge u > 0 \Rightarrow au > 0$

若 $c < 0$ ，则 $a < 0 \wedge u < 0 \Rightarrow au > 0$

所以 $(a+bi)R(u+vi)$ ，即 R 在 C^* 上是传递的。

关系 R 的等价类，就是复数平面上第一、四象限上的点，或第二、三象限上的点，因为在这两种情况下，任意两个点 (a, b) ， (c, d) ，其横坐标乘积 $ac > 0$ 。

3-10.9 设 Π 和 Π' 是非空集合 A 上的划分，并设 R 和 R' 分别为由 Π 和 Π' 诱导的等价关系，那么 Π' 细分 Π 的充要条件是 $R' \subseteq R$ 。

证明：若 Π' 细分 Π 。由假设 $aR'b$ ，则在 Π' 中有某个块 S' ，使得 $a, b \in S'$ ，因 Π' 细分 Π ，故在 Π 中，必有某个块 S ，使 $S' \subseteq S$ ，即 $a, b \in S$ ，于是有 aRb ，即 $R' \subseteq R$ 。

反之，若 $R' \subseteq R$ ，令 S' 为 H' 的一个分块，且 $a \in S'$ ，则 $S' = [a]_{R'} = \{x \mid xR'a\}$

但对每一个 x ，若 $xR'a$ ，因 $R' \subseteq R$ ，故 xRa ，因此 $\{x \mid xR'a\} \subseteq \{x \mid xRa\}$ 即 $[a]_{R'} \subseteq [a]_R$

设 $S=[a]_R$, 则 $S' \subseteq S$

这就证明了 Π' 细分 Π 。

3-10.10 设 R_j 是表示 I 上的模 j 等价关系, R_k 是表示 I 上的模 k 等价关系, 证明 I/R_k 细分 I/R_j 当且仅当 k 是 j 的整数倍。

证明: 由题设 $R_j = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{j} \}$

$$R_k = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{k} \}$$

$$\text{故 } \langle x, y \rangle \in R_j \Leftrightarrow x - y = c \cdot j \quad (\text{对某个 } c \in I)$$

$$\langle x, y \rangle \in R_k \Leftrightarrow x - y = d \cdot k \quad (\text{对某个 } d \in I)$$

a) 假设 I/R_k 细分 I/R_j , 则 $R_k \subseteq R_j$

$$\text{因此 } \langle k, 0 \rangle \in R_k \Rightarrow \langle k, 0 \rangle \in R_j$$

$$\text{故 } k - 0 = 1 \cdot k = c \cdot j \quad (\text{对某个 } c \in I)$$

于是 k 是 j 的整数倍。

b) 若对于某个 $r \in I$, 有 $k = rj$ 则:

$$\langle x, y \rangle \in R_k \Leftrightarrow x - y = ck \quad (\text{对某个 } c \in I)$$

$$\Rightarrow x - y = crj \quad (\text{对某个 } c, r \in I)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R_j$$

因此, $R_k \subseteq R_j$, 于是 I/R_k 细分 I/R_j

5-1 代数系统的引入

5.1.1 设集合 $A=\{1, 2, 3, \cdots, 10\}$ ，问下面定义的二元运算 $*$ 关于集合 A 是否封闭？

- a) $x*y=\max(x, y)$ ；
- b) $x*y=\min(x, y)$ ；
- c) $x*y=\text{GCD}(x, y)$ ；（最大公约数）
- d) $x*y=\text{LCM}(x, y)$ ；（最小公倍数）
- e) $x*y=\text{质数 } p \text{ 的个数, 其中 } x \leq p \leq y$ 。

解：a) 封闭。b) 封闭。c) 封闭。d) 不封闭。e) 不封闭。

5.1.2 在下表所列出的集合和运算中，请根据运算是否在相应集合上封闭，在相应位置上填写“是”或“否”，其中 I 表示整数集， N 表示自然数集合。

集合 \ 是否封闭	运算					
	+	-	x-y	max	min	x
I						
N						
{x 0≤x≤10}						
{x -10≤x≤10}						
{2x x∈I}						

解：

集合 \ 是否封闭	运算					
	+	-	x-y	max	min	x
I	是	是	是	是	是	是
N	是	否	是	是	是	是
{x 0≤x≤10}	否	否	是	是	是	是
{x -10≤x≤10}	否	否	否	是	是	是
{2x x∈I}	是	是	是	是	是	是

5-2 运算及其性质

5.2.1 对于实数集合 R ，下表所列的二元运算是否具有左边一列中那些性质，请在相应位置上填写“是”或“否”。

	+	-	×	max	min	x-y
结合律						
交换律						
有单位元						
有零元						

解：

	+	-	×	max	min	x-y
结合律	是	否	是	是	是	否
交换律	是	否	是	是	是	是
有单位元	是	否	是	否	否	否
有零元	否	否	是	否	否	否