

一、填空题（每空 3 分，共 24 分）

1、 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量，已知矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 3\alpha_1 + 9\alpha_2 + 27\alpha_3, 2\alpha_1 + 4\alpha_2 + 8\alpha_3)$ ，且 $|A| = 1$ ，那么 $|B| =$ _____.

2、 设分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ ， A, B 均为方阵，则下列命题中正确的个数为_____.

- (A). 若 A, B 均可逆，则 C 也可逆. (B). 若 A, B 均为对称阵，则 C 也为对称阵.
(C). 若 A, B 均为正交阵，则 C 也为正交阵. (D). 若 A, B 均可对角化，则 C 也可对角化.

3、 设 $D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 1 \\ 7 & 8 & 9 & 1 \end{vmatrix}$ ，则 D 的第一列上所有元素的代数余子式之和为_____.

4、 设向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示，则_____成立. (注：此题单选)

- (A). 当 $r < s$ 时，向量组 (II) 必线性相关 (B). 当 $r > s$ 时，向量组 (II) 必线性相关
(C). 当 $r < s$ 时，向量组 (I) 必线性相关 (D). 当 $r > s$ 时，向量组 (I) 必线性相关

5、 已知方阵 A 满足 $2A^2 + 3A = O$ ，则 $(A + E)^{-1} =$ _____.

6、 当矩阵 A 满足下面条件中的_____时，推理“若 $AB = O$ ，则 $B = O$ ”可成立.
(注：此题可多选)

- (A). A 可逆 (B). A 为列满秩 (即 A 的秩等于 A 的列数)
(C). A 的列向量组线性无关 (D). $A \neq O$

7、 设矩阵 A, B 分别为 3 维线性空间 V 中的线性变换 T 在某两组基下的矩阵，已知 1, -2 为 A 的特征值， B 的所有对角元的和为 5，则矩阵 B 的全部特征值为_____.

8、 设 J_n 是所有元素均为 1 的 n 阶方阵 ($n \geq 2$)，则 J_n 的互不相同的特征值的个数为_____.

二、(10 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ ， $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

矩阵 P ， X 满足 $PA = B$ ， $PX = C$. 求矩阵 X .

三、(10 分) 设线性方程组 $\begin{cases} x_1 - 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 4x_2 - ax_3 = b \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 5 \end{cases}$ ，问当参数 a, b 取何值时，

(1). 此方程组无解？

(2). 此方程组有唯一解？

(3). 此方程组有无穷多解？

四、(10 分) 设 A 为 4 阶方阵，4 维列向量 $b \neq 0$ ， $R(A) = 2$. 若 p_1, p_2, p_3, p_4 都是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解向量，且满足

$$p_1 + p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad p_2 + p_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p_3 + p_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(1). (6 分) 求齐次方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系.

(2). (4 分) 求 $Ax = b$ 的通解.

五、(16 分) 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$ 用正交变换化为标准型.

六、(14 分) 设 V 为所有 2 阶方阵在矩阵的加法和数乘下构成的线性空间. 定义 V 上的变换 T 如下：

对任意 $X \in V$ ， $T(X) = AX - X^T A$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ， X^T 表示 X 的转置矩阵.

(1). (6 分) 证明 T 是 V 上的一个线性变换；

(2). (8 分) 求 T 在 V 的基 $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ， $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ， $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

七、(1). (8 分) 已知向量组 a_1, a_2, \dots, a_n 线性无关，向量组 b_1, b_2, \dots, b_n 满足：
$$\begin{cases} b_1 = a_1 + a_2 \\ b_2 = a_2 + a_3 \\ \vdots \\ b_{n-1} = a_{n-1} + a_n \\ b_n = a_n + a_1 \end{cases}$$

分别讨论当 $n = 4$ 和 $n = 5$ 时，向量组 b_1, b_2, \dots, b_n 是否线性相关？

(2). (8 分) 设 λ_1, λ_2 为方阵 A 的两个不同的特征值， α_1, α_2 为 A 相应于 λ_1 的两个线性无关的特征向量， α_3, α_4 为 A 相应于 λ_2 的两个线性无关的特征向量，证明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关.