
Nome:	HELIO BAMBINI FILHO				
Sexo:	Masculino	Idade:	62 anos	Atendimento:	18541333
Exame:	35167156	Data:	18/12/2025	ID:	3575400
Médico Solic.:	LUCIANA SOARES CIANCIARULLO BAMBINI				

Conclusão

A polissonografia basal mostrou:

- Aumento acentuado do índice de apneia/hipopneia devido a eventos obstrutivos(IAH:34,8 eventos/h);
- Presença de ronco moderado a intenso durante o exame (relato do técnico);
- Períodos de dessaturação da oxi-hemoglobina durante o sono;
- Diminuição do sono de ondas lentas;
- Eficiência do sono diminuída devido ao aumento do tempo acordado após o adormecer;
- Aumento de movimentos periódicos dos membros inferiores durante o sono, com índice de PLMS acima da normalidade.



MARIANA DELGADO FERNANDES
CRM 179521

Nome: HELIO BAMBINI FILHO

Sexo: M

Idade: 62 anos

Atendimento: 18541333

Peso: 95.0 Kg

Altura: 180.0 cm

IMC: 29.3 Kg/m²

Data: 18/12/2025

Exame: 35167156

ID: 3575400

Médico solicitante: Dr(a). LUCIANA SOARES CIANCIARULLO BAMBINI

Laudo de polissonografia: resultado

O exame foi iniciado às 23:12:22 horas e finalizado às 06:05:28 horas. A **latência para o início do sono** foi de 0.1 minutos e a **latência para o início sono REM**, de 94.0 minutos. O **tempo total de sono** (TTS) foi de 348.5 minutos, com **eficiência do sono** de 84.4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou 20.7% de **estágio N1**, 47.2% de **estágio N2**, 7.9% de **estágio N3** e 24.2% de **sono REM**. O **tempo de vigília após o adormecer** foi de 64.5 minutos. Ocorreram 148 **despertares**, uma média de 25.5 por hora. O **índice de movimentos periódicos de membros durante o sono** (PLMS – *periodic limb movements in sleep*) foi de 56.3 por hora, sendo 2.1 PLMS por hora **associados a despertares**.

A quantidade total de eventos respiratórios registrados foi de 203, sendo 51 apneias obstrutivas, 4 apneias centrais, 1 apneias mistas, 146 hipopneias obstrutivas, 0 hipopneias centrais e 1 despertares associados a esforço respiratório (RERA – *respiratory effort-related arousal*). O **índice de distúrbio respiratório** (IDR) foi de 34.9 por hora e o **índice de apneia/hipopneia** (IAH), de 34.8 por hora. O **índice de apneia/hipopneia obstrutiva** (IAHO) foi de 34.10 por hora e o **índice de apneia/hipopneia central** (IAHC), de 0.70 por hora.

A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) **basal** foi de 96%; a **média**, 96% e a **mínima**, 82%. O **índice de dessaturação** foi de 15.6 por hora durante o sono REM e 23.6 por hora durante o sono NREM. A saturação permaneceu abaixo de 90% por 0.4% do tempo total de registro.

Índice de distúrbio respiratório (IDR) = índice de apneias + hipopneias + RERA

Procedimento

Exame polissonográfico noturno registrado no sistema Alice 6 LDxS. Foram utilizados parâmetros fornecidos por eletroencefalograma (F4-M1, F3-M2, C4-M1, C3-M2, O2-M1, O1-M2); eletro-oculograma bilateral; eletromiograma (mentoniano/submentoniano e tibial bilateral); eletrocardiograma (montagem D2 modificada); cânula de pressão (fluxo aéreo) e termistor (fluxo oronasal); pletismografia por indutância (esforço respiratório torácico e abdominal); oximetria de pulso (saturação percutânea da oxi-hemoglobina – SpO₂); capnometria (P_{ET}CO₂); sensor de ronco (microfone) e posição corporal no leito.

Parâmetros de registro recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Análise do sono

Data e horário de início	18/12/2025 23:12:22
Data e horário de término	19/12/2025 06:05:28
Tempo total de registro (TTR)	413.1 min
Tempo total de sono (TTS)	348.5 min
Latência para o início do sono	0.1 min
Latência para o sono REM	94.0 min
Tempo em vigília após adormecer	64.5 min
Eficiência do sono (TTS/TTR x 100)	84.4%

Estágios do sono

	N1	N2	N3	REM	Vigília
Duração (min)	72.0	164.5	27.5	84.5	59.0
Distribuição no TTS (%)	20.7	47.2	7.9	24.2	*

Despertares

	Eventos	Índice (por hora)
Total de despertares	147	25.3

Frequência cardíaca

	Média (bpm)	Máxima (bpm)
Total	55.3	68.0
REM	53.6	
NREM	55.9	
Vigília	64.3	

Movimentos periódicos de membros durante o sono (PLMS - *periodic limb movements in sleep*)

EMG tibial bilateral	Eventos	Índice (por hora)
PLMS	327	56.3
PLMS associados a despertares	12	2.1

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

Eventos respiratórios

	Total de eventos	Índices (por hora)					Duração (seg)	
		REM	NREM	TTS	Supino	Não supino	Máxima	Média
Apneia obstrutiva (AO)	51	2.8	10.0	8.8		8.78	16.5	12.4
Apneia mista (AM)	1	0.0	0.2	0.2		0.17	12.5	12.5
Hipopneia obstrutiva (HO)	146	22.0	25.9	25.1	*	*	25.0	15.5
RERA	1	1	0	0.2		0.17	15.0	15.0
AO+AM+HO	198.00	26.00	70.90	34.10	*	*	54.00	40.40
AO+AM+HO+RERA	199.00	27.00	70.90	34.30	*	*	69.00	55.40
Apneia central (AC)	4	1	1	0.7		0.69	13.5	11.5
Hipopneia central (HC)	0	0.0	0.0	0.0	*	*	0.0	0.0
AC+HC	4.00	1.00	1.00	0.70	*	*	13.50	11.50

Índice de apneia + hipopneia obstrutiva (IAHO): 34.10 (por hora)

IAH(O+C): 34.8 (por hora)

Índice de apneia + hipopneia central (IAHC): 0.70 (por hora)

Índice de hipopneia central e obstrutiva: (por hora) em supino e 25.14 (por hora) em não supino

Índice de distúrbio respiratório (IDR): 34.9 (por hora)

Tempo de respiração de Cheyne-Stokes: 0.00 (min)

Parâmetros de análise recomendados pela Academia Americana de Medicina do Sono (2020)

- **Apneia:** queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, por 10 segundos ou mais.
- **Hipopneia obstrutiva:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; presença de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal ou ronco durante o evento.
- **Hipopneia central:** queda de 30% do fluxo por 10 segundos ou mais associada a 3% ou mais de dessaturação ou despertar; ausência de movimento paradoxal de caixa torácica, achatamento da curva de pressão nasal e ronco durante o evento.
- **RERA:** achatamento da curva de fluxo aéreo pela cânula de pressão por 10 segundos ou mais associado a despertar do EEG.
- **Respiração de Cheyne-Stokes:** presença de respiração periódica com padrão crescendo-decrescendo alternado por apneias ou hipopneias centrais, por 40 segundos ou mais.

Saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂)

Saturação média	96%	Saturação TTR < 90%	0.4% (1.5 min)
Saturação mínima	82%	Saturação REM < 90%	0.1% (0.5 min)
		Saturação NREM < 90%	0.2% (0.7 min)
Saturação média na vigília	96%		
Saturação média no sono REM	95%	Saturação < 80%	0.0% TTR (0.0 min)
Saturação média no sono NREM	96%	Saturação < 70%	0.0% TTR (0.0min)
Total de dessaturações	132		
Índice de dessaturação no sono		22.7 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono REM		15.6 (por hora)	
Índice de dessaturação no sono NREM		23.6 (por hora)	

Hipnograma

