

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA PARA TITULAÇÃO DE CPAP

Nome: MICHAEL ERICH KLAUS SPIER

Sexo: Masculino

Data do Exame: 16-01-2026

Idade: 60 anos

Peso: 81 kg

Altura: 1,71 m

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI
PRADO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 16/01/2026 22:14 e finalizado às 17/01/2026 05:40.

A latência para início do sono foi de **9,5 min** e a latência para o sono REM de **127,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 392,5 min, com eficiência do sono de **89,7 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **2,7 %** de estágio N1, **52,9 %** de estágio N2, **23,1 %** de estágio N3 e **21,4 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 35,5 min. Ocorreram 86 despertares, sendo o índice de **11,8 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **24,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 99, sendo 48 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 51 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **15,1 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 32,9 e o IDR durante o sono NREM foi de 10,3. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 15,1 (nº/h), sendo 7,3 apneia/h e 7,8 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 94%, a **média** de 94% e a **mínima** de 84%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 12,7 (nº/h), sendo que em REM foi de 32,9 (nº/h) e em NREM foi de 9,1 (nº/h). Permaneceu 0,8 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (7), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório moderado (**15,1 nº/h**) (VN= até 5 nº/h);
2. Dessaturação da oxi-hemoglobina (**84%**);
3. Latência para o início do sono normal (**9,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**127,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono preservada (**89,7 %**) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares normal (**11,8 nº/h**) (VN= até 15 nº/h);
7. Percentual do estágio N1 normal (**2,7 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 normal (**52,9 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Ligeiro aumento do percentual do estágio N3 ondas delta (**23,1 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM normal (**21,4 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco leve, esporádico verificado via sensor de ronco;
12. O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **24,0 (nº/h)**;
13. Presença de atividade em EMG de queixo.

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5 cmH2O.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MICHAEL ERICH KLAUS SPIER

Data do Exame: 16-01-2026

 CamScanner

DADOS DO PACIENTE:

Nome: MICHAEL ERICH KLAUS SPIER

ID: 0

Altura: 1,71 m

Peso: 81 kg

Sexo: Masculino

Data de Nascimento: 22-11-1965

IMC: 27,70

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 22:14:55

Data do Exame: 16-01-2026

Médico Solicitante: DR. FLAVIO AUGUSTO PASSARELLI PRADO

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	16/01/2026 22:14
Data/Horário de Término:	17/01/2026 05:40
Tempo Total de Registro (TTR):	437,5
Tempo Total de Sono (TTS):	392,5
Latência para o início do sono:	9,5
Latência para o sono REM:	127,0
Tempo acordado após o adormecer:	35,5
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	89,7 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	10,5	207,5	90,5	84,0	45,0
% de TTS	2,7	52,9	23,1	21,4	10,3

Despertares		
	Número	Índice (nº/h)
Total de despertares	86	11,8

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	57,9	83
NREM	58,3	80
Vigília	60,8	88

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	48	0	48	51	99	0	99
Índice	0,0	7,3	0,0	7,3	7,8	15,1	0,0	15,1
Índice em REM	0,0	15,0	0,0	15,0	17,9	32,9	0,0	32,9
Índice em NREM	0,0	5,3	0,0	5,3	5,1	10,3	0,0	10,3
Duração máx (seg)	0	32,9	0	32,9	36,8	36,8	0	36,8
Duração média (seg)	0	19,3	0	19,3	19,6	19,5	0	19,5
Índice em Supino	0	7,0	0	7,0	7,0	14,0	0	14,0
Índice em Não Supino	0,0	7,6	0,0	7,6	8,5	16,1	0,0	16,1

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 15,1 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 15,1 (nº/h)

DADOS DA OXIMETRIA		
	Média de SAO2	Menor SAO2
Sono:	94%	84%
NREM:	94%	84%
REM:	93%	85%
Vigília:	94%	87%

Valor de oximetria predominante durante o sono: 95%

Total de dessaturações: 93

"PLMS" (Periodic limb movements in sleep) Movimentos periódicos de membros inferiores durante o sono		
EMG tibial bilateral	Número	Índice (nº/h)
"PLMS"	0	0,0
"PLMS" associados a despertares	0	/


DADOS DE BRUXISMO:


TST	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	136
Index (occurrences/h)	20,8
NREM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	99
Index (ocorrência/h)	19,3
REM	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	37
Index (ocorrência/h)	26,4
VIGÍLIA	<i>Bruxismo</i>
# Ocorrências	0
Index (ocorrência/h)	0,0

POSIÇÃO DE OCORRÊNCIAS DAS APNEIAS:

	REM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	2	0	5	0
DIREITO	0	2	0	2	0
ESQUERDO	0	3	0	1	0
SUPINO	0	9	0	10	0
	NREM				
	AC	AO	AM	Hipo	RERA
PRONE	0	0	0	0	0
DIREITO	0	0	0	1	0
ESQUERDO	0	1	0	2	0
SUPINO	0	12	0	11	0

RESUMOS GRÁFICOS:





	Resultados	Valor de normalidade (VN)
Eficiência do sono	89,7 %	≥85%
Latência para o início do sono	9,5 min	até 30 min.
Latência para o sono REM	127,0 min	70 a 120 min.
Percentual do estágio N1	2,7 %	VN= 2% a 5%
Percentual do estágio N2	52,9 %	VN= 45% a 55%
Percentual do estágio N3	23,1 %	VN= 13% a 23%
Percentual do estágio REM	21,4 %	VN= 20% a 25%
Vigília:	10,3 %	5%
Índice de despertares	11,8 (nº/h)	até 15 nº/h
(IDR) Índice de distúrbio respiratório	15,1 (nº/h)	VN= até 5 nº/h 5 a 15 nº/h leve 15 a 30 nº/h moderado > de 30 nº/h elevado).
(PLM) Movimentos periódicos de pernas	0,0 /h	até 15 nº/h